





12

4

a

37

C. 62.e.

٥٥٠

LEXICON

MEDICVM,

GRÆCOLATINVM.

BARTHOLOMÆI

CASTELLI

MESSANENSIS STUDIO,

EX HIPPOCRATE, ET GALENO

DESUMPTVM

ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΟΤ ΔΟΧΑ.

Ad Perill. & Excell. D. D.

POMPEIVM CAIMVM EQVITEM,

in Patauina Schola Theoricum Primarium.

Cornelio



francescucci

VENETIIS, M DC XXVI.

Apud Georgium Valentinum, & Franciscum Bolzettam,

EX PRIVILEGIO.



PERILLVSTRI,


& Excellentiss: viro

DOMINO D.

POMPEIO CAIMO

Equiti splendidissimo,

*Et in Academia Patauina Medico
Theorico primario.*



VVM ea sit sapientiæ pa-
riter ac dominatus in hu-
manis animis inserta ne-
scio an innata cupiditas,
vt nihil magis , quam omnia scire,
cunctisque præesse , nemo desideret ;

a

2

Sa-

Sapientia propterea inter homines eminere , singularique comitate sibi voluntates hominum maxime conciliare, duo simul factu difficillima, & fere *admiranda* rectissime statuunt quicumque prudentia pollent. Iure itaque virum , quem alta sapientia non inflat, suspiciunt omnes ; quem vero sapientem gravitate condita comitas decorare cernitur, næ illum meritissimo singuli colunt , & admirantur. Porro Te virum doctissimum & eruditissimum studiosi quique venerantur (*Pompei Caimè*) cuius doctrina, & eloquentia dudum apud Romanos plurimum emicuit , & nunc in Antenoræo Lyceo luculētissime nitet; Romæ quidem , vbi supra duplicem annorum Enneadem tum Philosophorum , & Medicorum principum oracula

cula de primario suggestu non obstre-
 pentibus, sed obstupentibus frequen-
 tissimis Auditoribus explicauisti; tum
 etiam Archiater Principibus, Cardi-
 nalibus, maximisque Pontificibus
 Medicinam præclarissime fecisti: Pa-
 tauinarum autem in Athenarum Pe-
 ripato, vbi Medicinæ Theoriam de
 prima sede celeberrimum docens na-
 tionum omnium conuentum Hip-
 pocratis abditiora sensa mira subtili-
 tate penetras, mira facilitate pandis;
 Galenique non raro impugnata dog-
 mata solidissimæ scientiæ clypeo sar-
 ta tecta tueris: Quin & nuper in Vrbe
 Veneta, prudentum litteratorumque
 theatro, tuam πολυμαθίαν & incompa-
 rabilem comitatem viri cum in litte-
 raria, tum etiam in ciuili Republica
 primarij fatis experti mirifice lauda-

uerunt . Sed vt omnes ad vnum, quibus liuor mentis aciem non perstrinxit, Heroicas virtutes tuas & animo prosequuntur, & ore summis laudibus extollunt; ita ego, vir omniscie idemque benignissime, Te, quem extra omnem inuidiæ aleam positum optimi quique diligunt, & reuerentur Philosophiæ, rectæque Medicinæ decus & ornamentum, Patuinaeque scholæ iubar clarissimum, summa benignitate amabilissimum intima quadam animi mei obseruantia semper excolui: Quem in præcordijs latentē affectum iam dudum aliquo non vulgari signo Tibi, & mundo palam facere gestiens, morę omnis impatiens, vndecumque propositi mihi occasionem arripiendam censiui; nec passus sum hanc e manibus elabi: Quare diu

ex-

expetitum, & a quamplurimis efflagi-
tatum *Lexicon Medicum* recudens, o-
pus Græcarum vocum Medicis vſita-
tarum ſignificationem ex Hippocra-
te Galenoque deducēs, Tibi primario
Medicorum, græcarum litterarum
callentiſſimo, & Hippocraticæ, Gale-
nicæque doctrinæ peritiſſimo, peren-
nis obſervantiæ monumentum dica-
re volui. Vale vir egregie, meq; Tui
ſtudioſiſſimum inter eos numera, qui
Te toto pectore venerantur.

Patauij vj. Kal. Jan. MDCXXV.

Perill. & Excell. Dominat. Tue

Addictiſs. deditiſſimusq; Cliens

FRANCISCVS BOLZ ET A.

a 4 A V.



AVTOR LECTORI

M E D I C Æ

rei studioſo.



N I H I L arduum, aut laborioſum unquam exiſtimaui, quod è re tua foret, ſtudioſe Lector, cum nihil mihi iucundius à primæua ætate viſum fuerit, quàm cateris prodeſſe;

se ; non enim nobis solis nascimur , sed
posteris, iuxta illud, Homo homini Deus;
Cum igitur experimento comprobaue-
rim , eos qui rem medicam sectantur ,
non tam sapientie , quàm lucri studio ,
cum primum humaniores literas supe-
rarint , vixq³ è primis Grammaticaru-
dimentis emerferint , in altum Philoso-
phia; & Medicinæ pelagus , se ipsos spon-
te insinuare , ignoratis utriusque scien-
tiæ vocibus , quæ prima elementa censen-
tur ; & caco ductore , in vastissimum
scientiarum campum , & inextricabi-
lem labyrinthum , citra Ariadnæ filum ,
(quo remeare possent) ingredi , Græcæ-
que literas , unde omnis scientiæ , tum
præsertim medicæ rei cognitio , & re-
rum , & vocum proprietas ortum duxe-
rat , à primo certe lumine in salutatas de-
ferere ; quo sit ut necesse illis sit , in reli-
quo

quo medicinae curriculo, cecutire; Propterea tanta temporis calamitati consulens, nullique meo labori parcens, annis superioribus id oneris assumpsi, ut scholares meae fidei, & doctrinae commissos, primum medicinae elementa, rudimenta, principia, & voces edocerem, tum deum ad supremum eiusdem facultatis apicem virtute connixos deducerem, ut hinc & medicarum vocum, & uniuersae artis cognitio illis facile pateret, nec esset quod in re exigua, ac vocum significatione illis immorandum esset, sed ultro ad altiora, eiusdem facultatis axiomata, cognitis vocibus, possint assurgere, quamuis Graecarum literarum essent prorsus ignari. Nec ignoro, id laboris à Doctissimo Manardo, Ioanne Gorraea, ceterisque assumptum fuisse; ab illo tamen intempesta morte intermedia, inexpletum; ab hoc

com-

completum quidem, sed literis Græcis scaten-
s, non omnibus, aditum ad apertum de-
relictum, nisi Græci idiomatis peritissimis,
qui non nisi paucissimi reperiuntur, intel-
ligo. Neuter adhuc ex Galeni Hippocra-
tisque autoritatibus (ut mei instituti est)
voci significationem haustam, adduxit,
sed sua sponte ut quisque interpretatur,
intellexit. Nec in eorum ego sum genere,
qui ne olus quidem in foro empturi sunt
citra definitionem, nec alicuius vocis signi-
ficationem admittunt, quin illius essentiã,
quid dativa (ut vocant) definitione per-
scrutati fuerint; Mihi solum satis super-
que fuit, etymon, & vocis cuiusque signi-
ficatum ex Hippocrate, vel Galeno desum-
ptum, succinto sermone explicare, ut ij qui
acutius vocis intelligentiam introspicere
voluerint, ex ijsdem autoribus, ad quos
Lectorem remittimus, eam facile conse-
quan-

quantur. Monitum adhuc te cupio Lector
(ne quid in hoc opusculo desiderari existi-
mes) me hic simplicium, & sponte nascen-
tium è terra corporum, significationem nō
allaturum, cum eorum omnium, ab exer-
citatisimo Matthiolo, iuxta singularum
nationum voces singulares, quæ in usu a-
pud eas sunt, in suo de Simplicibus volu-
mine maximo, nomina recensita, et decla-
rata fuerint. Quin & forte invidia sti-
mulis actus, ad hoc opus elaborandum de-
ductus sum, cum suarum propriarum
vorum, & terminorum, (quos logici vo-
cant) significationes, suo quæque scientia
Lexicon profiteatur, ut hinc Lexicon Iu-
ris, hinc Lexicon Theologicum, in utra-
que facultate celebratissima habeantur;
æqua igitur ratione, & Lexicon Medi-
cum institui fas erat, ne tanto bono, ars
medica spoliaretur. Nostro igitur labore,

*in tuam gratiam suscepto, studioso Le-
ctor, vivere. Vale.*



IN CASTELLIANVM LEXICON.

N. Antonini Colossi Carmen.

DEdalus haud tantum fert nominis, implicuisse;
Stamine quàm cæcas explicuisse domos.
Non laus Aegæ seruasse penatibus aurum
Phryxum; Aesonida, sed retulisse datur.
Atlas Hesperidum vigili pomaria clausit
Angue, sed Alcides aurea mala tulit.
Ille quidem summo me iudice dignus honore est;
Qui, quid habent usus optima quaque, docet.
Scilicet inuentum primus qui cuderit anrum:
Munice qui tinxit vellera purpureo:
Quique in Erythæo proiectis littore baccis,
Instituit torques excoluisse nurus.
Quantum igitur laudis dives CASTELLE, mereris.
Qui tot primus opes, tot bona prima doces.
Non etenim herbarum, & lapidum, quod munus, & usus,
Sed quæ verborum est vis, ratioque doces.
Dædaleos nexus filo, ambagesque resoluis,
Auratos villos, aurea pomarefers.
Dædalus, Alcides, tibi cedant, cedat Iason;
Te magis his etenim laus diuturna manet.

Ad Lectorem.

Transiit in Zanclem veteres CASTELLUS Athenas,
Lector habes Phrygiam hic Pergamon, atq; Rhodon.

AN.

ANNIBALIS BVRALE
Art. Med. Doct. ad Lectorem
Carmen.

Qua Galenus habet, quęcunque vocabula magnus,
Continet Hippocrates & bene nosse iuuat.
Nomina morborum, symptomata, multa que lucem
Que prestant medicis non sine fruge libi is.
Hęc tibi CASTELLI ingenium, doctusque libellus
Edocet, & cuius commoda multa parit.
Cui studiosa cohors pro tanto munere grates.
Reddat, ut impressis nobiliora paret.

MVTII FERRARA
Art. Med. Doct. Epigramma.

Hippocrati debet, debet Medicina Galeno,
Vni CASTELLO debet at illa magis.
Nam veluti Alcidem ducentia fila sequutum
Fama est ambiguas, isse, redisse vias.
Sic dubiis Veterum, perplexaque dogmata seruans,
Explicat hec, claris nominibusque refert.
Cęcas ambages, labyrinthos arte resoluit,
Et verum ex vero verius ipse legit,
Quantum quisque potens medicare, debeat isti,
Si nosset, meritum prosequeretur opus.
Continuo edocuit, dignatus Apollinis artes
Altior humana mente, honor unde sibi est.

LEXICON

MEDICVM,

HIPPOCRATIS, GALENI,
ET AVICENNAE.

Authore

BARTHOLOMAEO CASTELLO
Theologo, Philosopho, & Medico Messanenſi.

A



BAPTISTA, terebella eſt, qua in fraſtu-
ris capitis, quæ uſque ad Cerebri mem-
branam peruenerunt, quando id quod cõ-
tuſum eſt, excidi debet, utimur, Cui tere-
bellæ, nedum Medici eam audacius tra-
ſtantes duram membranam quæ oſſi ſub-

ternitur, uiolent, ſupra eius acutam cuſpidem, circulum
uendam, ſiue labrum. ſiue ſupercilium, parum extans effor-
nant, quem ab argumento abaptiſtam uocant, 6. meth. c. 6.

Abarticulatio, idem eſt, quod dearticulatio, id eſt ea na-
uralis oſſium coniunctio, quæ euidentem motum habet, ſi-
ut coarticulatio, eſt ea naturalis oſſium commiſſio, quæ
exiguum, & obſcurum aliquando, aliquando nullum motu
reſeſert, 2. de artic. 8.

Abdomen, ſunt duo muſculi recti, & carnoſi, qui à pectore

A

re,

re, ad ipsa pubis ossa perueniunt, qui sibi cohærent, coalescuntq; & quod conflatum ex ipsis est, Græci Epigastrium, id est abdomen nominarunt, 6. meth. 4. c. quod & Hypogastrium vocant, 6. de usu par. c. 4. estq; commune omnium viscerum operimentum, 1. de semine, cap. 15. quod abdomen his tribus partibus constat, hypochondrijs, locis ad umbilicum attinentibus, & imo ventre, 2. aphor. 35.

Abductiones, quæ & abruptiones, apagmata. & apoclasmata dicuntur, fracturæ sunt, quæ propè articulum, per totam ossium crassitudinem fiunt, ita ut à se plurimum dislæt, quas recentiores paulatim factas fracturas nuncupant, com. 3. in lib. Hipp. de his quæ in medicatiua fiunt, 31.

Ablatio totum illud tempus paroxysmi febrilis est, quod post statum est, qualicumq; natura præditum, siue id ad integritatem veniat, siue non, quod & remissio, interuallum, de clinatio, & submissio dici solet, lib. de morb. tempor. c. 6.

Abluentia, & abstergentia medicamenta sunt, quæ cum mordicationem facièntem, leniendo euacuant, 1. de simpl. med. fac. cap. 37. & lib. 2. cap. 14.

Abolitionem pulsus vocamus, cum eleuatis. & mox applicatis digitis inuenimus in singulis applicationibus motum deficientem, longe enim abest pulsus abolitio, à pulsu deficiente, illa enim est velut defectus, ut sensus quidem indicat totius functionis, hic dimidiat: & amissio, 2. de caus. puls. cap. 3.

Abortus est imperfecta fatuum emissio, utcumque facta fuerit, quam Hipp. nunc amblosin, nunc perditionem, nunc apophthoram vocat & medicamenta id præstantia ambloptica, id est abortiua, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2.

Abrasa sunt, quæ aposyrmata Græci vocant, suntq; ulcera quæ mollem, & suspensam habent cuticulam, 1. de com. & os. med. per gen. cap. 12.

Abrasio

Abrasio intestinorum, est ulceratio partium, quæ in superficie intestinorum constat, qua earundem partium eliciamenta solent, 3. deratione viēt. in morb. acut. 33.

Abruptio, vide *Abductio*.

Abscedentia corpora, siue quæ abscesserunt, vocat Hipp. omnia quæ cum corpus secundum naturam sese habet, vel unita aliquibus alijs partibus sunt, vel eas attingunt, cum præter naturam affectum est, unionem vel contactum non amplius seruant. *Expansa* autem vocat, quæ plurimo intervallo inter se distant, id quod duobus modis fit, vel in toto, vel in labris tantum, 2. de his quæ in medic. fiunt, 25. vide *apoflasis*.

Abscessio apud Hippoc. id est, quod ego soleo continuitatis solutionem appellare, & membra quæ ita affecta sunt, *abscedentia* vocat, tametsi una quadam species huius generis sit, quam propriè *abscessionem*, & *abscessum*, id est, *apoflasi*, & *apostema* nūcupant, lib. de his quæ in medic. fiunt in argumento operis.

Abscessus, tumor est præter naturam suppuratus, non cōsucto, & bono pure, sed in corruptionem quandam aliā tendente, lib. de tumor. c. 3. aliquando Hipp. non eos solos *abscessus* vocat, qui per effluxionem fiunt, sed etiam cum alius transit morbus in alium, comm. 2. in 1. de morb. vulg. 21.

Abscessus est corporum ex phlegmone in pus transmutatio, li. finit. med. fol. 97. *Abscessus* etiam appellat Hippoc. qui excretionem noxiorum humorum sunt facti, ne dum qui decubitu, com. 1. in 3. de morb. vulg. 4. vide *Sinus*.

Abcissio quæ & *Apocope* dicitur, siue morbus ex abscissione est, qui citra declinationem soluitur, & terminatur, vel pp ægrotantium imbellicitatē, vel pp morborum fortitudinē, tandem cum morbus supra vires exisist, q. mortalium morborum est proprium, de totius morb. tempor. c. 1. & 5.

Abstergentia, vide Abluentia.

Abuacuatio, euacuatio est, aut corpori plus a quo plethorico conueniens, quæ hypercrisis seu superuacuatio dici solet, aut quæ per patientem particulam fit. In arte parua, c. 95.

Acamatos media est omnium simpliciter membrorum figura, quasi sine fatigatione dixeris, 2. de motu muscul. c. 1.

Acantha est spina seu spina apex, quem natura in spondylis dorsi est machinata, ex medijs partibus postremis, quæ esset velut vallum quoddam ante spinam totam oppositum, quod prius ipsum contunderetur, ac comminueretur, modisque omnibus afficeretur quam ad ullum spondylum noxa perueniret, 12. de vsupar. cap. 15.

Accessio est deterius tempus totius circuitus, quod est à primo insultu morbi, usque ad tempus consistendi, siue per tertium siue per quartum, siue quotidie fiat, 1. apb. 12. quæ & paroxysmus dicitur.

Accidens al. quando passionem significat, id est, ipsam operationis lationem, de different. morb. c. 7. quæ constitutionem unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis accidentia egrotantibus symptomata dicunt, 1. meth. c. 9. Non accidentia verò vocant recentiores Medici ea quæ non existunt, vt dolore vacare, et huiusmodi, com. 1. prognost. 27.

Accommodatum in corpore dicitur, id quod quando unicuique rei seruatur, iuste quodlibet se se habet ac disponitur. 1. de fractur. 2.

Acerbum id omne dicitur, quod linguæ nostræ admodum, valde desiccet contrahit, & in multam profunditatem usque, illam exasperat, sicut pyra syluestria immatura, ab austeris sola intentione dumtaxat, diuersum, 1. de simplic. med. fac. cap. 37.

Acetabulum, est illud cauum ossis extremi quod capita alterius

alterius ossis altius excipit, quod & Cotyle dicitur, lib. de ossibus in proœmio, Acetabula adhuc sunt, vasorū & venarum quę ad matrices perveniunt orificia, quę & Cotylidones dicuntur, quibus fœtus matri alligatur, per quā velut per truncos quosdam fœtus ex matrice trahit spiritum & sanguinem, 15. de usu par. cap. 5. non secus ac Polypi acetabulis quidquid attigerint; corpora enim vasorum sunt polyporum acetabulis perquam similia, ut nomine etiam non alio appellentur, lib. de Semin. cap. 7. per quā etiam vasa singulis quibusque mensibus excrementitius sanguis in vuluam derivatur, ibidem; quamvis nonnulli homines vuluam acetabulis carere dicant, lib. de vuluæ dissec. cap. 10. plerūque profundos sinus, magnis supercilijs circumdatos, tum Hippoc. tum alij, acetabula nuncupare consueverunt, 1. de artic. 21.

Acetabulares vuluę eminentiæ, sunt tumores vasorum uteri, quos prægnationis tempore adnatos habet, quales etiam recto intestino esse in hæmorrhoidibus solent, lib. de vuluæ dissec. cap. 10.

Achinesia est media quies, quę inter systolem & diastolem pulsus, intercedit. 1. de differ. puls. c. 7.

Achlys est circa totum nigrum oculi à superficiali ulceratione cicatricula tenuissima, aeri caliginoso assimilis, lib. Introd. cap. 5.

Achores sunt manantia ulcera cutis capitis, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus glutinosa effluit sanies; huic morbo affinis est Fauus, seu Cerion, in quo foramina sunt quam in illis maiora, melleum humorem continentia, lib. de remcd. parat. facil. cap. 9. lib. de tumoribus, cap. 15. 1. de comp. med. loc. cap. 8. quę vulgus vocat Tigna, Arabes sabafati.

Achrous, i. decolores homines, 4. de ratione viſt. 115.

Aciam vocat Hipp. filum per foramen acustraictum, quo vel partes corporis dissectas inter se cōmittere, vel caput fascie subiectis partibus, assuere consueuimus; Nodum verò iunctionem, quæ ex fascijs inter se connexis fit, com. 2. in lib. de his quæ in medic. fiunt 7.

Acida bilis, quid sit, exemplo ostendit Gælenus, vinum quidem dulce (inquit) quod nondum ab viuis sit expressum, feruens & alterascens ex eo quem in se habet, calore, intelligimus, ex cuius mutatione duo proueniunt excrementa, alterum leuius, magisq; aerium, quod florem, alterum grauius ac magis terreum, quod fecem vocant horū alteri flauam bilem, alteri nigram assimilamus, quando non eandē habent bisucci speciem, cuius animans naturæ opera regitur, qualem cum præter naturam se habet, sepe exhibent, quippe flaua quæ est, efficitur vitellina, ita enim nominant, quoniam ouorum vitellis tum colore, tum crassitudine sit assimilis, nigra verò longè malignior, ea quoque quæ similis ei, quæ naturalis est, redditur: nomen tali succo nullum est insitum, nisi quod aliqui vel radentem eum, vel acidum appellarunt, quoniam acris in morem aceti fit & corpus animalis radit, & terram si supra eam sit effusus, quandamq; cum bullis, veluti fermentationem, ebullitionemq; excitat, ubi aduentitia putredo nigro illi succo naturaliter se habēti accessit; plerique autē id quod è tali succo naturaliter se habet, quod & infra deijcitur, & sæpè supra fluitat, atrum vocant succum, non atram bilem, quod verò ex uisione quæpiam in acidam migravit qualitatem, id atram nuncupant bilem, 2. de nat. facult. c. 9.

Acida pituita est, quæ omnino cruda est, omnimoda autem cruditas intelligenda est quæ in ea concoctione incidit quæ in venis agitur; non autem in ea quæ prima est quæque in ventriculo perficitur, 2. de nat. facult. c. 9.

Ac-

Acinofa tunica oculi, vide Rhagois tunica.

Acinus, vide Staphyle.

Acmaſtica febris eſt, quę continuo creſcēdo procedit, ut Epacmaſtica quę decreſcendo, Homotena verò quæ ſimilē ſervando calorem ad finem uſque terminatur, 9. meth. 4.

Acmem, i. maximam exercitationis & motuū intentionem Græci vocant, 2. de ſan. tuenda, c. 2. ſic ēt ætatem integram, & ſummum corporis robur ſignificat; inde translata eſt vox tum ad alia oīa, tum ad morbos, ſic .n. medici tertiu totius morbi tempus appellant, in quo ſummum hēt vigorē, 1. cap. 13. quam mediā ætatem Leoniceſus vocat eod. aph. Conſtitutam, alij conſtantē, alij ſubſiſtentem, q̄ media eſt inter ſenes, et iuvenes, 1. de ſan. tuen. c. 2. et 6. de ſan. tuen. c. 6.

Acopa medicamenta, quæ copon. i. laſſitudinem ex multo vehementiq; motu corporib. vel toti, vel particulis obortā tollunt, appellamus; Ceterū poſtea à medicis in uſu fuit, et ſi non ad laſſitudines medicamen ab ipsis ſit compoſitum, ſed vel ad dolorem diuturnum in alto corporis latētē, vel motū difficilem, vel ſenſum ſtupidū, vel particulę duritiem, vel tēſionem, vel tumorem ſcirrhoſum, appellare ſimiliter Acopa, modo humidam conſiſtentiam Acopis ſimilem habeant, 7. de compoſ. med. per gen. c. 11. etiam ſi gratia vehementer calefaciēdi aſſumantur, 7. de compoſ. med. local. c. 1.

Acor eſt ruſcus quidam acidus ex præſentia ciborum corruptorum in ventriculo, 5. de uſu part. c. 4.

Acordius homo, id eſt, ſecors, quod apud eos dūtaxat intelligas qui principatum animæ in corde ſtatuunt, 3. de placit. Hippocr. & Plat. cap. 4.

Acoſmia, vide Ataxia.

Acriſiꝯ vocabulum ab Hippocr. dupliciter uſurpatur; vel cum omnino iudicium nullum futurum ſit, aut prauum. com. 2. in 1. de mor. b. vulg. 46.

A 4 Acro-

Acrochordon verrucarum genus dolens, estq; exortus orbicularis, angustam obtinens basim lib.introd.folio'97. quam vocat pensilem verrucam, 2. meth. 2.

Acromion ea est compactio, qua os scapula à spina tenuè inchoatum, perculatimq; plenius effectum, ad *Acromij* locum pervenit, ibique iugulo connectitur. Alij præter hæc ambo qua coniunguntur tertium os esse inquirunt, quod in hominibus solum deprehenditur, idque *Cataclida* et *Acromion* appellant, lib.de ossibus, cap.14. quod etiam summam humerum vocat, 13. de usu part. cap.10.

Actiones prisca omnes actiuos motus nominant, sicuti omnes motus qui naturaliter se habent, nisi actiui sint pathemata, id est passiones Græci vocant, 2. meth. cap.3.

Actu aliquid tale esse, ex aduerso est ei quod est facultate, vel potentia, 1. de simpl. med. facult. c.9. at quod energia siue actu calidorum, frigidorum, humidorum, siccorum, unūquodque tale esse dicitur, vel quod summam habet eiusmodi qualitatem, vel vincit in eo id genus qualitatum aliqua, vel quod ad cognati generis mediocre aliquid, vel quod ad unū quodlibet à nobis est collatum, 3. de temp. cap.5.

Acuta exercitatio est, cuius celeres motus sunt, 5. de san. tuen. cap.3.

Acutus morbus est qui ob sui magnitudinē, & casuū vehementiam, ad summū vigorē celeriter properat, 2. aph. 23.

Acutus simpliciter morbus est, qui intra quartūdecimū diem integrè iudicatur; *Acutus* verò ex decidentia, usque ad quadragesimum terminatur, 2. aph. 23. *Peracutus* verò morbus, qui ad septimum usque diem extenditur, qui longius procedit, simpliciter acutus. *Exactè peracutus* est, qui quartum diem attingit, non exactè qui septimum; *Exactè acutus*, qui decimumquartum, non exactè, qui vigesimum, quod autem ex delapsu acutum ad quadragesimū, 2. de dieb. decret.

decret. c. 12. quem acutum ex delapsu, siue ex decidentia vocat Hipp. acutum adauctum, & acutum ex conuersione, 3. progn. 10. & 1. progn. 25. acutas etiam simpliciter vocat eas febres, quæ maxima ex parte cõtinauæ sunt, 2. de cris. 12.

Acutus ex decidentia, vide Acutus simpliciter.

Acutus adauctus, vide Acutus simpliciter.

Acutus ex conuersione, vide Acutus simpliciter.

Acuta febris, vide Acutus simpliciter.

Adedentes, i. phagedenæ, lib. de aer. aq. & loc. c. 2. vide Phagedenæ.

Aden, i. glandula, conuolutio quedam est sicca, & carnosæ, uel carnosæ conglomeratio, lib. finit. medic. fol. 97. eundem adenem corpus carni forme uocat, quod utique uelut cuneus quidam, uasorum diuisionibus incubans, fulcimentum ipsis tutum suggerit, ut à nullo uiolento casu officiantur, 4. de usu part. ca. 20. quem adenem Thymum uocat, 6. de usu part. cap. 4. adhuc & adenam, seu glandulas uocat carnosas partes raras, & spongiosas, quæ in alis, inguine, & collo sunt, 13. meth. c. 5.

Adeps, qui & axungia dicitur, differt à pinguedine, quod ille crassior sit, animantibusq; totam naturam terrosiorem habentibus prouenit, uelut humidiorib. pinguedo; At tu si uoles oleosam & pinguem in animalib. substantiam omnem, adipem appellato, ut plerique medici, sed & pinguedinem appellare totum hoc genus licet, 11. de simpl. med. fac.

Adiapneustia, i. impedita perspiratio, 11. meth. 10.

Adiunctio, vide Appositio.

Adiutorij os, id est, os humeri, quod maximum omnium est, femore excepto, lib. de ossib. c. 16.

Adnata tunica, quæ & agnata, vide Rhagois.

Adstringens, uide Attrahens.

Aegilops, siue Anchilops, Arabibus algaras, abscessus qui-

quidam est ad angulum oculi, qui naribus propior est, pus continens quod erumpens aut os exedit aut ad angulum, vel usque ad nares destillat, lib. qui introd. dicitur, c. 15. & 5. de compos. medic. loc. c. 2. & lib. de reme. paratu facil. cap. 12. quod ulcus si neglectum fuerit, in fistulam desinit, lib. de oculis, cap. 9.

Aequalis ad pondus temperatura est in omnibus animalibus, & stirpibus ea quæ ex parielementorum commixtorum spectatur mole, non quæ tum animalis, tum, stirpis naturæ convenit, convenit. n. alijs ut humidum sicco, & frigidum calido præponderet, sicq; æqualis temperatura ad iustitiam est, non quæ pondere, & mensura, sed quæ eo quod prodignitate convenit, æqualitatem explorat; animalia. n. & stirpes, optimam, mediamq; habere in suo genere temperiem dicemus, non utique absoluto sermone cum paritas exacta contrariorum in ijs non sit, sed cum ea mediocritas, quæ ad potestatem refertur, his adsit, 5. de temp. cap. 6.

Aequalis inæqualitas dicitur, non in pulsibus modo, sed alijs prope omnibus, quæ pristinam naturam immutantia, siue magnitudine, siue qualitate æqualia, vel inæqualia capiunt incrementa: nam quatenus æqualitatem commutant, vocentur inæqualia, sed quatenus æquam semper mutationem assequuntur æqualiter dicantur mutari, sed quæ ut pristino constant statu nec accipiunt parem mutationem, hæc semel inæqualia vocantur, 1. de differ. puls. c. 11.

Aequalis morbus est, qui æquales habet motus, cum non ut inæquales morbi aliquot diebus vehementiores fuerint, postea sine aliqua significatione torpuerunt, deinde rursus ad aucti continuitatem acceperunt, sed perpetuò sibi constant; qui argumento ab Hippocr. dictum est continuorum morborum & inæqualium acutiem non posse ultra diem deimumquartum protendi, 2. aph. 23.

Æqua-

Aequalis pulsus est, cum oēs iētus equalem inter se seruant proportionē, ita ut secundus respondeat primo, & tertius secundo, ē contra dicitur inæqualis, 1. de diff. puls. c. 10.

Æquiuoca sunt quæ non sunt vnius generis, quacumque enim nomina vnā speciem in multis singularibus significant, vniuocē de ipsis dicuntur, quæ verò de multis diuersis specie ea æquiuocē nuncupantur, & res quæ ipsis subiiciuntur, ab ipsisq; significantur æquiuoca sunt, com. 3. in lib. de his quæ in medic. fiunt 24.

Aerofis quasi Aeratio, vel sanguinis attenuatio, vel inhalitum solutio, est custodia vel conseruatio, vel restauratio spiritus deperditi ex respiratione, & transpiratione, & qui ex sanguine attollitur, uapore, 11. metho. 3.

Aeruginosa bilis, q̄ ærugini similatur, vide Bilis pallida.

Aethiologica siue pathologica medicina pars est, in qua ea quæ præter naturam sunt, inquirimus, morborum causas, accidentium concursus, affectuum statum, lib. introd. c. 7.

Affectio sanguiflua est, in qua vehementer multum sanguinis profunditur, com. 2. in 6. de morb. vulg. 14.

Affectus præcordialis, vide Affectus flatuosus.

Affectus melancholicus, vide Affectus flatuosus.

Affectus grauis dicitur, aut propter præcellētiam partis, aut propter affectus magnitudinē, aut propter ipsius cacœthiā, 4. meth. c. 6. spectatur autē affectus magnitudo tripliciter; ex lesæ actionis præstantia, ex propria affectus essētia; & ex facultate q̄ lasum corpus gubernat. 7. metho. cap. 12.

Affectus flatuosus præcordialis, & melancholicus est, quo ijs qui inclinante etate plurima Venere vtuntur, inflatur, & tumescit venter, com. 3. in 6. de morb. vulg. 12.

Affectus implicatus est, in quo multa sunt affectus patiens nam potest idem homo non solum laborare ex thoracis sed etiam ex pulmone, ex capite, ex imo ventre, & ex iecore,

com. 2.

comm. 2. in 3. de morb. vulga. in argum.

Affectus qui & *schesis* dicitur, est dubia & non certa, aut firma corporis dispositio, is verò qui firmus & certus est, & quasi habitus, *Exis* dicitur, 8. metho. c. 3.

Affectus quos *Graci* pathemata vocât, *passiones* omnes sunt quæ in corporibus nostris sunt præter naturam, com. 2. in 1. de morb. vulg. 23. *affectus* verò siue *affectionis* vocabulum, ab *afficiendo* dictum, de multis effertur rebus, sed nunc recessus in statum præter naturam significatur qualescûque y fuerint *affectus*, siue *affectiones*, lib. de cur. rat. per sang missionem, cap. 3.

Affectus puerilis, vide *Comitialis morbus*.

Affusio quæ *Græcè* parenchyma nutrimenti dicitur, lib. introd. c. 9 vide *Parenchyma*.

Agathon significat apud *Hippocr.* idem quod idoneum, certum, stabile, verum, & perpetuum, ut auctor est *Gal.* com. 2. in lib. de fract. idem verò testatum reliquit in com. lib. 2. de artic. *Agathon* apud veteres id omne dici solere, quod in suo genere primum est.

Agerasia, i. in senescientia, lib. de marcore, c. 2.

Agglutinatio, vide *Prosthesis*.

Agitatio, vide *Vibratio*.

Agnata tunica, siue *adnata*, vide *Ophthalmia*.

Agnaa, vide *Fatuitas*.

Agonia est inæqualis motus ex timore et ira compositus, timore intro & ad principium tum sanguinem, tum spiritum unâ cum refrigeratione eorum quæ in summo corpore sunt abducente, & contrahente. ira verò foras agente, & fundente calorem, 2. de sympt. cau. c. 5.

Agrestis lichene, id est, *impetigo*, 6. de compos. medic. per Genera, c. 2. vide *Impetigo*.

Agrypnia, id est *vigilia*, 2. meth. 2.

Apathia,

Alipathia, perpetua passibilitas, lib. art. med. c. 8.

Ala narium sunt tenuia chartilagineaq; cor puscula utri-
que nasi lateri à parte inferiori adnata, lib. de ossibus, cap
4. quæ etiam pinnulas vocant, lib. introd. cap. 10. vocant
ad hoc & pinna, 2. de loc. affect. c. 2.

Alæ aurium, vide *Aures*; vide etiam lib. 7. introd. c. 10.

Alaria ossa, vide *Sphenois*.

Ala quid sit hinc patet, brachium appellatur, quod inter
duas iuncturas humeri, & cubiti intercedit, totius brachij
pars, super humeralis verò id est superior humeri
pars quæ ad collum vergit, nam humerus totum id, quod
in de articulatione hac apparet, vocatur, nam quod non ap-
paret à posteriori parte est os scapula, ab inferiore est id
quod dum totum brachium attollitur, manifestum fit, quæ
ala nuncupatur, 1. de artic. 4.

Alba vitiligo, vide *Leuce*, & *Vitiliginum*.

Albam pituitam consuevere medici, quandam aquæ in-
ter cutem speciem, leucophlegmatiam, id est, albam pitui-
tam nominare, vel quod sit et aliqua pituita linida, vel quod
sibi quidē ratione sit semper alba, sed propter mixtionē quo-
rundā aliorū humorum, verum mutet colorem, 7. aph. 29.

Albaras, vide *Aegilops*.

Albugineus oculi humor, similis albumini oui, opposita
parte vitrei humoris exterius, ante crystallinum positus,
non concretus, ut alij humores sed liquidus. in foramine tun-
nicæ neq; collocatus. superfluitas est crystallini humoris,
ad ipsum defendendum sua humiditate, lib. de anat. vihor.
vide *Hyaloides*, & *Crystallinus*.

Albugo cicatrix est crassa, & profunda, ulceri indurata,
lib. finit. med. non quacunque corporis parte, sed solum in
Iride oculi, lib. Introd. cap. 17.

Albula, vocant aquas aluminosas, 8. meth. 2.

Alexiphar-

Alexipharmaca medicamenta sunt, quę deleteria, id est, lethalia venena, intus assumpta euacuant, 5. de simpl. med. fac. c. 18. & 1. de semin. cap. 16.

Alexiteria medicamenta sunt, quę venenatarum bestiarum ictus, aut venena sanant, 5. de simpl. med. fac. c. 18.

Albacab est illud ligamentum, quod ad musculum non extenditur, sed continuatur inter duo extrema ossium, aut inter alia duo membra, annectēdo vnum alteri, firmiter ab offe natum, lib. de anat. uinor.

Alica ex genere tritici est, 1. de alimen. fac. c. 6.

Alienam caliditatem vocat *Aristoteles*, externam, nō insitam, neque natiuam in quocunque rerum genere, nam hec coquere apta est, extrema autem corrumpere, quod est putrefacere, 2. de differ. febr. c. 9.

Allantoides, uide *Chorion*.

Alopecia, capillorum defluuium est, propter uitiatos humores, sic appellata, quod vulpibus frequenter accidit, 1. de comp. med. loc. c. 2. qua locus affectus apparet colore prorsus exangui. de remed. par. facult. cap. 6. quam etiam *area* vocant, 2. meth. c. 2.

Alphi, id est, uiriliginis, & humorum uitiositate, quę in cute sunt, quemadmodum etiam de *Lepra* planum est, oriuntur, lib. de humor. com. 3. vide *Vitiliginum*.

Alteratio est alimenti concoctio, usque quo in similitudinem partis quę nutritur, transmutatur, 8. de comp. med. loc. cap. 6.

Alteratrix, uide *Attratrix*.

Altus pulsus, uide *Pulsus latus*.

Alueoli, uide *Patbnia*.

Aluus liquida appellatur, in qua liquida deijciuntur, com. 2. in 1. prorrh. 3.

Amarabilis, ea & pallida, & flaua dicitur, 2. de differ. febr.

febr. cap. 1. vide Bilis pallida, & Picra.

Amaurosis est totius in oculo lucis impedimentum, acutis morbis accidens quæ est imbecillis facultatis animalis signum, com. 2. in 1. p. orrhet. 11. 20.

Ambas, vide *Ambonæ*.

Amblotica medicamenta, vide *Abortus*.

Amblyopia est visus hebetudo, in qua oculi nec phlegmone tenentur, nec influxu torquentur, nec ulcerati sunt, nec aliud quidvis mali perpeffi, 5. de simpl. med. fac. c. 23.

Ambonæ sunt margines, siue labra, siue supercilia cotylarum, & cavitatum, 2. de usu par. c. 17. quas quidam masculino, quidam feminino, ambas appellant, 1. de artic. 10.

Ambusta sunt, quæ igne vel ardenti aqua comburuntur, ita ut bullas aliquando excitent, 5. de simplic. med. facult. quæ etiam ambustiones uocantur, 11. de simplic. medic. fac. constat autem si quis in aqua feruente ustus fuerit, hunc etiam affectum *Pyricauton*, i. ambustum igne, nominari, 1. de comp. med. per gen. c. 4.

Amentia, vide *Anaæ*.

Ametria est a iussu temperie recessus, 2. meth. c. 4.

Amniculum, vide *Chorion*.

Ammata, fascias Græci vocant, quibus venter, pectus, costæ, lumbique alligantur, 3. de sanit. tuen. c. 2.

Amnium, vide *Chorion*.

Amolynta, id est, non inquinantia medicamēta, similia his quæ propriè epithemata dicuntur, 7. de comp. med. per gen. cap. 11.

Amphiblestroides seu retiformis, id est, verrucalis tunica, quæ à cerebro ad oculos profecta, nitreū, & cristallinū humorem ambit, cuius tunica figura in latum diffusi, atque expansi nerui verriculo similis apparet, ad placit. ca. 5. uocant ipsum nonnulli propriè tunicam retiformem, quod figu-

ra quidem reti sit similis, ceterum nullo pacto est tunica, neque colore, neque substantia, sed si exemptum ipsum reposueris, in unum acervum coniiciens, tibi plane uidebere uideri Cerebri portionem quandam exemptam, 10. de usu par. cap. 2. uide Choroide.

Anaphimerina febris est, quæ singulis diebus acceditur, atq; intermissione finitur, idem enim est ac quotidiana simpliciter, nulla alia sermoni adiectione facta: eam uero quæ intermissionem non habet, non Cathemerinam, ut quidam, sed quotidianam continuam, uoco, 2. de differ. feb. c. 7.

Amphismela, est instrumenti genus, quo anatomici secant corpora, 6. de anat. adm. cap. 10.

Amuleta medicamenta quæ Græci *Periatta* uocant, sic appellantur, quod de collo suspendantur aut alicui corporis parti alligentur, lib. de remed. par. fac. cap. 1. quæ qualitatis familiaritate attrahunt, id est, totius essentię similitudine, 5. de simpl. cap. 17.

Amygdalæ, uide *Paristbmia*.

Amylum, ex tritico cibus, 1. de alim. fac. cap. 8.

Anabatica, uide *Continua*, & *Epacmastica*.

Anabrosis quæ & *Diabrosis* dicitur, est solutio continuitatis in osse, uel in uase aliquo ex erosione. 5. loc. aff. 5. uide *Diabrosis*.

Anacollemata medicamenta sunt restringentia fluxiones oculorum, de remed. par. fac. c. 10. quæ fronti, & temporibus imponuntur, 11. de simpl. med. fac.

Anadiplosis, est accessionū reduplicatio li. de Typis. c. 4.

Anadosis, est nutrimenti per uenas transitus, quod idem est ac digestio, seu distributio, differens à *Diadosi*, quod sit translatio, traditio, uel porrectio in singula simplicia, & in uisibilium neruorum, & arteriarum, nutrimento à lateribus illorum uasorum attracto, & translato, 2. de nat. fac. 6.

Anæa,

Anæa, siue amentia, est ratiocinatricis functionis ueluti paralyſis. lib. de ſympt. differ. cap. 3.

Analeptice, est renutritoria reſectoriaque uocata, niſtus ratio. 7. meth. 6. inde *analepsis*, id est reſumptio, li. de marcore, cap. 9.

Analogiſmus, est comparatio, & perceptio cauſarum iuuuantium per ſimilitudines, ad Thraſib. c. 11. siue *Analogiſmus* est ratio, quæ ab euidenti auſpicatur, rei obſcuræ facies cognitionem, 1. prognost. 6.

Anaplerotica medicamenta ſunt, quæ cicatrices craſſant, quæque alta vulnera complent, & lympidant, lib. de Dynamid.

Anaſarca, quæ, & *Cataſarca*, *Hypoſarcidium*, & *Epiſarcidium* dicitur, *Hydropis* ſpecies eſt, in qua humidi ſubſtantia tenuis copia, in tota inferiore thoracis regione acernatur, habitusque totus pituitæ plenus redditur, 4. de rat. viſſ. 111. diciturque *anaſarca*, quod per carnem ille humor fluat. lib. finit.

Anaſtoechioſis, quod relementationem dixeris, eſt colliquatio ſeu reſolutio, ſeu diſſolutio, aliquando totius corporis, aliquando ſuccorum, qui in uenis ſunt, duntaxat: quod autem ex ea colliquatione prouenit, aliàs ad uentrẽ confluit, aliàs ad urinas, aliàs ad ſudores pellitur. 3. de ſympt. cauſ. c. 2.

Anaſtomatica, id eſt, aperientia medicamenta, quæcunque vaſorum oſcula aperire apta ſunt, extergendo, incidendo, obſtruſtiones tollendo, & diuidendo: differuntque à rarefacientibus, quæ cutis tantum mæatus reſerant. 5. de ſimplic. med. fac. c. 14.

Anaſtomofiſis, uide *Oſculorum* apertio.

Anataſis, uide *Cataſiſis*.

Anatome eſt humani corporis, abditarumque eius partiũ diſſectio, & ſpeculatio, lib. finit. med.

Anatrypsin, i. refriktionem veteres Graci solent appellare, non eam frictionem, quæ ab inferiori parte sursum ducitur, sicut cõpositio videtur significare, sed absolute omnem quomodocumque factã. Nos autem Trypsin frictionem, seu fricationem vocamus, com. 3. lib. de his quæ in medic. 25.

Anchylops, vide *Aegilops*.

Anchoralis processus, vide *Ancyroides*.

Anchyle, vide *Ancyle*.

Ancon, est gibbi cubitus, vel gibberi medium cui innitimur, diciturq; *Ancon*, alterum maius ossium cubiti, quod & *Olecranon* vocat Hipp. 2. de usu par. c. 2. vide *Brachium*.

Ancos siue *Galianconas*, eos vocat Hipp. quibus cum auferentur eorum corpora, ex luxatione brachij in alam, os brachij breuius enasit. 3. de artic. 88.

Ancyle seu *popl. tes* sunt partes retrorsum post genua spectantes, lib. introd. cap. 10. unde *ancylas*, siue *ancyllas* vocat difficiles artuum motus, & ligationem nervorum, & articulorum contractiones, 7. de compos. med. per gen. cap. 6. vide *Poples*.

Ancyroides, processus acutus exiguusq. est in interiori parte ossis cervicis scapulae, qui cum anchora, vel cornu irostri similitudinem referat, *An yroides*, à nonnullis, *Cornicoides* ab alijs nuncupatur, quandoquidem extrema eius pars uti *Corniculæ* rostrum exterius inclinatur, lib. de ossibus, cap. 14. quem etiam *Anchoralem*, & *Cornicularem* nominant, 1. de artic. 2.

Ancurisma est affectio, qua os in arteria fit, vulnerata ea cum ad cicatricem perucnerit, quæ ei adiacet cuti, manente verò arteriæ ulcere, ea neque conglutinata, neque ad cicatricem simul perducta, neque à carne obstructa; quo fit ut arteria sanguinem iaculetur, qui contineri non potest, lib. de tumor. cap. 11.

An-

*Angina siue Synanche, est phlegmone alijs extra collū, ut partes tumescant, alijs intra tonsillas, ut simul partes quoque afficiantur respirationis, & agra spiratio sequatur, lib. finit. vel breuius, est abscessus ad venas iugulares siue a glutinosa, frigidaq; fluxione, quam pituitosam vocant, siue a calida & acri, quam picrocholam biliosamq; appellaue-
ris. quę, & Cynanche dicitur, 4. de rat. vict. 30. Tandem Hipp. omnes affectus gutturi accidentes, si spirationem quo-
quo modo reddant deteriore Synanchen vocat, alijs para-
cynanche, alijs paparasynanche dicitur, 4. loc. aff. 3.*

*Angor est natui caloris cordis contractio, ad quam se-
quitur eiusdem cordis dolor, & palpitatio, & tristitia, pes-
simumq. est signum si in principio acutarum febrium adue-
nerit, lib. de humor. com. 1. 4. de differ. puls. c. 3. & com. 2.
in 1. de morb. vulg. 75.*

*Anguli oculi sunt interiores oculi termini, ubi palpebrę
coalescunt alter iuxta nasum, iuxta tempora alter, hic par-
uus, ille magnus dicitur, uterque autem Canthus, dicitur, i.
angulus, lib. introd. ca. 10. dicuntur & Hirque oculorum,
lib. de venę sect. contra Erasistratum, c. 6.*

Angustus pulsus, vide pulsus latus.

*Anhelosi sunt qui densum spiritum habent, & simul tho-
racem multum distendunt, quod contingit in affectionibus,
multa inspiratione indigentibus, ut à cursu, aut vehemēti
exercitatione, & ardentibus febribus, 3. de diffic. respir. c.
11. nec etiam anhelationes asthma vocat, 8. de simpl. Cla-
rius autem inquit, qui citra febrem dense respirant, quali-
ter faciunt qui velociter cucurrerunt, ab accessione hac me-
dicis Græcis Asthmatici, Latinis anhelosi appellantur; eos-
dem etiam ab alia accessione, orthopnoicos vocant, quod tho-
racis corpus rectum habere coguntur ob timorē suffocatio-
nis. quin, & stratum circa supernas partes, ad quas tho-
ax*

reclinatur, sibiipsis erectius faciunt, ne dormientes strangu-
lentur, 7. de comp. medic. loc. cap. 6. & 3. aph. 26. & com.
a. in 3. de morb. vulg. 4.

Anima (apud Galenam) aut temperamentum actiua-
rum qualitatum est, aut ab ipsarum temperamento altera-
tur, 3. loc. aff. 7. & com. 5. in 6. de morb. vulg. 5. vide calor
matinus.

Animalis motus est, qui animantium corporibus cum sa-
na sunt arbitrio, voluntate, ac impetu nervorum, musculo-
rumq. ministerio fit, quem medici voluntariam actionem,
sive animalem appellare solent, lib. de trem. & palp. c. 2.

Animalis virtus est, quæ ex Cerebro originem ducit, qua-
que ex motuum voluntariorum imbecillitate deprehendi-
tur, ut virtus, quam ex corde prodeuntem agnoscimus, quæ
vitalem nuncupamus, ex pulsum debilitate, atque ex hepa-
te oritur, ac naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus ab
initio aquosis, atque tenuibus, postmodum verò crassis ad
modum facis, 1. ad Glauc. 14.

Annotatio, quam *Episemasiam* vocant, est accessionis
principium, 2. aph. 1. dicitur etiam annotatio, sive significa-
tio, sive simiosis, morborum dignotio ex similiū ac dissimi-
lium consideratione, ante alia artis opera, 1. de his quæ in
medic. fiunt 1.

Annotatio incompressa quæ bellicarū febrium propriū
est indicium, est, cum pulsus maior statim, ac velocior à ci-
bo efficitur, sine aliquo horrore, dormitatione, pigritia. frige
factione extremorum, inaequalitate pulsus, aut frigiditatis,
aut caliditatis, 1. de differ. feb. c. 9. vide Febris significatio.

Annotina medicamenta sunt, quæ ad sedandos dolores
sensum stupefaciendo parantur. 12. meth. 1.

Anodyna, id est, Sopientia medicamenta, 12. meth. 1. ea-
dem anodyna dicuntur, id est, indolentia quoniam dolores
sedant,

sedantur, nō tamen dispositiones penitus sanāt, sed uim sentiendi obtorpescere faciunt, 2. ad Glauco. 6. sed rectius anodyna dolorem sedantia sunt, sed facultas anodyna alia re vera est, alia tantum dicitur, tanquam si quispiam hominē mortuum dicat anodynū, quia dolore vacet, ceterū vera anodyna facultas est eorum qua primo ordine calefaciunt, si utique in essentia tenui contineantur; at facultas eorum qua dicuntur anodyna, sed non sunt, frigidorum est, quæ absolute utentia frigore partem obstupefaciunt, unde, & Narcotica, i. stupefacientia dicuntur, 5. de simpl. med. fac. c. 9.

Anomæomeres membrum est, quod ex dissimilibus partibus est conflatum. 7. meth. 6.

Anorexia, i. inappetentia idem significat quod Apostisia, id est abstinētia a cibo, 4. aph. 17. vide Apostisia.

Antecedens, vide Antegressa.

Antegressa causa quæ & procataarchon dicitur, est quæ extra corpus posita quidquā in corpore alterat, quæ & procataartica anticipans, & antecedens dicitur, quod eas quæ in corpore dispositiones sunt antegrediatur, 5. de caus. puls. cap. 1. quasunque dispositiones, vel motus in ipsa animali præter naturam, morborum præcedentes causas nominant, quæ verò extrinsecus adueniunt, & alterant corpus, atque naturam vehementer transmutant, præincipientes appellant. in lib. de caus. morb. ca. 2. eadem primitiua, & initiatrice dicitur, 6. de loc. affect. 4. eadem prophasis & occasio dicitur com. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Antheridæ, id est, floridæ appellata compositiones, 5. de comp. med. loc.

Antiadæ sunt glandulæ quæ sibi ex aduerso in oris terminō utrinque iacent, cum ex fluxione in tumorem attolluntur, 3. de caus. sympt. cap. 4.

Anticardion, sic dicitur canum illud quod sub pectore

carneum molleque ad os ventris, vocatur etiam sphage, Rufus verò cauitatem eam pectoris est. ad clauiculas, tradit ab Homero dici Lencaricon, à medicis verò Anticardion & sphagen.

Anticipans morbus est, qui cū diuersis horis semper accedat, & remittat, preuenit quidem continuo citiusque horas persoluit, vnde anticipans dicitur, siue prolepticus qui verò tardat hystericus siue posterius veniens nuncupatur, lib. de Typis, c. 3.

Anticipans, vide antegressa.

Anticnemion, v. de Gastrocnemion, & Sura & Tibia.

Antichir est magnus digitus manus, qui & pollex & promanus dicitur, lib. de muscul. dissect. c. 22.

Antidixis, & endixis, sunt contradictiones indicationum, & indicationes, quæ sunt auxiliorum inuentiones, 9. meth. c. 7. vide Endixis.

Antidotus, medicamentum est, quod non extrinsecus impositum, sed intus assumptum malas corporis affectiones sanat, 1. de antidotis, cap. 1. mos est iunioribus medicis, antidotos appellare, non modo quæ aduersus mortifera medicamenta quæque ad morsus ictusque venenosos exhibent, sed etiam quæ contra malas corporis affectiones, præsertimque diutinas valent ex aliquo ulcere, aut abscessu consurgentes, 2. de antid. cap. 6.

Antispasis, i. ad contrarium reuulsio, auertitur. n. sanguis, atq. ad alia membra conuertitur. tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, illud Parocheteus in hoc Antispasin Græci vocant, 5. meth. c. 3. vide reuulsio.

Antispaticchon, id est, auxilium in diuersa reuellens, 13. meth. 11.

Anthrax. i. carbo seu vlcus escarosum, cui adiungitur multum partium circumstantium inflamem 6. aph. 45.

An-

Antitaxis est, cum quę dissident ossa ad hoc ut è directo admoneantur, prius retrorsum trahuntur, hæc ad oppositum tractio antitaxis dicitur, 6. meth. 5.

Anulus est recti intestini orificium per sedem prodians, quo excretionem cum lubet retinemus, sic dictus à figura, ab officio verò strictor dicitur, lib. introd. cap. 10.

Anus seu vetula, vide umbilicus, dicitur èt anus inferior corporis pars, qua excrementa redduntur, 3. de vsu part.

Apagma medicorum appellatio propria est, quoties offis finis qua parte maximè cum alio committatur, abruptus est 6. meth. 5. vide abductions.

Apanthismas est subtilissima linea, quę agrè videri potest, quasi tu exolescentem lincolam diceris, cui simillimæ sunt venarum quædam propagines filorum aranę, aut capillorum modo angustæ, & extensæ, quę venę capillares dicuntur, lib. de dissect. venarum, & arter. c. 8.

Aparachyton vinum, i. originale cui marina aqua non est admixta, 4. de comp. med. per genera, c. 7.

Apechema, diremptio est offis superficialia, vel etiam profunda in partibus ictui oppositis, lib. finit. medic.

Apepsia, idest cruditas, 2. meth. 2. vide Concoctio.

Apeptaphymata solitus est Hippoc. nominare cruda tubera, seu tumores præter naturam nervosa corpora vertebrae ipsi, atque spinali medulla insita extendentes, 4. de loc. aff. cap. 3.

Aperientia, vide Anastomatia.

Aperistaron, idest cauum vlcus apertum, 2. de compos. med. per gen. c. 1.

Aphonia, idest, vocis carentia, quę agris solet accidere lesis duntaxat ijs quę voci efformandæ subseruiunt instrumentis, vel etiam ijs quę respirationi deputavit natura, vel ob recentem quandam exaltationem, & afflictionem

virtutis. 4. de ratione vict. 23.

Aphorismus est oratio, quæ omnes rei proprietates brevissimis verbis circumscribit, 1. aph. 1. quin & aphorismos definitiones appellat, 3. de his quæ in medic. 32.

Aphthæ sunt ulcera puerorum, summam oris partem occupantia, ob molliem maximè facta instrumentorum, quæ neque tactum neque qualitatem lactis sustinent, quod non parvam in se serosam contineant partem, 3. aphor. 24. ex quo habent aliquid igneæ caliditatis, vel adhuc quoddam infans lac non probè concoxerit, 6. de compos. medic. loc. c. 4. & com. 3. in 3. de morb. vulg. 12.

Apices matricis sunt processus quidam mamillares utrinque ad latera matricis ad ilia inclinantes, à Græcis cornua matricis appellantur, per quæ cornua semen à proprijs testiculis vulva attrahit, ut virile per collum, lib. de consuet. vulvæ, & 2. de semi.

Apios, cibus est omnis qualitatis quæ sensu deprehendi potest, expers, qui neque adstrictionem, neque acrimoniam, aut aliam insignem facultatem obtinet, qualis inter humidæ substantias est aqua, 1. de aliment. facult. 8.

Apræa, id est, ablata spiratio, 2. de rat. vict. 43.

Apoclasmata, vide abductiones.

Apocope, vide abscissio.

Apocrustica, i. reprimentia & repellentia medicamenta quæ adstringendi vim obtinent, 11. meth. 15.

Apodacrytica, id est, de lacrymativa, & repercussoria lacrymarum, 4. de comp. med. loc. c. 5.

Apolepsis, vide interceptiones venarum.

Apomeli, mellis decoctum intelligo, quod nos conficimus aceto cum melle commisto, tantisper tamen simul decocto, quo ad utrorumque qualitates inter se uniantur, & aceti vis retundatur, 3. fract. 49.

Apo-

Aponeurosis, sunt tendones quos musculi generant, qui ad artuum fines pertinent, 3. de aliment. facult. 5. dicuntur autem aponeurosis quasi deneruationes, & nerueꝝ musculorum tenuitates, 1. de anat. adm. cap. 5. quoniam musculi in eos desinant, 1. de motu musc. cap. 1. vide *Nervus*, *Tendones*, *Deneruationes*.

Apophlegmatismus; medicamenta quæ ore colluuntur, aut dentibus manduntur, omnia una nomenclatura comprehendentes apophlegmatizonta nominant, ac eorum facultates, apophlegmaticas, 5. de simplic. 20. rectius autem apophlegmatismus est medicamentum quod pituitam per os educit, 6. de sanit. tuen. c. 10.

Apophthora, vide *aborsus*.

Apophysis est extranea ossis pars, seu adnata appendix, lib. de ossib. in proœmio.

Apoplexia est ablatio sensus, & motus in toto animalis corpore, 3. de loc. affect. 10. & 2. aphor. 42. vide *Caros*, & *Paraplegia*.

Apoplecticę venę, quo & *Sphagitides*, & *Iugulares* externę, seu superficiarię Arabibus *Guidex* manifestè vocantur, sunt quę infernè ad aures utrinque singulę feruntur, à quibus superficiarię ferè omnes tum colli tum capitis partes nutriuntur, 6. de usu par. & initio secundi de rat. viſſ.

Aposcemata, id est decubitus vocantur, illa dispositiones, cum qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto ad alterum transeunt, 2. ad Glauco. 7.

Aposceparnismus abscissio est ossis, cum eius pars decussa vulnerando fuerit, fracturę species, lib. finit.

Apositi, more antiquorum Græcorum, ij appellantur, qui appetentia carent, com. 3. in 3. de morb. vulg. 72.

Apositia, vide *anorexia*.

Apospasmata, auulsa omnia nominantur, de constit. art. cap. 6.

cap. 6. quę verò continui solutiones, apospasmata, i. auulsiones vocantur, instrumentariorum tantummodo partium proprię sunt passiones, de differ. morb. c. 11. vide Rhegma.

Aposphagma, vide *Vnionis solutio*.

Apostasis fractura species est, quę sub generalē affectionem subiicitur, quę est continuitatis dissolutio, ita n. ego totum hoc genus soleo appellare, at Hipp. abscedentia corpora, quę ita affecta sunt, vocat, ut & affectio ipsa abscessio merito nominetur, tametsi una quadā species generis huius sit, quam proprię abscessionem, & abscissum, i. apostasin & apostema nuncupent, 3. de his quę in medic. initio.

Apostasis, & *Metastasis* differunt, quod *apostasis*, i. abscessus, iudicationem infert, agrumq; à molestiis omnibus liberat; *Metastasis* autem id est commutatio aliarum habet principium accessionum, ut & aliud exigat tempus ad collectionem mali, corporis locus ad quem infestantium humorum facta sit commutatio, 4. de rat. vict. 68.

Apostema, vide *apostasis*, & *Sinus*.

Aposfirmata, vide *abrasa*.

Apothērapia, nunc pro prostrema parte omnis probe peracta exercitationis sumitur, nunc pro ea medicina parte, quę lassitudinem ex immodico exercitio succedentem, submouet, 3. de sanit. tuen. c. 2.

Apothērmus, *Sapa*, *Siræon*, *Hepsema*, nomina Synonyma sunt, significatiua mustum plurimum coctum, 1. de alim. fac. c. 13. de attenuante vict. rat. 12.

Appetitus caninus, vehemens est comedēdi desiderium, quo & plur. ma. edunt, & maxime grauati paulo post reuolunt, 7. de comp. med. loc. c. 2. & 1. de sympt. caus. c. 7.

Appositio, quę & adiunctio & Prosthesis dicitur, finis est actionis quę ab attrahente vi perficitur, attractum n. & adductum nutrimentum singulis partibus apponit assi-

milan-

milandum. 3. de nat. fac. c. 1. vide Prosthesis.

Apſychia, i. animi deliquium, com. 2. in 1. prorrhet. 20.
& 1. aph. 23.

Aptiſtus, id eſt, morbus ſine ſputo, præſertim morbus lateralis cum pars dolens exquisite anguſta fuerit, & veluti alligans in ſeipſa, vniuerſum fluxum cobibuerit, 2. criſ. cap. 10.

Aqua inter cutem, id eſt, hydrops, vel hyderos, 5. de loc. aff. 7. 4. aph. 11.

Aquaticulus, qui & Pubes dicitur, & Epifion, eſt ea peſtoris pars in quem Thorax ſinit, ubi & maſculorum pudenda conſtituta ſunt, tum feminarum, ad femoris vtriuſq. exortum, ut ſub hoc occultentur, lib. introd. c. 10.

Aqueus humor, qui & albugineus, vide Cryſtallinus.

Aquosa urina, quæ & cruda dicitur, eſt ea quæ alba, & tenuis, 1. de criſ. cap. 5.

Aquofus humor, hydropis ſpecies ea eſt, quæ aſciton vocant, cuius proxima cauſa aquoſus humor eſt partim à iecinore manans, partim à tota carne corporis veluti in aquam reſoluta a quo aquoſo humore totum abdomen diſtenditur, qui colligitur inter Peritonæum & inteſtina, veluti in vtre quodam, unde illi nomen dedit, oppoſita alteri hydropis ſpeciei, quam Hipp. vocat ſiccum hydropem, qui & Tympaniaſ dicitur, vide aſcites, hydrops.

Aquula, vide Hydatis.

Arachnoides pulſus, aranea ſpeciem referens, ſiue aranealis paruus eſt, ac brevis auræ agitur mouetur, lib. finit. med.

Araotica, id eſt rarefacientia, 5. ſimpl. c. 14. vide anasto-
matica, & rarefacientia.

Aranea tela, eſt oculi tunica, quæ cum Rhetina, perfectâ ſphæram efficit, circundantem chryſtallinum humorem, diciturque

citurque arenæ, quia ad modum tela araneæ subtilis est, ne impediatur lumen ingrediens ad crystallinum, & albuginem, lib. de anatom. viii. vide Rhagois.

Arcuatus morbus, vide *arquatus*.

Ardens febris, vide *Synocha*.

Area, vide *alopecia*.

Argemon, est ulceratio, quæ in nigro oculi albæ apparet, in albo autem subrubra, lib. finit. med.

Argyrite terra est, quæ metallis sumpta, pluribus paruis terræ particulis, plures paruas argenti mistas hêt, 9. simpl.

Ariditas est summorum pilorum lanuginosa superficies, pulvere conspersis, ad similes, lib. finit. med.

Arithena, vide *aritennoide*.

Aritenoide est cartilago laryngis, tum ordine, tum positione, tum magnitudine tertia, in suprema innominatæ cartilaginis parte, sita, gutturnijs, infundibulisque quas arithenas appellant non absimilis, lib. vocal. instr. diss. cap. 4 unde aliqui eam aritenam vocant, 7. de usu par. 11. vide *Cricoides*.

Armatura cœceptus; ab Arabibus *Abgas*, tunica est postrema tenuis toti fœtui undique circumiecta, ipsius velut sudorem excipiens; quasi agninum à mollitie deducto nomine *Amnion* Græcis appellata, 15. de usu par.

Arquatus morbus qui & *Regius* & *Icteros* & *Auriginosus*, & *Arcuatus* dicitur, est bilis in summam cutim redundantia, interim cum febre acuta, interim sine illa, cum inferiorum adustione, & stomachi vitio, lib. Inerod. 5. loc. aff. 7. Clarius, *Flauabilis*, quando sui seruans naturam, una cū sanguine per totum corpus defertur, morbum facit, qui *Icteros*, i. *Regius* appellatur sola verò quando secreta est, & in aliquo membro consistit, herpes, 2. ad Glauco. x.

Arteria, est membrum ortum habens à Corde, concanū,

Viper eius concavitatem spiritus vitalis ad omnes corporis partes deferatur, lib. de anat. uiu. differt autem à vena, quod vena sit vas sanguinem continens, non pulsans, sed arteria vas est pulsans, lib. de caus. morb. c. 3. quondam nondum eas quæ similiter vt Cor, pulsant, arterias nominabant (in solam eā quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriā, arteriæ nomen inferentes) venas appellabant in totū velut alias quæ non pulsant, sic etiam pulsantes, postea verò consuetudine obtinente, arteriæ appellationem in pulsantibus dici propter equiuocationem asperæ nomen apponētes, eam quæ ex larynge in pulmonem descendit arteriam, asperam arteriam appellarunt, vñd cum hoc, quod ipsam etiam Brōchum vocant, quoniam chartilaginosa corpuscula, quæ plurima eius pars sunt, bronchia appellant, 7. de comp. med. 1. loc. cap. 1. Asperæ autem arteriæ dicuntur, quæ in pulmones diuise sunt quæ verò toto insunt corpore, quæque ex asperis arterijs contracto Corde, spiritum transumunt, læues, 7. de anat. adm. 4. Et 7. de usu p. c. 9. vide Aspera arteria.

Arteria crassa, vide Arteria aorta.

Arteria magna, vide Arteria aorta.

Arteria aorta, magna, maxima, crassa, homonyma sūt, significantia vnum omnium ipsarum arteriarum tanquam caudicem, a sinistro Cordis ventriculo propagatum, quæ omnes tum sibi inuicem, tum eorum pulsandi modo respondens, 7. de anat. adm. cap. 1.

Arteria venosa est vas a sinistro Cordis ventriculo ad pulmonem procedens, vt arteria vocetur, quia pulsat, venosa autem quia vena tunica vestitur; quæ verò ex dextro Cordis ventriculo est, vena arteriosa dicitur, vena quidem ab usu, arteriosa autem quoniam arteriæ corpus est duplici tectum tunica, 7. de anat. adm. 4.

Arteria emulgentes, sunt due propaggines magna, a maxima

*xima arteria quæ sping incumbit, profectè, non aliter quam
duè vena magnè quæ in renes inferuntur, quibus renes uri-
nam a sanguine secernunt & trahunt, quæ ratione vena &
arteria emulgentes appellantur, lib. de dissect. ven. 5. 14. &
16. de usu p.*

Arteria aspera, vide Arteria.

Arteriæ leues, vide Arteria.

*Arteria carotides, quæ & soporaria & apopletica &
subiecta dicuntur, sunt quæ à corde ad iugulum re-
flectà tendunt, atque ad partes collo superiores distribuuntur,
de dissect. art. & 16. de usu part.*

*Arteriam coniugem vocant, non eam arteriam quæ ve-
na est per membranas coniuncta, aut quæ se tangant, sed
eam quæ cū alteri adiuncta sit, ad eundem usum extiterit,
16. de usu p. cap. 13. nusquam enim vena ab arteria relin-
quitur sed ubi vas arteriosum videris, ibi necesse est venā
etiam esse, 16 de usu p. cap. 14.*

*Arteria, & Venæ Umbilicales sunt, quæ acetabulis utri-
usque adherescunt quibus fœtus in utero alligatur, & alimen-
tum trahit, 14. & 15. de usu p.*

*Arteriaca, Mos est recentioribus medicis arteria phar-
maca arteriaca appellare, non apponentibus, num antido-
tos dicant, an iuxta aliud significatum, quidam verò Ecce-
lesiæ nominant ipsa, non apponentes phar maca, at quidam
penitus nullum discrimen ipsis adscripserunt; aliqui verò
rarò addiderunt, alij ad vocem interceptam, alij adhuc ge-
neraliter ad vocem lesam, sunt qui & ad exasperatam arte-
riam, & ad exulceratā scripserunt, 7 de comp. med. loc. c. 1.*

Arteria trachea, vide Aspera arteria.

Arteria coronalis, vide Stephaniæ.

Arteriosa vena, vide Arteria uenosa.

Arthritis, siue morbus articularis, & artium vitium,

11. meth.

11. meth. 20. sunt & ex genere Arthritidis, Ischias, & Podagra, quod enim in omnibus articulis Arthritis est, hoc in uno, iuxta coxendicum quidem Ischiada, hoc est coxendicum morbum appellant, iuxta pedem autem podagram, 10. de comp. med. loc. c. 2. Vnde Arthriticos vocant, qui hoc articulari vitio laborant, 11. meth. 20.

Arthrodia, per sui oppositam Enarthrosin, clarius intelligitur, utraque enim est species Diarthroseos, id est dearticulationis; sed Enarthrosis est cum excipiens cauum admodum altum est, caputq; quod in id inferitur, oblongum, arthrodia verò, quæ cauum leuiter, & in superficie, & capitulum etiam depressum habet lib. de ossibus in præmio.

Articulus est naturalis ossium compositio, vel per diarthrosin, id est, dearticulationem quæ est ossium structura, quorum motus est euident, vel per Synarthrosin, quæ est ossium manifestum motum non habentium compositio, li. de ossibus in præmio. Sed rectius. Articulus est, cum duo ossa, ita inuicem coeunt, ut alterum quidem ipsorum sit quod mouetur, alterum velut sedes quadam ei quod mouetur, & firmamentum, ut ostiorum cardinibus apparet, unde manenti cavitas, glene, id est, pupilla, & Cotyle, ei quod mouetur conuexitas, & condylus dicitur, inest, 1. de motu musculi cap. 9.

Articularis morbus, vide Arthritis.

Artomel, i. iusculum ex pane, & melle, 10. meth. 6.

Artus, extrema corporis partes sunt, crura scilicet, & manus.

Arythmus pulsus est, non is qui absolutam abolitionem significat, omnique rythmo orbatus est, sed is, qui nativo rythmo caret, cui opponitur pulsus, qui Eurythmus dicitur, 1. de differ. puls. cap. 9.

Asaphya est vocis obscuritas, vel propter vocem explanantium organorum offensam, quam ex nervorum vitio contraxe-

traxerant, vel propter mentis laesionem, com. 2. in 1. porrbet. 3.

Ascarides, & Elminthes sunt tenues lumbrici, in parte præcipuè inferiore crassi intestini progeniti, rotundi verò siue teretes lumbrici sunt, vermes qui in superioribus magis intestinis generantur, adeo quod ad ipsum quoque ventriculum quandoque ascendunt; latus est, qui & longissimus est, & per tota sæpe extenditur intestina, 3. aph. 26.

Ascensus morbi, augmentum, incrementum, bononyma sunt, significantia totius morbi, siue paroxysmi, secundum tempus. 1. cris. 3. ubicunque accenditur, atque augetur caliditas præter naturam, istue ab alijs partibus sanguinè solere confluere, quo verò tempore confluit, illas quidè refrigerari priuatas sanguine est necessarium; quod verò patitur membrum grauari, ac distendi, ac sanguinem ipsum cōfluētem alterari, tum quia alijs quæ iam putruerunt superfluitatibus permiscetur, tum quia intrusum diffilari non potest, atque hoc tempus accessionis principium nuncupatur. Cum verò iam caliditas materiam conuicerit, tunc hoc tempus, & ascensus & augmentū vocatur; in hoc verò vsque adeò calor augetur, vt non modo locum exurat, qui est quodammodo putredinis focus, sed etiam continuatim per totū corpus dispergatur, ac cum iam ad summū feruoris deuenerint humores accensi, id accessionis tempus consiliētia appellatur, tunc verò vniuersum laborantis corpus igneū videtur, extensa per totum equaliter caliditate, 2. de differ. feb. 11.

Ascia est reuolutio fasciæ, quæ cum parum a recto declinet, in obliquum nondum euadit; a fabrorum ascia, quæ paululam a recto abiens, in summitate decuratur, dicta 3. de fract. 21.

Ascites hydropis species est, in qua in membrana abdominis interiore peritoneo Græcè dicta, humor veluti in vitre quodam

quodam continetur, unde eam vocat Hipp. aquosum hydropem. Contra Tympanias quam siccum hydropem vocat, in qua abdomen percussum talem sonum edit qualem timpana, quoniam in illis per cutem extentam subiectus aer percuitur, quemadmodum aer in hoc morbi genere qui in profundo locatur, 4. aphor. 11. quem etiam utricularium hydropem vocant lib. finit.

Asellos, vide Axes.

Asema, crisis est quacunque à nullo dierum indicatium antea fuerit, indicata. Unde sine signo dicitur, 3. de Cris. 10.

Asitia, idest, ciborum abstinencia, aliquando etiam vaforum inanitia asitia dicitur, tanquam nomine generis in speciem uti liceat, 2. de rat. victus, 47.

Aspera arteria est particula simplex in animalis corpore, quæ aliarum omnium est durissima, solo osse mollior, quæ Græci Chondron, idest, Chartilaginem vocant, quam totam in exactam naturæ circuli circumferentiam cōtorfit, circulatorum multa serie continua in longitudinē interiore cōpositorum, à pharynge ad pulmonem usque pertingens, sanguine vacua, 7. de usu part. cap. 3. eademq. prout corpus est ex chartilaginibus ut instrumentis vocis, & ex vinculis membranosis, ut instrumentis respirationis compositum, trachea arteria dicitur, ibidem cap. 6. quam bronchon nominant, ibid. cap. 11.

Asperæ arteriæ dicuntur cum euerse sanguinolentiores apparent, & magis asperæ carnosæq. & sici acinis similes, lib. Introd. cap. 15.

Asphyxia, idest, pulsus priuatio, cum non percipitur nostro tactui motus, atque hoc per totum animal accidat ut nulla usquâ arteria moueri videat, & si ad veritatē exigas in corpus viuum nunquâ cadit, 1. de præsag. ex puls. c. 3. quâ Hip. vocat spirituum interceptionem, 4. de rat. victus, 26.

C Aspredo

Aspreo oculi est duritia & asperitas inaequalis, quae intra genas oritur, lib. finit.

Assa, idest, stomachi fastidium, 4. de sanit. tuen. cap. 4.

Assidentia signa, quae & mox apparentia dicuntur, distinguuntur à pathognomonicis seu passionis significatiuis signis, exemplo morbi lateralis in quo acuta febris, spirandi difficultas, tussis, pungens dolor lateris, passionis significatiua sunt, quod autem dolor ad hypochondrium, aut ad clauum perueniat, aut quod facilius in latus patiens quam in alterum eger decumbat assidentia signa sunt, 1. aphor. 12.

Assimilatio, & assimilatrix facultas est, quae ab actione ipsa generaliter alteratrix, membratim assimilatrix dicitur, quae id quod nutritur alteratur, & ei quod nutritur simile fit, 3. de natur. facult. cap. 1. naturalium actionum prima, ac propemodum maxime necessaria nutritio est, quae alteratricis actionis quadam est species, est enim & concoctio, quae in uentre agitur, alteratio, non secus autem, & quae in uenis, quibus accedit ea, quae in quaque est particula, postquam quarta est, quam assimilationem uocant, nomine quidem a nutritione dissidens, re autem non dissidens, 3. de caus. sympt. c. 2.

Assistentes, sine asites glandulosi, uide Glandulosi.

Asibma, idest, anbelatio, affectus est in quo propter angustiam organorum spiritus, apparet summum m. ueri usq. ad operta scoptula thoracem, etiam citra febre, quā eia ij, qui uelociter cucurrerunt habent, quiq. respirando pinnae narium mouent, quas in spirando contrahunt, expirando dilatant, com. 2. in 3. de morb. vulg. 4. uide Aibelosi.

Astites, uide Glandulosi assientes & Parasiate.

Astragalus, idest, talus (os ballistae vulgo) 3. de usu par. cap. 6. est principalissimum ossum, quae ad pedes mouendos pertinent, in circumferentias quasdam desinens, magnum quidem

quidem & maximis supernis offibus dearticulatum, in medio tibiae, & calcanei locatum, ibidem, cap. 8. est *Astragalus* fruticellus exiguus. 6. de simpl. med. facult.

Astrictio est densitas, & necessariorum excrementorum suppressio, ad *Trafibulum*, cap. 27.

Ataxia, & *Acosmia* est ordo decretorius dierum febri-
lium, 3. progn. 7.

Ater succus est quartus naturalis humor in ordine frig-
gidus, & siccus, (cui humori nullum aliud proprium nomen
est inditum) sanguinis sex. qui humor cum ex vitione qua-
piam, ac putrescentia in acidam migravit qualitatem, id
atram bilem nuncupant, siue radentem, 2. de natur. facult.
cap. 9. vide *Acida bilis*, & *melancholicus humor*.

Atheromata, *Steatomata*, & *Melicerides*, alij quidem
inter abscessus reponunt, alij verò ad aliud genus referunt;
omnes tamen tumores præter naturam sunt, quorum natura
ex ipsis nominibus patet, pulticulæ enim aliquid simile ip-
sis atheromatis inuenitur, melli vero in ipsis meliceridib.
sæuo autem in ipsis steatomatis, lib. de tum. ca. 5. ipsum ve-
ro atheroma Græci atheran vocant, 14. meth. c. 14.

Athera, vide *Atheromata*.

Athymia, i. animi defectio, 6. de loc. affect. cap. 1.

Atrabilis, vide *Acida bilis*, & *Ater succus*.

Athroos, est secretio in ipso diuidentium genere, vide-
turq. in omnibus sensibus commune, in se autem passio rem
ex secretionem, ac diuisione continui. vniique corporis tum
excitari, cum ea vel uniuersa, vel magnis portionibus, &
celeriter quod Græce *Athroos* voco, incidit, 1. de sympt.
caus. cap. 6.

Atrophia est, cū particula aliqua corporis, vel diminu-
te alimentum attrahat, vel non trahat, vel perperam tra-
hat, vnde corpus nutritur, siue id quidem quod nutrit, &

quantum & quale esse oportet, suppeditatur, ceterum symptoma aliquod in retentrice facultate incidit, simile his quæ in ventre sunt dicta, atrophia sic quoque tentabitur, excreticis quoque vitio id accidit, cum plus quam opus est vacuat, de sympt differ. cap. 4. & 1. meth. 9. Est adhuc atrophia in oculo, cum ex longa imbellicitate, vel alia quadam latente causa, paululum quasi propulsus deinde cauatus ad radicem, cum dolore minor euadit, obscureq. aut nihil omnino videt, lib. Introd. cap. 15.

Atrophus, i. corporis particulæ, quæ ex nutrimento fructum non sentiunt, 2. meth. c. 7.

Attonitus morbus, 1. *Apoplexia*. 2. aph. 19. quæ & morbum stupidum vocant, 8. de placit. c. 6.

Attrahens virtus est qua peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere & attrahere potest; altera quæ generatim alteratrix dicitur, qua succus attractus similis euadit parti quæ alitur. quæ membratim in hepate, sanguificatiua dicitur, Retentrix qua pars attractum succum coquit, donec in suam ipsius naturam eum mutauerit, Expultrix quæ a Coctione quod inutile est secernit, idque excrementum vocatur, 5. de loc. aff. c. 7.

Attrahens, siue *Attrahentia*, siue *Epispastica* facultas est, quæ ex alto vehementius attrahit, propter essentiam calidam, & tenuium partium, siue talis essentia sponte nata sit, siue ex putrefactione acescente generatione sortita; directe opposita repercutienti, & adstringenti virtuti, quæ in altum occurrentes sibi succos repellit, 5. de simpl. c. 17.

Auditorius meatus est, rotundum foramen, quod ad aures pertinens non solum usque ad Cerebri membranam pertinet, sed et nervum contingit. qui in ipsum à Cerebro descendit, 6. meth. 6. quod & cæcum foramen dicitur. lib. de nervor. dissect. c. 6. *Græc* τυφλὸν τρήμα, vide *Aures*.

Auditus

Auditus grauitas, vide Obauditus.

Augmentum morbi, vide Ascensus.

Aures, qua frons, ad tempora porrigitur, in ipsius terminis sita sunt; quarum pars aperta Ala dicitur, refracta ab interiori in posterius ipsis summitatibus inflexis Cubiformis sub qua semicirculus rotundus in mucronem exurgēs, Grace Xyster appellatur, huius acuminis concavum quod subiacet Cōchula, in cuius medio rotundum foramen, meatus auditorius nuncupatur, lib. Introd. cap. 10.

Aures Cordis, sunt duo sinus Cordis. concavi, nigriores, nervosiores & magis cuticulares Corde, utraque Cordis parte, sinistra & dextera collocata, ad similitudinem aurium sita, 7. de anatom. adm. cap. 9. nominata autem porro ita sunt, non ab utilitate, aut actione aliqua. sed à parua similitudine, quod utrinque Cordi ipsi, ut animalis capiti, aures adiaceant, 6. de usu p. cap. 15.

Aurigo, & Auriginosus, vide Arquatus.

Autopsia, est eorum observatio & memoria, quæ proprio intuitu unusquisque inspexit, de part. art. med. cap. 2.

Autopyrus, qui & Syngomistius dicitur, panis genus est, quod ex farina uniuersa comportata, non discussis fursuribus, constat, lib. de ren. aff. dignot. cap. 6. Syncomistum panem vocant, qui medius est inter exquisite purum, & fursuraceum; vocant autem nonnulli eundem panem Autopyrum, quoniam in puro farinam, non qualis natura est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes fursur excernunt, contra autem in fursuraceo prius adimunt eam farinam partem, quæ purissima est; panis autem qui Autopyrus appellatur, qualem habet ex natura farinam, triticum, talem etiam seruat. 2. ad Glau. 7.

Auulsa, vide Auulsio, & Apospasmata.

Auulsio, est cum ossa, quæ membrum colligant, diuulsa

dicuntur, com. 3. in lib. Hipp. de his quæ in medicat. 31. vi-
de Unionis solutio.

Axes ipsas, Asinos appellare consuevit Hippocrates,
& paruos axes, *Asellos*, quas etiam succulas vocant, 2. de
fract. 48.

Axillaris vena est, quæ per axillam percurrent, maior
humerali per totum brachium in ramos scinditur, dicitur-
q. hepatica, 3. de anat. adm. cap. 5. eademq. subalaris, basili-
ca, vena cubiti interna appellatur, lib. de anat. vir. & con-
tra Erasistratum c. 6.

*Axiomata propositiones indemonstrabiles vocant, 1. me-
th. 4.*

*Axungiatæ, omnes soliti sunt vocare adipem suillum ve-
terem, 1. de comp. med. per gen. cap. 4. vide Adei 4.*

Azygos vena, est propago una ex venæ cavæ superioris
trunco exorients, parte dextra, & octo costis inferioribus
inserta, quam sub corde oriri semper à se observatum fuisse
testatur Gal. 5. de loc. aff. 2. & initio secundi de vict. rat. &
3. de usup. in ijs videlicet corporibus, in quibus thorax lon-
gius erat, nostro verò seculo propter thoracis breuitatem,
supra Cor, & pericardium exoritur, ad quintam plerum-
que thoracis vertebam.

*Azymus panis, id est fermenti expers, 1. de aliment. fa-
cul. cap. 2.*

B

B *ANLISTAE os, vide Astragalus.*

Barycoia, siue Obauditus, siue Obauditio, est auditus
grauitas, & difficultas, proportionem respondens Amblyo-
pie, quæ est visus hebetudo, siue diminute videre, 1. de caus.
symp. cap. 4.

*Basilare os, quod & os palati, os Cunei, os Sphenois di-
citur,*

citur, est os quod toti Caluaria subſternitur, quod à non nullis inter Capitis, ab alijs inter Maxille ſuperioris oſſa, cum inter utrumque ſit medium, numeratur, cap. 1. lib. de oſſib & in fine, 11. de uſu p.

Baſilica vena, vide Axillaris.

Baſis Cordis, quam alijs caput viſceris appellant, eſt vertex Cordis figura turbinatus, quæ & circulus eſt, 7. de anat. adm. c. 3. quam & mucronem appellant, 2. de placit. c. 4.

Bathmides ſunt brachij concavitates, quas extendentibus totam manum, & ſectentibus, Cubiti ipſius Coronæ ingrediuntur, 2. de uſu p. cap. 15.

Bechica medicamenta ſunt, quæ tuſſim ſedant, vel cient, 1. de ſimpl. cap. 1.

Belenoides os, vide Graphoides, & Lithoides.

Beneolentia dicuntur, quorum vapores à corporibus deſtillantes ambientem permitti, ac deinde per narium inſpirationem in Cerebrum delati, familiares ſunt Cerebri ſpiritus, pro portione quadam ad ea, quæ lingua ſunt dulcia, è contra, graueolentia, 4. de ſimp. 22.

Berenicium, quod eſt nitrum, vel ſpuma nitri, 6. de compoſ. med. loc. cap. 1.

Bilis ſimpliciter ſi proferatur, ſive bilioſus humor, audiſmus pallidam & amarā, non acidam et nigram, hanc. n. ſemper cum adiectione nominamus, appellationi humoris colorē adiungentes, lib. de tumor. c. 9. Bilis, ſine adiectione flauam & amarā ſignificat, ſed cum adiectione bilis atra, humorem melancholicum. 7. apb. 32. & 1. de nat. hum. 27. & com. 5. in 6. de morb. vulg. 14.

Bilis acida, vide Acida bilis.

Bilis æruginosa, vide Bilis pallida.

Bilis amara, vide Bilis ſimpliciter.

Bilis atra, vide Bilis ſimpliciter.

Bilis flaua, vide Bilis pallida.

Bilis isatodes, vide Bilis pallida.

Bilis nigra, vide Nigra bilis.

Bilis pallida est, quæ ex bili syncera, & tenui aquosa, serosaq; humiditate quibus urina, sudorq; prouenit, constat, Flaua verò quæ & Vitellina dicitur colore pallidior, tenui humiditate constans, sed crassiori quam pallida, crudo vitello onorum & colore & consistentia similis, in vasis genita. Porracca verò in ventriculo genita, porrorum colori similis, Aeruginosa, quæ ærugini assimilatur. Isatodes autem bilis, quæ ab Isatide cæsum colorem referente, dicta est; sic etiam & rubram non nulli bilem nominarunt, quæ consistentia ad tenuem sanguinem proxime accedit, sed quoniam non concreuit, idcirco bilem eam nominant, lib. de atra bile, cap. 2.

Bilis porracca, vide Bilis pallida.

Bilis radens, vide Acidabilis.

Bilis rubra, vide Bilis pallida.

Bilis vitellina, vide Bilis pallida.

Bis feriens pulsus, vide Dicrotus pulsus.

Blesum corpus est, cuius pectus prouum in partem anteriorem redditur, Rhabum autem cum posteriores partes, quæ ad spinam pertinent, gibba redduntur, lib. de caus. morb. cap. 7.

Blena, siue mucus, est humor per palatum, & nares defluens, cum concoctus est, veluti cum crassior minus acris, & modicus descendit, propterea & crassior pituita ab Hipp. vocatur, lib. de totius morb. temp. cap. 3. & 2. de sem. c. 6. vide phlegma.

Borborignosus est sonus, vel murmur, in crassis intestinis factum, cum excrementorum sunt vacua, humidum excrementum denuncians, 3. de sympt. caus. cap. 2. vide Physis.

Bothor,

Bothor, vide *Exanthemata*.

Bothrion, est *ulcus cauum oculi*, parum angustum, *puncturis rotundis simile*, *ulcusculo altius*, lib. *Introd. cap. 15.*

Bothria, vide *Phatbna*.

Brachiale, quod *Græci Carpon* dicunt, *Arabici Rasfetta*, est *prima pars palme manus octo constans ossibus*, in superficie leniter gibbis, sinuatis intrinsecus, lib. *de ossibus*, cap. 18. cuius inferior pars quattuor ipsis ossibus, quæ quasi post brachiale, vel metacarpium dixeris, colligatur, ibid. capit. 16.

Brachichonius, vide *Polychronius*.

Brachium, totius manus pars maxima, cuius termini inferne sunt articulus, qui in curvatura cubiti est, quem *Anchona*, siue *Cubitus* cui innitimur, vocamus, superne autem rursus, humeri articulus, lib. 2. *de motu musc. cap. 2.* *Brachium* appellatur, quod inter duas iuncturas humeri, & cubiti intercedit, totius brachij pars: *superhumeralis* vero, id est *Epomis*, superior humeri pars, quæ ad collum vergit, nam humerus totum id, quod in dearticulatione hac apparet, vocatur, nam quod non apparet à posteriori parte est os scapulæ, ab inferiori est id, quod dum totum brachium attollitur, manifestum fit, quæ ala nominatur, 1. *de artic. 4.*

Bradypepsia, vide *Concoctio*.

Branchos, quos *raucedines*, *de stillationes*, & *Coryzas* nominant, 5. *de sanit. thæn. cap. 8.* Qualis in ventre, *diarrhæa* passio ex mala concoctione fit, tale est in Cerebro *Catarrhus*, & *Coryza*, *Catarrhum*, scilicet nominantibus nobis, q. cū superuacuum est in os diffluit, *Coryzam* cū in nares, *Brāchos* autem, siue *raucitas catarrhis* superueniens, faucibus scilicet humore imbutis, quod si in Gargarionem fluxio procumbit, aut quam ex similitudine *Græci Staphylem*,

lem idest acinum vocant in ea gignit, aut aliàs eam in tumorem attollit; at si in glandulas quæ sibi ex aduerso in oris termino utrinque iacent, antiadas: si autem in ea quæ ijs proxima sunt, paristhmia, 3. de sympt. caus. cap. 4.

Bregmata Latini sinciput, sunt duo sincipitis ossa utrinque quatuor rectis lineis circumscripta, una quidem per futuram in longum porrectam, utrique ossi communem, posterius autem lambdoidis futura lateribus, anterius verò coronariæ vocata, utraq; autem parte, squamosis commissuris, com. 3. in 6. de morb. vulg. 1. quæ vulgo parietalia appellantur, vide Bregmatis ossa.

Brenis pulsus, vide pulsus latus.

Bronchia, sunt aspera arteria & cartilagines, Sigma litera figuram referentes, 4. loc. affect. cap. 8. vide Arteria.

Bronchocele, idest gutturis tumor, 2. de comp. med. loc. cap. 17.

Bronchon, idest, trachea arteria, 7. de vsu par. cap. 11. vide Aspera arteria.

Bubo est tumor, præter naturam, in collo, & secus aures, vel inguina, ijs quibus in collo, capite, vel aliqua vicina parte vel prope magnam arteriam aut venam vlcus est natum ortus, 13. meth. cap. 5. vide Struma.

Eubonecele, est tumor mollis in inguine factus, peritonæo vulnerato, aut rupto, & postea non conglutinato, diciturque ramex in inguine, quod si Umbilico hoc accadat, dicitur Exomphalos, lib. de tumor. c. 16.

Bulimos est vehemens esuritio, ex indigentia simul, imbecillitate, & refrigeratione oris ventriculi, orta, 1. de caus. sympt. c. 7. differt autem Bulimos à canina appetentia, quod ille sit casus potentiæ ex frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoauit, sed non habeat eam amplius adiutam, Caninus autem appetitus fieri consuevit, vel propter

solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores acidos, quos exorbu it os ventriculū. 2. aph. 21.

Bulla, i. pustula oculis nata, 9. de simplic. med. fac.

Bursa testium, est communis tunicarum, utrumque testem cooperientium rugosus sinus, utriusque testiculo circumdatus, Oscheon Græcis, Latinis Scrotum, alijs Scrotum, dicitur, lib. de consect. vulua, & Introd.

C

CACHEXIA, prauus corporis habitus est, i. meth. 9. in Cachecticus, idest, mali habitus homo, libr. de cur. rat. per sang. c. 19. vide habitus.

Cacochymia, vitiosus succus, vide Plethora.

Cacoethe ulcera ex dysepulotis clarius intelliguntur, quæ enim ex humorum confluxu, vel multorum vel acrimiarum oriuntur, sine eo quod locus affectus hanc dispositionem habuerit, ut licet bonū sit, quod influit, tñ ipsum corrumpat, Dysepulota nomino, quæ verò dictam dispositionem iam obtinent, præcipuo vocabulo cacoethe, idest maligna, appello, 1. de compos. med. per gen. cap. 18. sed generalius, quæ ulcera omnibus ritè decenterq; factis non sanantur, ea medicari cacoethe, idest maligna, contumacia, rebelliaq; dicimus, 4. meth. 5. Adhuc generalius. Cacoethes morbos, idest malignos appellamus, quicunq. periculum minantes spem salutis non adimunt, nam quod summe perniciosum existit symptoma, non cacoethe, sed mortiferum dicitur, co. 1. in 1. prorrh. 14.

Cacophonia, idest vitiosa vox, de sympt. diff. c. 3.

Cacosphyxia, idest vitiosus succus, ibid. cap. 4.

Cacotrophia, idest, vitiosa nutritio, ibidem.

Calcboidea ossa, sunt tria ossa parua circa calcaneum posita.

posita, quæ certis nominibus carent, inferiori nauiformis parti per synarthrosin copulata, cū quibus etiam exterior ex parte Cyboides pariter porrigitur, 3. de usu par. & de ossib. cap. 24.

Calcaneus seu os *Calcis* quod Græci *Pterim* vocant, maximum, & principalissimum est pedis os, quæ ad firmationem pertinet, quod *Astragalo* subest, 3. de usu p. & de ossibus, cap. 24.

Calcis os. vide *Calcaneus*.

Calculus siue *Calculosus* morbus est, ubi in renibus collecta cum proportionali febre crassorum humorum copia, à qua superassati ad calculi generationem transeunt, lib. finit.

Calefcere & *Calefactum* esse, non parum refert dicere exemplo lebetis, & aquæ calidæ, feruens enim in frigidum lebetem iniecta, vel feruens lebes aquam frigidam excipiens, illic aqua calefacta est, lebes calefit, iuxta *Typum putridarum febrium*, hic lebes calefactus, aqua calefit, ad morem febrium hecticarum, 1. de diff. feb. cap. 1.

Calicreon siue *Pancreon*, caro glandulosa est, substrata arterijs, venisq. quæ ea parte in ramos capillare finduntur, lib. de ven. & art. dissect. cap. 1. vide *Pancreas*.

Calidum hoc ipsum verbum aliquando transferimus ad qualitatem, cuius proprium nomen est caliditas, aliquando denominatiue totum corpus dicimus calidum à caliditate, estq. hic modus loquendi plurimus in omni vita, 1. apb 14. Sæpe etiam Hipp. à qualitatibus nominat elementa, calidū quidem appellans, neque solam qualitatem, neque quod ab eius exuperantia dicitur, sed corpus quod summam participat qualitatem, ut ignem, 1. de elem. cap. 8.

Callosum corpus, idest, calli naturam referēs, regio quædam in Cerebro est, in qua naturalis concavitas esse videtur, quæ ex superiacentibus, & circumdati corporibus, portionem

sionem alimenti non perfectè elaborati, peritoma, siue recrementum vocant, recipit, 9. de anatom. adm. ca. 3. quod recrementum ab Arist. excrementum dicitur, libr. de instrum. odor.

Callus, idem quod Cladus Græce Pylus, 6. simpl. dicitur. que etiam Tophus, ex crudo humore qui crassus est ad similitudinem puris crassioris, 10. de comp med. loc. ca. 2. vide Myrmecia, & Tylosis.

Caluaria, siue Cranium, os capitis appellatur, lib. de ossib. cap. 1. vide Cranium.

Caluata, ferramenta appellat Hippo. quæ rotunditatem quandam leuem in extremis partibus habent, cuiusmodi sunt, specillorum capitula, & quæ Nucleata appellantur, & spatularia. Oblonga verò his contraria nuncupat, quorum extrema minimè sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionem interpunctiones accommodatis instrumentis quodam modo similia, 1. de artic. 43.

Caluities est capillorum defluuium, propter humorum ex quibus nutriri consueuerunt, inopiam; si verò propter eorundem humorum vitium, corrumpantur, & cadant, nō caluities, sed Alopecia, & Ophiasis dicitur, 1. de cōp. medic. loc. cap. 2. vide Madarosis. Capitis sane cutis, pueris mulieribus, & Eunuchis humida est, sed Caluis immodice arida. Cerebrum quidem in iuuenibus molle cum sit atque humidum, Caluariam tangere, omnemq; internam inanitiem cōplere, in Senibus verò siccescens, subsidensq; ab ea distare sepius in animalium dissectionibus conspexistis, in quibus caluescentibus syncipitis ossa, fistulosiora alijs, & molliora ac super incumbencia ob Cerebri defectus exarescunt, cum ad ipsa vsque non pertineat, neque ea attingere possit substat enim, in suamq; ac ipsius basim depressum cadit consequenter igitur, ossibus istis resiccatis, & ipsis obtenta cu-

is inarescit, atque ipsi sensui valde sicca in Caluis apparet, ut rationali demonstratione nō egeat, com. 3. in 6. de morb. vulg. 2.

Calx, est totius pedis posterior pars, lib. Introd. cap. 1 & Clarius. Calx est os pedis maximam, ossi scaphoidi subiectum, quod & rotundas ex talo partes recipit, & geminos quos habet excessus, in sinum eius inserit, parte, qua ingredimur leuiter rotunda, & latiuscula, lib. de ossib. 24.

Camariō siue Psallioides corpus est, pars cerebri, quæ supra communem cavitatem est (qua Cerebrum Cerebello sua perforatione committitur) velut domus tectum quoddam in sphaere superficiem concavam circumacta, ad similitudinem testudinum, & Fornicum, quibus Architectores vtuntur, 8. de usu p. c. 11. vide Fornices.

Camarosis, est ossis perruptio, cum ex alterutra refractū parte, similem Camera figuram acceperit, lib. finit. unde recentiorum non nulli vehementissimas fracturas Camaromata, & Engosomata vocant; Engosomata quidem, quæ in medio sui membranae innituntur, Camaromata verò, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent; Caterum, qua primum ab integris fracturae partibus diduci agra cepit, intro magis recedunt, ac mēbranæ innituntur, 6. meth. 6. Camisia fœtus, vide Chorion.

Campylon, vide Helosis.

Cancer, est tumor præter naturam fusci, & liuidi coloris, in quo venula quædam exaltata primò occulta (quando, & Cancrum latentem vocant, lib. de uirib. cap. 4.) deinde manifestæ a crasso, & nigriore sanguine feci vini asimiles sunt, 14. meth. 9.

Canina cupiditas, est praua qualitas oris ventriculi multa impetuosè ingerentis, nec potentis deuoratorum pondus sustinere, quare, ea supernè, vel infernè excernere cogitur,

gitur, ita in renibus quoque, & diabetica passione accidit, serosę humiditatis cupiditas, unā cum virium imbecillitate, unde & humiditatem affatim attrahere, ac eam deinde in vesicam impellere coguntur, 6 loc. aff. cap. 3. vide Bulimos.

Canini dentes, quos Græci Cynodontes vocant, sunt duo utrinque mandibula superiori, & inferiori hærentes dentes, qui Caninum dentibus quam simillimi sunt inferiore basi, lati, parte superna acuti, quibus singule quoque radices longissimæ insunt, ut si quid propter duritiem ab incisori- bus dentibus scindi minus potuit, id frangere possint, lib. de ossib. cap. 5. vide dentes.

Canities, est pilorum ante legitimam ætatem in album commutatio. lib. finit.

Canthus oculi, vide Anguli oculi.

Capillaris vena, vide Apantismus.

Capillitium, vide Trichiasis.

Capistratio, vide Phymosis.

Capitis vena, & Cephalica, & humeraria, & externa dicitur est quæ ex iugularibus externis iam diuarcatis, quibuscum radicem habet communem, utrinque extra thoracem ascendit, & per humerum in externam brachij regionem declivius excurrit; initio secundi de ration. vi. 1.

Capreolaris, siue hederarius anfractus, est arteriarum, & venarum ad utrunque testium descendantium non recto itinere instar Capreoli, aut hedere varijs modis invehit- rum, connexus, 1. de semin. c. 12. vide Glandulosi assistentes.

Caprizans pulsus est, ubi motum arteria interpellat qua-
piam in parte, ita ut motus à quiete alter celerior primo, & vehementior sit, 1. de differ. puls. c. 29.

Capsula cordis, idest Pericardium, vide Membrana Pe-
ricardios.

Caput, est ea corporis pars, quam nonnulli ventrem superiorem nominant, collo terminatur, & partes animales continet.

Caput cordis, est ampla, & orbicularis superna eius basis, 6. de vsup. cap. 7.

Caput ossis, est extrema tenuis processus ossium pars, crassior, & orbiculata, lib. de ossib. in proem.

Caput purgiae sunt medicamenta omnia, quae capitis purgandi gratia infunduntur, sine naribus, & dicuntur Errhina, siue ori, ut colluendo, vel mandendo per sputum caput purgent, & vocantur apoplegmatica, 5. de simpl. cap. 20.

Carbo (qui & Carbunculus) dicitur, cum melancholicus humor in cutem decumbens simul cum febre, exanthemata per cutem crassescentem, siccescentemq. oriri facit, asatum sanguinem indicans, lib. de atra bil. c. 4. Carbunculus vlceris est, crustam cito cum inflammatione totius partis circumdat & valida faciens, ut & febres vehemens, & extrema pericula inferat, 5. de comp. med. per gen. c. 15. cuius crusta nigra est, & cinerulenta, aliter quam quae sanguine suffusa sunt, aut quae algore frigent, non enim vehementer liuidus, ut in illis tumor est, sed habet aliquid splendens, ut bitumen & pix, talis autem est exacta atra bilis, lib. de tum. c. 6.

Carbunculus, vide Carbo.

Carcharaconta, dicuntur animalia, quae serratis sunt dentibus, ut Ursus, Leo. 9. de anatom. adm. cap. 1.

Carcinoma in utero est tumor sine ulceratione inaequalis, & verrucosus, lib. finit. quem etiam à Canero animali Carcinon vocant, ibidem.

Carcinos, vide Carcinoma.

Cardia hoc est cor, quod non solum ei visceri, quod sui natura palpitat, nomen fuit apud antiquos, sed etiam, ori ventriculi, pro confesso habetur, apud omnes, 4. aph. 65.

Car-

Cardiaca dispositio est innati roboris labefactio, & languor, fit plerumque conflante ore ventriculi & stomacho cum sudorum immodica vi; sunt qui Cardia, id est, Corde phlegmone laborante fieri affectum putauerint, atque ab hac virium exsolutione, quod euenit malum, cardiacā, vel dispositionem, vel syncopim nominarint, 1. de causis sympt. cap. 7. & lib. finit.

Cardiacus morbus, vide Cardialgia.

Cardialgia, id est, cordis, seu oris ventriculi dolor, & morsus, qui & Cardiogmos dicitur, à forti ventriculi aestu, flauabile in ipsius tunicis ebulliente, genitus, 5. aph. 65. dicitur etiam Cardiacus morbus, lib. 7. introd. cap. 13. & 8. de comp. med. loc. cap. 1.

Cardiogmos, vide Cardialgia.

Carnosa cutis, vide Musculus cuticulosus.

Caro vocantur tantum ea, quæ in masculo est, reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci, sed quæ in visceribus, ceu iccore, renibus, liene pulmone visuntur, eas parenchymata, quasi effusiones dixeris, Græci vocant, quæ in intestinis, ventriculo stomacho, & utero sunt, sine nomine relinquunt, 1. 1. meth. 11. parenchymata autem eas partes vocant, non carnes, propterea quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia concrefcit, 11. de simpl. in initio.

Caros siue Sopor, est deperditio sensus, & motus in toto animalis corpore, illesa manente spirandi facultate, laesa autem anteriore Cerebri parte, & temporum musculis; si verò spirationem adeò vehementer opprimat, ut quis vel magno conatu vix spirare possit, eorum exemplo qui per grauem somnum stertere solent, Apoplexia nominatur, 4. loc. aff. cap. 2. & 13. meth. 21. & com. 2. in 1. prorrhet. 29.

Carotides, id est *soporaria arteria* sunt, *duæ illæ quæ ab arteria magna, à sinistro Cordis ventriculo emergentes, rectè ad caput feruntur, tamquam vasorum propagines, omnibus, quæ sunt supra Cor, partibus distributæ*, 16. de usu par. c. 12. & 1. de placit. ca. 7. sed has non rectè *Carotidas*, & *Soporarias*, & esse & dici censendum est, sed iam obtinet nomen ex multa omnium qui post Hippocratem fuerunt Philosophorum, & Medicorum ignoratione, censentium, Soporem affectionem esse, dictarum arteriarum, 1. de placit. cap. 7. vide *Soporarię*.

Carponi, & *Carpos*, vide *Brachiale*.

Caruncula, nunc partes sunt substantiæ intestinorum, quæ in difficultate intestinorum excernuntur, aded magnæ, ut possimus eas carnes nominare, 4. aphor. 26. nunc verò carnosam quandam particulam, in summo ore pendentem, quam & (*olumellam* vocant, significant, 6. de comp. med. loc. cap. 3. vide *Gargareon*, & difficultas intestinorum.

Casus, qui & signa, & symptomata mox apparentia dicuntur, 1. aph. 12. vide *Indicatoria signa*.

Cataclida, sint *Subclaviium* dixeris, primam Thoracis costam parvam significat lib. de musc. diff. Et. c. 12.

Catagma, id est ossis fractura, 2. meth. c. 2.

Catagmatica emplastra, quæ & *Cephalica* vocant, sunt quæ *Caluariae fracturis* accommodantur, habentq; abstergerendi, digerendi, & siccandi potestatem, 2. de comp. med. per gen. cap. 16. Dicuntur, & (*catagmatica ligamenta*, quæ fasciarum instar ossis rupturæ deligantur, 1. de comp. med. per gen. cap. 4. vide *Cephalica emplastra*.

Catalepsis, est deperditio sensus visus, apertis palpebris, servata tamen secundum naturam spiratione, in qua posteriora Cerebri potius afficiuntur, 4. loc. aff. cap. 2. licet alibi *Catalepsim* dicat esse spiritus cohibitionem, lib. de musc. diff.

diff. cap. 16. & alibi dicat Catalepsim fieri refrigerata prima parte sensitiva, id est, Cerebro ipso, quæ refrigeratio cum fortis fuerit mixta humiditati, facit lethargicas passiones, cum siccitate verò eas, quæ a Græcis Catalepsis dicuntur, i. Deprehensiones, 2. apbo. 3. eundem affectum Catoche, et Catbocon vocant, 4. de caus. puls. c. 16. vide Catoche.

Catalotica medicamenta sunt, quæ cicatrices græssas, comedendo æquant, & limpidant, lib. de Dynamid.

Cataphora, id est, veteriosa ad summum delatio, pro rhet. 1. qua agris sopori graui simile quid obuenit, fiuntq. tum omnis sensus, tum vocis expertes, 1. de diebus decret. cap. 4.

Cataplasma, compositio est, ex aliquo farina genere. & aliquo humido, siue vntuoso, 3. de compos. medic. per gen. cap. 2.

Catapotia, i. pilule, de remed. par. fac. c. 6. vide pilula.

Cataptosis morbus non est, sed symptoma comitalium, at tonitam concidentiam sine temporis spatio factam, significans, lib. de tot. morb. temp. cap. 4.

Cataracta, siue suffusio, est aqua inter vneâ, & crystalinum humorem coagulata, prohibens spiritum visibilem ab oculo exire, lib. de ocul. par. 4. cap. 12. vel suffusio est, cum cernendi facultas, uel in partem deperditur, apparente, siue non apparente in oculis malo aliquo, propriaq; affectione non molestatis, sed aut oris uentriculi, aut cerebri cognatione, 4. loc. aff. c. 2. quam uocant Græci Hypochyma, 10 de usu p. c. 1.

Catafarca, uide Anasarca.

Catascchesin, dispositio est, quæ facile discutitur, quæ apponitur heclicæ dispositioni, id est illi, quæ tenaciter inhaeret, 3. loc. aff. cap. 2.

Catastasis, uide Constitutio.

lem idest acinum vocant in ea gignit, aut aliàs eam in tumorem attollit; at si in glandulas quæ sibi ex aduerso in oris termino vtrinque iacent, antiadas: si autem in ea quæ ijs proxima sunt, paristhmia, 3. de sympt. caus. cap. 4.

Bragmata Latini sinciput, sunt duo sincipitis ossa vtrinque quatuor rectis lineis circumscripta, una quidem per suturam in longum porrectam, vtrique ossi communem, posterius autem lambdoidis futura lateribus, anterius vero coronariæ vocata, utraq; autem parte, squamosis commissuris, com. 3. in 6. de morb. vulg. 1. quæ vulgo parietalia appellantur, vide Bregmatis ossa.

Brenis pulsus, vide pulsus latus.

Bronchia, sunt aspera arteria chartilagine, Sigma literæ figuram referentes, 4. loc. affect. cap. 8. vide Arteria.

Brouchocele, idest gutturis tumor, 2. de comp. med. loc. cap. 17.

Bronchon, idest, trachea arteria, 7. de usu par. cap. 11. vide Aspera arteria.

Bubo est tumor, præter naturam, in collo, & secus aures, vel inguina, ijs quibus in collo, capite, vel aliqua vicina parte vel prope magnam arteriam aut venam ulcus est natum ortus, 13. meth. cap. 5. vide Struma.

Eubonecele, est tumor mollis in inguine factus, peritonæo vulnerato, aut rupto, & postea non conglutinato, diciturque ramex in inguine, quod si Umbilico hoc accidat, dicitur Exomphalos, lib. de tumor. c. 16.

Bulimos est vehemens esuritio, ex indigentia simul, imbecillitate, & refrigeratione oris ventriculi, orta, 1. de caus. sympt. c. 7. differt autem Bulimos à canina appetentia, quod ille sit casus potentia ex frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoavit, sed non habeat eam amplius adiutam, Caninus autem appetitus fieri consuevit, vel propter

solam intemperaturam frigidiorē, uel propter humores acidos, quos exorbu it os uentriculū. 2. aph. 21.

Bulla, i. pustula oculis nata, 9. de simplic. med. fac.

Bursa testium, est communis tunicarum, utrumque testem cooperientium rugosus sinus, utriusque testiculo circumdatus, Oscheon Græcis, Latinis Scortum, alijs Scrotum, dicitur, lib. de consect. uulua, & Introd.

C

CACHEXIA, prauus corporis habitus est, i. meth. 9. in Cachecticus, idest, mali habitus homo, libr. de cur. rat. per sang. c. 19. vide habitus.

Cacochymia, uitiosus succus, vide Plethora.

Cacoethe ulcera ex dysepulotis clarius intelliguntur, quæ enim ex humorum confluxu, uel multorum uel acrim oriuntur, sine eo quod locus affectus hanc dispositionem habuerit, ut licet bonū sit, quod influit, tñ ipsum corrumpat, Dysepulota nomino, quæ uerò dictam dispositionem iam obtinent, præcipuo vocabulo cacoethe, idest maligna, appello, i. de compos. med. per gen. cap. 18. sed generalius, quæ ulcera omnibus ritè decenterq; factis non sanantur, ea medici cacoethe, idest maligna, contumacia, rebelliaq; dicimus, 4. meth. 5. Adhuc generalius. Cacoethes morbos, idest malignos appellamus, quicunq. periculum minantes spes salutis non adimunt, nam quod summe perniciosum existit symptoma, non cacoethe, sed mortiferum dicitur, co. 1. in 1. prorrh. 14.

Cacophonia, idest uitiata vox, de sympt. diff. c. 3.

Cacosphyxia, idest uitiosus succus, ibid. cap. 4.

Cacotrophia, idest, uitiosa nutritio, ibidem.

Calcboidea ossa, sunt tria ossa parua circa calcaneum posita.

sionem alimenti non perfectè elaborati, peritoma, siue recrementum vocant, recipit, 9. de anatom. adm. ca. 3. quod recrementum ab Arist. excrementum dicitur, libr. de instrum. odor.

Callus, idem quod Cladus Grace Pylus, 6. simpl. dicitur. que etiam Tophus, ex crudo humore qui crassus est ad similitudinem puris crassioris, 10. de comp. med. loc. ca. 2. vide Myrmecia, & Tylosis.

Caluaria, siue Cranium, os capitis appellatur, lib. de ossib. cap. 1. vide Cranium.

Caluata, ferramenta appellat Hippo. quæ rotunditatem quandam leuem in extremis partibus habent, cuiusmodi sunt, specillorum capitula, & quæ Nucleata appellantur, & spatularia. Oblonga verò his contraria nuncupat, quorum extrema minimè sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionem interpunctiones accommodatis instrumentis quodam modo similia, 1. de artic. 43.

Caluities est capillorum defluuium, propter humorum ex quibus nutriri consueuerunt, inopiam; si verò propter eorundem humorum vitium, corrumpantur, & cadant, non caluities, sed Alopecia, & Ophiasis dicitur, 1. de cõp. medic. loc. cap. 2. vide Madarosis. Capitis sane cutis, pueris mulieribus, & Eunuchis humida est, sed Caluis immodice arida. Cerebrum quidem in iuuenibus molle cum sit atque humidum, Caluariam tangere, omnemque interiorem inanitiem cõplere, in Senibus verò siccescens, subsidensque ab ea distare sepius in animalium dissectionibus conspexistis, in quibus caluescentibus syncipitis ossa, fistulosiora alijs, & molliora ac super incumbentia ob Cerebri defectus exarescunt, cum ad ipsa usque non pertineat, neque ea attingere possit subsideat enim, in suamque, ac ipsius basim depressum cadit consequenter igitur, ossibus istis resiccatis, & ipsis obtenta cu-

tis inarescit, atque ipsi sensui valde sicca in Caluis apparet, ut rationali demonstratione nō egeat, com. 3. in 6. de morb, vulg. 2.

Calx, est totius pedis posterior pars, lib. Introd. cap. 10. Clarius. Calx est os pedis maximam, ossi scaphoidi subiectum, quod & rotundas ex talo partes recipit, & geminos quos habet excessus, in sinum eius inserit, parte, qua ingredimur leuiter rotunda, & latiuscula, lib. de ossib. 2. 4.

Camariō siue Psallioides corpus est, pars cerebri, quæ supra communem cavitatem est (qua Cerebrum Cerebello sua perforatione committitur) velut domus tectum quoddam in sphaere superficiem concavam circumacta, ad similitudinem testudinum, & Fornicum, quibus Architectores vtuntur, 8. de usu p. c. 11. vide Fornices.

Camarosis, est ossis perruptio, cum ex alterutra refractū parte, similem Camera figuram acceperit, lib. finit. unde recentiorum non nulli vehementissimas fracturas Camaromata, & Engosomata vocant; Engosomata quidem, quæ in medio sui membranae innituntur, Camaromata verò, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent; Caterum, qua primum ab integris fracturae partibus diduci agra cepit, intro magis recedunt, ac membranae innituntur, 6. meth. 6. Camisia fœtus, vide Chorion.

Campylon, vide Helosis.

Cancer, est tumor præter naturam fisci, & liuidi coloris, in quo venula quædam exaltata primò occulta (quando, & Cancrum latentem vocant, lib. de crab cap. 4.) deinde manifesta a crasso, & nigriore sanguine feci vini asimiles sunt, 1. 4. meth. 9.

Canina cupiditas, est prava qualitas oris ventriculi multa impetuosè ingerentis, nec potentis deuoratorum pondus sustinere, quare, ea supernè, vel infernè excernere cogitur,

gitur, ita in renibus quoque, & diabetica passione accidit, serosę humiditatis cupiditas, unā cum virium imbecillitate, unde & humiditatem affatim attrahere, ac eam deinde in vesicam impellere coguntur, 6. loc. aff. cap. 3. vide Bulimos.

Canini dentes, quos Græci Cynodontes vocant, sunt duo utrinque mandibula superiori, & inferiori hærentes dentes, qui Canum dentibus quam simillimi sunt inferiore basi, lati, parte superna acuti, quibus singulę quoque radices longissimæ insunt, ut si quid propter duritiem ab incisori- bus dentibus scindi minus potuit, id frangere possint, lib. de ossib. cap. 5. vide dentes.

Canities, est pilorum ante legitimam ætatem in album commutatio. lib. finit.

Canthus oculi, vide Anguli oculi.

Capillaris vena, vide Apanthismus.

Capillitium, vide Trichiasis.

Capistratio, vide Phymosis.

Capitis vena, & Cephalica, & humeraria, & externa dicitur est quæ ex iugularibus externis iam diuarcatis, quibuscum radicem habet communem, utrinque extra thoracem ascendit, & per humerum in externam brachij regionem declivius excurrit; initio secundi de ration. vict.

Capreolaris, siue hederarius anfractus, est arteriarum, & venarum ad utrunque testium descendantium non recto itinere instar Capreoli, aut hedere varijs modis involutarum, connexus, 1. de semin. c. 12. vide Glandulosi assistentes.

Caprizans pulsus est, ubi motus arteria interpellat quāpiam in parte, ita ut motus à quiete alter celerior primo, & vehementior sit, 1. de differ. puls. c. 29.

Capsula cordis, idest Pericardium, vide Membrana Pericardios.

Caput, est ea corporis pars, quam nonnulli ventrem superiorem nominant, collo terminatur, & partes animales continet.

Caput cordis, est ampla, & orbicularis superna eius basis, 6. de vsup. cap. 7.

Caput ossis, est extrema tenuis processus ossium pars, crassior, & orbiculata, lib. de ossib. in proem.

Caput purgia sunt medicamenta omnia, quae capitis purgandi gratia infunduntur, sine naribus, & dicuntur *Errhina*, siue ori, ut colluendo, vel mandendo per sputum caput purgent, & vocantur *apoplegmatica*, 5. de simpl. cap. 20.

Carbo (qui & *Carbunculus*) dicitur, cum melancholicus humor in cutem decumbens simul cum febre, exanthemata per cutem crassescentem, siccescentemque oriri facit, a satum sanguinem indicans, lib. de atra bil. c. 4. *Carbunculus* vlcus est, crustam cito cum inflammatione totius partis circumdat & valida faciens, ut & febres vehemens, & extrema pericula inferat, 5. de comp. med. per gen. c. 15. cuius crusta nigra est, & cinerulenta, aliter quam quae sanguine suffusa sunt, aut quae algore frigent, non enim vehementer liuidus, ut in illis tumor est, sed habet aliquid splendens, ut bitumen & pix, talis autem est exacta atra bilis, lib. de tum. c. 6.

Carbunculus, vide *Carbo*.

Carcharaconta, dicuntur animalia, quae serratis sunt dentibus, ut *Ursus*, *Leo*. 9. de anatomi. adm. cap. 1.

Carcinoma in utero est tumor sine ulceratione inaequalis, & verrucosus, lib. finit. quem etiam à *Canero* animali *Carcinon* vocant, ibidem.

Carcinos, vide *Carcinoma*.

Cardia hoc est cor, quod non solum ei visceri, quod sui natura palpitat, nomen fuit apud antiquos, sed etiam, ori ventriculi, pro confesso habetur, apud omnes, 4. aph. 65.

Car-

Cardiaca dispositio est innati roboris labefactio, & languor, fit plerumque conflante ore ventriculi & stomacho cum sudorum immodica vi; sunt qui Cardia, id est, Corde phlegmone laborante fieri affectum putauerint, atque ab hac virium exsolutione, quod euenit malum, cardiacā, vel dispositionem, vel syncopim nominarint, 1. de caus. sympt. cap. 7. & lib. finit.

Cardiacus morbus, vide Cardialgia.

Cardialgia, id est, cordis, seu oris ventriculi dolor, & morsus, qui & Cardiogmos dicitur, à forti ventriculi aestu, flauabile in ipsius tunicis ebulliente, genitus, 5. aph. 65. dicitur etiam Cardiacus morbus, lib. 7. introd. cap. 13. & 8. de comp. med. loc. cap. 1.

Cardiogmos, vide Cardialgia.

Carnosa cutis, vide Musculus cuticulosus.

Caro vocantur tantum ea, quæ in masculo est, reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci, sed quæ in visceribus, ceu iccore, renibus, liene pulmone visuntur, eas parenchymata, quasi effusiones dixeris, Græci vocant, quæ in intestinis, ventriculo stomacho, & utero sunt, sine nomine relinquunt, 11. meth. 11. parenchymata autem eas partes vocant, non carnes, propterea quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia concre scat, 11. de simpl. in initio.

Caros siue Sopor, est deperditio sensus, & motus in toto animalis corpore, illesa manente spirandi facultate, laesa autem anteriore Cerebri parte, & temporum musculis; si verò spirationem adeò vehementer opprimat, ut quis vel magno conatu vix spirare possit, eorum exemplo qui per grauem somnum stertere solent, Apoplexia nominatur, 4. loc. aff. cap. 2. & 13. meth. 21. & com. 2. in 1. prorrhet. 29.

Carotides, id est *Soporariae arteriae* sunt, duae illae quae ab arteria magna, à sinistro Cordis ventriculo emergentes, rectè ad caput feruntur, tamquam vasorum propagines, omnibus, quae sunt supra Cor, partibus distributae, 16. de usu par. c. 12. & 1. de placit. ca. 7. sed has non rectè *Carotidas*, & *Soporarias*, & esse & dici censendum est, sed iam obtinet nomen ex multa omnium qui post Hippocratem fuerunt Philosophorum, & Medicorum ignoratione, consentium, Soporem affectionem esse, dictarum arteriarum, 1. de placit. cap. 7. vide *Soporarię*.

Carponi, & *Carpos*, vide *Brachiale*.

Carunculae, nunc partes sunt substantiae intestinorum, quae in difficultate intestinorum excernuntur, adeò magnae, ut possimus eas carnes nominare, 4. aphor. 26. nunc verò carnosam quandam particulam, in summo ore pendentem, quam & (olumellam vocant, significant, 6. de comp. med. loc. cap. 3. vide *Gargareon*, & difficultas intestinorum.

Casus, qui & signa, & symptomata mox apparentia dicuntur, 1. aph. 12. vide *Indicatoria signa*.

Cataclida, sint *Subclavium* dixeris, primam Thoracis costam parvam significat lib. de musc. diff. c. 12.

Catagma, id est ossis fractura, 2. met. c. 2.

Catagmatica emplastra, quae & *Cephalica* vocant, sunt quae *Caluariae fracturis* accommodantur, habentq; abstergendi, digerendi, & siccandi potestatem, 2. de comp. med. per gen. cap. 16. Dicuntur, & *Catagmatica ligamenta*, quae fasciarum instar ossis rupturæ deligantur, 1. de comp. med. per gen. cap. 4. vide *Cephalica emplastra*.

Catalepsis, est deperditio sensus visus, apertis palpebris, servata tamen secundum naturam spiratione, in qua posteriora Cerebri potius afficiuntur, 4. loc. aff. cap. 2. licet alibi *Catalepsim* dicat esse spiritus cohibitionem, lib. de musc. diff.

diff. cap. 16. & alibi dicat Catalepsim fieri refrigerata prima parte sensitiva, id est, Cerebro ipso, quæ refrigeratio cum fortis fuerit mixta humiditati, facit lethargicas passiones, cum siccitate verò eas, quæ à Græcis Catalepsis dicuntur, i. Deprehensiones, 2. apho. 3. eundem affectum Catoche, et Cathecon vocant, 4. de caus. puls. c. 16. vide Catoche.

Catalotica medicamenta sunt, quæ cicatrices græssas, comedendo æquant, & limpidant, lib. de Dynamid.

Cataphora, id est, veteriosa ad summum delatio, pro rhet. 1. qua agris sopori graui simile quid obuenit, suntque tum omnis sensus, tum vocis expertes, 1. de diebus decret. cap. 4.

Cataplasma, compositio est, ex aliquo farina genere. & aliquo humido, siue vntuoso, 3. de compos. medic. per gen. cap. 2.

Catapotia, i. pilule, de remed. par. fac. c. 6. vide pilula.

Cataptosis morbus non est, sed symptoma comitalium, at tonitam concidentiam sine temporis spatio factam, significans, lib. de tot. morb. temp. cap. 4.

Cataracta, siue suffusio, est aqua inter vneâ, & crystallinum humorem coagulata, prohibens spiritum visibilem ab oculo exire, lib. de ocul. par. 4. cap. 12. vel suffusio est, cum cernendi facultas, uel in partem deperditur, apparente, siue non apparente in oculis malo aliquo, propriaque affectione non molestatis, sed aut oris uentriculi, aut cerebri cognatione, 4. loc. aff. c. 2. quam uocant Græci Hypochyma, 10 de usu p. c. 1.

Catasarca, uide Anasarca.

Cataschesin, dispositio est, quæ facile discutitur, quæ apponitur heclicæ dispositioni, id est illi, quæ tenaciter inhaeret, 3. loc. aff. cap. 2.

Catastasis, uide Constitutio.

Catatafis est ad inferna loca, corporum tractus, quæ obitur partim principijs quæ tentionis causæ sunt, è regione oppositis, partim transumptione in contrarium nempe transmissis per rotulas principijs, quæ tentionem molitur, ac superius adnexis; opposita huic est *Anatafis*, quæ est tentio ad loca superna per translationem, lib. finit. vide *Anatafis*.

Catarrus, seu defluxus, est multorum humorum delatio per palati foramina & nares, quæ in exitu una cum flatu egrediente, strepitum quendam faciunt lib. finit. vide *Coriza*.

Cathartica, seu purgans facultas vel medicamenta, duo significant, alterum commune omnium, quæ quouis modo, animalis excrementa expurgant; alterum quod per excellentiam de ijs tantum dicitur, quæ aut per vomitum, aut per ventris deiectionem purgant neq; quod eiusdem est generis, tum ea quæ fit per nares, tum ea quæ vulvæ, admota, expurgant. 5. de simpl. med. fac. cap. 20.

Cathemerina febris, id est quotidiana, ita enim consueverunt vocare eam febrem, quæ singulis diebus accenditur, neque ullam habet intermissionem; ego verò solitus sum eandem febrem *Amphimerinam* continuam appellare; nam *Cathemerinon* vocabulum, nusquam apud Græcos scriptum inuenitur, omnem verò rem quæ quotidie, eodem modo fiat, *amphimerinam* vocant; vocetur itaque quæ singulis diebus accenditur, & finitur *Amphimerina*, id est, quotidiana simpliciter, quæ verò non intermittit quotidiana continua, 2. de diff. feb. cap. 7.

Catheretica medicamenta sunt, quæ excrescentiam carnis ulceribus detrahunt. 5. de simplic. cap. 2. eisdemque cicatricem inducunt, ibid. cap. 15. vide *Septa*.

Cacheter, est fistula urinaria, cuius extremum aliquo
ca-

cataplasmate illinimus, ad remonendam urinae suppressionem, & virgę immittimus; ad Thrasib. cap. 23. vide Syphones.

Catixin, seu secundum rectitudinem, eruptio sanguinis est, cum sanguis ē directo loci affecti, effluit, vel mittitur, lib. de cur. rat. per sang. miss. 15.

Catoche, qui & Catochus, vigilans si por est, 3. loc. aff. cap. 5. estque solius Cerebri affectus, veluti & per totum corpus convulsiones, cō. 3. in 1. prorrh. 69. est quoque Catochus fascia longior, quę in orbem faciei & capiti circumdatur, ut operculum comprehendat, lib. de fascijs, vide Catalepsis.

Catoherica medicamenta, quę & Hypelata Gracę dicuntur, sunt medicamenta deiectionia, quibus renes, vesica, & gibba hepatis cum multo vitioso succo sunt referta, expurgantur, ut Caua iocinoris & intestina, deiectione, 7. meth. 13.

Caua uena (sic appellata, quod uenarum omnium quę per corpus animalis disseminantur, latissima sit 4. rat. vict. 27.) est uena magna a gibbis hepatis orta lib. de uen. & arte. diss. cap. 2. per quam hepar ex particulis quę ad uentriculum attinent, attractum alimentum, & in ipsa hepatis substantia elaboratum, in omnes superiores corporis partes distribuit, 4. de usup. cap. 13. quę a conuexis iecoris partibus orsa, tum cauā propter sui magnitudinem, tum iecoraria, à uiscere unde egreditur nominatur, 8. de placit. cap. 1. Nec solum hæc uena quę a gibbis hepatis egreditur, sed alia etiam quę à simis & concava ipsius parte, quam portas uocant (unde, & uena portarum appellatur) promanat, Caua dicitur quę fertur obliqua dorsum atque in uentrem & intestina propagatur, tamquam truncus uenarum omnium quę corpore infe-

riore sparguntur, per quā hepar ex particulis quæ ad uentriculum attinent, alimentum attrahit, 4. de usu par. c. 13.

Cauda, uide *Coccyx*.

Cauernosa ossa foraminulenta, Ithmoidea, & spongiosa, seu *spongoidea*, sunt ossa quedam parua ante meningas in meatu olfactorio posita à Cribri, vel spongię similitudine sic dicta, 8. de usu par. c. 7. uide *Ossa Ithmoidea*.

Cauernosum neruum appellant *Penis colem*, à quo & *Penem*, & ipsum totum neruosum dicunt. Celos enim in marium genitalibus, & uteri ceruix quoniam extendi, & in se ipsas rursus retrahi, & subsidere videntur, neruosos dicunt. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. diciturq. flatuosus, & fistulosus, 6. de loc. aff. 6.

Cauledon, est curatio fracti ossis, quę per transuersum fit in qua fracti ossis partes ita à se dissident, ut è directo non iaceant, 6. meth. 5. uide *schidacedon*.

Caulos i. putendum virile, 14. de usu par. c. 12.

Causa morbi, est id quo tangente afficimur, & quo separato statim cessat affectus, 1. de loc. aff. cap. 2.

Causę præincipientes, uide *Febres putridę*.

Causę præcedentes, uide *Febres putridę*.

Causodes febres, i. incendentes, 1. aphor. 12. quas etiam *Causon*, vocat, id est febres ardentes, 1. de cris. cap. 4. uide *Continua febris*.

Causon, uide *Causodes*, *Continua*, & *Synocha*.

Causon legitimus, qui ex redundante flaua bile fit, notus verò qui ex putrescente crassa pituita, 4. de rat. vi. 13.

Caustica, hoc est vrentia medicamenta sunt, quę & vehementer calida sunt, & consistentia crassa, quęq. ignis instar corpus colliquant, & sæpe escharas hoc est crustas, ritu cauterij efficiunt, 5. de simpl. cap. 15. inde, & affectiones causticę, & caustica excrementa, id est vrentia appellantur.

lantur, quarum virtus est morbum & acutum & periculosum, & velocis iudicationis reddere, com. 2. in 1. prorrh. 60.

Cedmata vocat *Hipp.* fluxiones in crura decumbentes, & ex ipsis eas maxime, quæ primum articulum, ubi coxæ dicitur, occupant, com. 5. in 6. de morb. vulg. 22.

Celas, *Hernias*, *Ramices*, *Circocelas* medicorum iuniorum nomina sunt, significantia omnes testiculorum tumores, lib. de tumor. cap. 15. barbaram scilicet medicinam, rupturam vocant; hæc varijs fit modis, perque adiectiones rerum opplentium, varias etiam appellationes accipit; si enim peritonæo rupto intestina in scrotum descendunt; *Enterocoele* Græcis, *Ramex* intestinorum Latinis appellatur, ubi verò intestina supra in inguinibus hærent, *Bubonocoele*, hoc est *Ramex* inguinalis vocatur, si humor aliquis lentus in Scrotum colligitur *Hydrocele*, id est *Ramex* aquosus nuncupatur. Quum autem caro dura intra testium tunicas increscit, *Sarcocoele*, hoc est *Ramex* carnosus dicitur. In summa nomen semper à rebus opplentibus, accipiunt. Proinde si *Omentum* in Scrotum deoluatur, *Epiplocoele* hoc est *Ramex* Omenti nominatur; sic ubi venæ ultra modum repletae, ac dilatatae glomerantur, *Cirsocele*, i. varicosus *Ramex* vocatur, vide *Hernias*.

Celer pulsus est, qui cum modico tempore arteria distenditur, fit. 1. de diff. puls. cap. 7.

Cēchria, alterum est herpetum genus, quod à similitudine quam habet cum milio *Cenchrian* vocant, mixta simul facultatis bilem scilicet, & pituitam continens, quæ non protinus ulcus faciunt. quemadmodum alter, sed admodum exiguas pustulas ad speciem milij, quæ ipsæ interposito spacio, in ulcus transeunt, diciturque etiam herpes miliaris, 14. meth. 17. vide *Herpes*.

Ceneangia propriè & primum vasorum inanitionem significat, atque ob id *Asitia*, idest ciborum abstinentia, *Ceneangia*, idest, vasorum inanitio sæpius dicitur, tamquam nomine generis etiam in specie homines omnes uti consueverunt, 2. rat. vñt. 47.

Cencon, vide *Ile*.

Cephalæa Cerebri morbus, est Capitis diuturnus dolor, difficulter solubilis, qui à parua occasione, vehementes habet accessiones, ut neque voces aut motum tolerare possit infirmus, sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum querat, ob doloris vehementiam, cum nonnulli veluti malleo se percuti, alij caput sibi contundi distendiq; sentiant, non paucis ad oculorum radices dolor extēdatur, suis intermissionibus circumacti, non secus ac qui *Cephalalgia* laborant, sed in *Cephalæa* affectu partes redduntur multo debiliores quam in *Cephalgia*, 3. loc. aff. cap. 9.

Cephalalgia, vide *Cephalæa*, 2. de comp. med. loc. c. 2.

Cephalica vena, quæ & *Humeralis*, siue *humeraria* dicitur, ramus est venæ cavæ ad iugulum ascendētis, ibique ad furculas diuisa, altera pars humero superposita ad manum tendit, vnde & *Cephalica* dicitur, lib. de anatom. viii. vide *Humeralia*.

Cephalica emplastra capitis fracturarum, sunt quæ usque ad crassę meningis duplicaturam peruenerunt, quorum virtus est, ut ossium squamam sursum attrahant, & in pristinum locum reuocent, & fragmentatum in Capite, tū in alijs corporis ossibus, educant; Non nulli communi genere hæc etiam vocant *Catagmatica*, propriè vero nūcupatis fortiora sunt, si quidem ex alto superficiem extimam non ossa modo, sed his multo quoque magis, humorem aliquem crassum, & viscosum, vel omnino deprauatum sua acrimonia attrahunt, 2. de comp. med. per gen. cap. 18. Similiter ad-

huc

huc medicamentum siccum, quod carnem producat, Cephalicon vocant, 3. meth. 2.

Cereę, mulieres sunt, quarum uterus proprijs morbis, tum qui in processibus eius supernis, & lateribus consistunt (Cereę Græci vocant) tum qui in collo tum etiam qui in toto eius tergo, laborans, aliquando quidem vel plura quàm prius, vel pauciora, vel nulla, vel mala emittat menstrua, 3. de symp. caus. cap. 4.

Ceratoide, cornea, seu corniformis tunica oculi est à dura meninge orsa (tunicam choroidem complectens) crassa admodum, sed parte eius media tenuissima & densissima, splendida ad splendorem recipiendum, & transmittendum, cornibus admodum extenuatis similis, unde eam à cornu similitudine Ceratoidem, Corneam & Carniformem appellant, 10. de usu par. cap. 3. vide Rhagois tunica.

Ceratomalagma, nonnulli medicorum, nomine à sola consistentia desumpto, vocant medicamenta, quæ corpori imponuntur, non etiam quidem humida, duritiem verò tantam, nec dum consequuta, quantum emplastra possident, 7. de comp. med. loc. cap. 11.

Cerchis, vide Cubitus.

Cerchinòs est exiguus quidam ad tussendum impetus, non tussis, sed velut inauseę vomitiones præcedunt, ita tussim hoc symptoma; Atque ut non nulli nausearunt quidē, non tamen vomuerunt, ita non nullis Cerchinòs incidit, nec tamen tussis propter causa paruitatem est secuta, 2. de sympt. caus. cap. 4.

Cerelarium appellatio, in toto eorum genere est usitatior, quod legumina vocant, lib. de attenuan. vic. rat. c. 6.

Cerebellum, posterior est Cerebri pars, quæ à non nullis Encranion, vel Paræcephalis, vel postèrius Cerebrum dicitur, 9. de anat. adm. c. 2. estque spinalis medulla principii,

& eius ratione nervorum omnium, qui in toto animali sūt actiui, lib. tēgn. cap. 11. vide Parencephalis.

Cerebrum, quod Græci à situ Encephalon appellant (nam nominatur ita, quod ἐν τῇ κεφαλῇ hoc est in capite situm, habet) animæ ratiocinatricis est domicilium, nervorum, & sensus omnis, motusq; voluntarij principium, substantia nervis simillimum, nisi quod mollius; nam id illi conveniebat, ut quod sensus quidem omnes recipit, omnes autē imaginationes, atque intellectus complectitur, 9. meth. & 8. de usu par. substantia ipsius alba veluti ē spuma quadam concreta, & hamida, lib. finit.

Cerelæon, compositio est, & x cera, & oleo, 7. de compos. med. per gen. cap. 2.

Cerion, id est Fauus, vlcus parvum in capite est cum tumore, ex cuius foraminibus crassior sanies, & quasi mellitus humor profluit, lib. de tumor. cap. 15. & 1. de compos. med. loc. cap. 8. vide Helminthes.

Certatorie, hoc est agonistice aqua frigida uti, dicere solent quidam, cum ea & affatim & frigidissima exhibetur, lib. de marcore, cap. 8.

Cervix, vide Spina, dicitur. & Cervix tenuis ossium processus, lib. de ossib. in proæm.

Chalastica, id est, relaxantia, seu remittentia vocamus, quæ modicè calefaciunt quorum usus est, ut conniuentia corporis laxet, flatuosum spiritum tenuet, & quod phlegmonis iam conflatum est digerat, 12. meth. 5. medicamina igitur induratum corporum, quæ ipsorum solvunt duritiem, Malastica hoc est emollientia dicuntur quæ autem tensioni medentur, Chalastica, 7. de comp. med. per gen. cap. 9. vide relaxantia.

Chalazia, id est tubercula instar grandinis in palpebris, quæq; Possibias Græci, 4. de comp. med. loc. cap. 7. estq; morbus

morbis ex vitijis, quæ oculos infestant, unum, cum toto genere a natura, alienum sit, 14. meth. 19.

Chartilago. quam Græci Chondron vocant, est particula simplex in animalis corpore, quæ aliarum quidem omnium est durissima, toto autē osse est mollior, 7. de usu par. capit. 3.

Chartilago ensiformis, est extrema ora ossis mediæ pectoris, quæ est propter os ventriculi, cui alligatur, Græcè dicitur Chondròs Xiphoides, 6. de usu par. cap. 3. eadem dicitur mucronata, lib. de ven. & art. diff. cap. 5. aliqui sunt qui ensiformem chartilaginem dicunt esse, totam pectoralis ossis figuram (non eam tantum. quæ in imo eius est) quia gladii similitudinem repræsentat, lib. de ossib. cap. 13. vulgus malum punicum seu granatum vocat.

Chartilago innominata, est secunda laryngis chartilago, quæ nomine caret, internis partibus, quæ Oesophagus est, positionem habens, 7. de usu par.

Chartilago peltalis est imperfectus circulus in principio aspere arteriæ collocatus, ad modum peltæ cuius gibbositas extra apparet in gutture, eius verò defectus est versus gulam, unde chartilago peltalis dicitur; cuius defectum supplet quidam chartilago supposita isti inferius, faciens etiā circulum imperfectum, sed contrario situ cum superiori, quæ eius gibbositas interius est versus gulam, defectus exterius versus guttur, diciturq. Chartilago Cymbalaris, vel Coopertoria. Estq. ibidem tertia Chartilago nomen non habens, cum modo versus partem exteriorem, nunc versus interiorem collocetur, nunc cum cibo deglutitur, ut os trachæ arteriæ, nunc cum vox formatur, ut os gula tegat, libr. de anat. viii.

Chemosis morbus oculi est, quando album oculi tumescit, etiam superat circulum iridis, ut & nigrum oculi con-

eaum videatur, lib. de anat. ocul. alibi, *Chemosis* ex vehemēti inflammatione, utrasque palpebras in exteriorem partem detorquet, ne totum oculum contegant, lib. Introd. cap. 15.

Chenicidas, instrumenta quadam vocant, quibus in Calvarię fracturis, utimur, 6. meth. 6.

Cheros, i. tempus, seu atas morborum, quę temporum vicissitudine immutatur, lib. de morb. temp. cap. 1.

Chion, vide *Cion*, & *Staphyle*.

Chironia, & *Telephia*, species ulcerum sunt malignorū, lib. de tumor. cap. 13. Tria tantum ulcera propriam habere appellationem, *Anthrax*, *Phagedęna*, *Herpes*, cętera omnia ipsa per se ipsa solebant antiqui ulcera tantum nominare, quę in longum tempus protrahuntur, cum non possint multum tempus fuerint ad cicatricem producta, rursusque influente lebre, ex osse corrupto, in parte penitiore inflammantur, & pus generatur, a quo cicatrix eroditur, & caro exulceratur, 6. aph. 45. Inueterata ulcera, & dyssepulota, hoc est cicatricem eggre ducentia, *chironia* nominant, 4. de comp. med. per gen. in ultimis verbis; Dicuntur autē *Chironia* ab eo qui primum ea sanauit, partim ab ipsis, qui iisdem sunt affecti, ut *Telepbium*, 2. meth. 2.

Chirurgia, i. manualis operatio, 6. meth. 6. Inde *Chirurgica* ea est medicinę pars, quę manu medetur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Chloron, i. pallidus, & gruginosus color, 2. progn. 20.

Choana, Infundibulum, *Scypho*, *Peluis*, *Pyelos* idē sunt, significantia ciuitatem quandam, in quam meatus cerebrū expurgantes in palatum desinunt, usque ad adenis ventriculum, 9. de vsu par. c. 3. quę vulgo lacuna dicitur.

Cheras, i. *Struma*, sepe enim propter vlcus quod in manibus, aut pedis digito sit, glandulę in inguinibus, & alis, tū

intu-

intumescunt, tum phlegmone occupantur, quin etiam in collo, & secus aures, sæpe glandulae iis quibus in collo, capite, uel aliqua vicina parte ulcus est natū, intumescunt, nominant autem ipsos adenas, cum sic intumuerunt Bubones, & si schirrosior earum partium phlegmone aliquando fuerit, hac & ægre sanabilis redditur, & Charas, id est, Struma dicitur, 13. meth. 5.

Cholagoga, i. bilis educiua medicamenta, 4. aph. 2.

Choledocos, id est vesica bilis receptiua, quam etiam Iecoris vesicam nominant, lib. 6. de anatom. adm. cap. 2. quā etiam Cystim bilis, id est, Vesicam bilis susceptricem vocant, 4. de usu par. cap. 12. eandem vocant fellis felliculū, 5. de loc. aff. cap. 7.

Cholera, i. biliaris, 1. prog. 25. est acutus affectus, cum vomitibus biliosis multis, aluiq. deiectionibus, Suris quoque se contrahentibus, ac frigescentibus extremitatibus, fiuntq. in his ægris pulsus minores, & obscuriores. Cholera duplex est apud Hippocratem, altera humida in qua, ut omnes norunt vehemens est excretio, bilis supra infraque crumpit, intestina grauitur torquentur, accedunt conuulsiones, sæpe etiam crurum surque contrahuntur, alteram siccam choleram vocat Hipp. ab eadem prouenientem causa, ac circa eadem consistentem, at citra ventris fluorem, & vomitum, lib. finit.

Chondros, i. Chartilago, 7. de usu par. cap. 3.

Chondrosyndesmus, i. chartilagineum ligamentum, 1. de temp. cap. 9.

Choræ, id est regiones oculorum, seu cavitates, quæ supercilijs subiacent, 8. de usu par. c. 6.

Chorion, id est, secunda, est membrana vuluæ pregnantis mulieris adhaerens, multarum venarum, & arteriarum contextu, interualla mēbranis obducta habens, cui duæ aliæ mem-

mem-

membrana interiorius adnascuntur, altera quæ Amnium, id est, Amiculum dicitur, toti fœtus circumiecta, altera quæ Allantoides, id est Intestinalis eminentibus tantum partibus, capiti, natibus, pedibus, duplex superiecta, libr. de puluæ diff. cap. 10. quæ Arabicis Abgas, Camisia fœtus, & profundatio sudoris dicitur, lib. de anat. viu.

Choroides plexus (qui & Retiformes, & Reticulares, dicuntur, vide plexus retiformis) sunt conuolutiones membranarum cerebri, ex multis venis, & arterijs, secundarum instar effigiata, nomine a Chorjys, id est membranis deducto, quæ fœtus extrinsecus in orbem ambiunt, 9. de anat. adm. cap. 3, Constituitur autem prope medium cerebri ventriculorum, 9. de usu par. cap. 7. Dicitur adhuc & tenuis cerebri membrana Choroides id est, secundæ formis meninx, 8. de usu par. cap. 9. Dicitur, & Choroides oculi tunica, corpus quoddam retiforme quasi tunica. (Amphiblestroides dicta) humorem vitreum oculi ambiens, quod ex portione cerebri superne descendente, atque amplificata, est conflatum reti simile, quod retiforme corpus a choroides, id est tenui tunica cerebri, quæ illi superne dimittitur, continetur, unde tunica oculi choroide dicitur, 10. de usu par. cap. 2.

Chorda est membrum, ab extremitatibus musculi ortū habens, ad similitudinem chordæ arcus effecta, est autem Chorda idem quod Tendo, non quod ligamentum, 6. aphor. 46. & lib. de anat. viu.

Chordapsus, Ileos, seu Voluulus est, tumor eminens, in tenuium intestinorum parte, ut uideatur intestinum ad similitudinem chordæ obuolutum, vel ab inflammatione, uel obstructione aridi stercoris, grauiter egros vomitionibus crucians, adeo, ut nonnulli stercus quoque euomere conspiciantur, 6. de loc. aff. vide Ileos.

Chro-

Chronica egritudines, i. longa, de part. art. med. c. 7. vide Polichronius.

Chrysite terra est aurea, in qua parui terræ particulis immixtae sunt paruae auri partes, 5. de simpl.

Chylus, est cibi liquamen, & ex ventriculo, atque intestinis in iecur transmittitur, partim tenuioribus portionibus, partim crassioribus consistens, lib. de atra bile, cap. 3.

Chymethla, i. Perniones, 6. simpl. vide Perniones.

Chymosis, (quæ & Chemosis) est utriusque palpebrae distortio, ex inflammatione oborta, 4. de comp. med. loc. c. 4. est item Chymosis, rubra, carnosaq; cornea oculi pelliculæ inflammatio, lib. de rem. par. fac. vide Chemosis.

Chymus est nutrimentum, seu humor ad nutrimentum animalis in hepate præparatum, depositis excrementis. 4. de usu par. Atqui antiqui saporem vocauerunt chymū, id est, liquorem, lib. de ocul. par. 2. cap. 1. chymi autem appellatio apud Hipp. semper humoribus corporis destinata est, ex quibus nos constituimur, sanguine inquam pituita, & duplici bile flaua & nigra; Apud Platonem verò, & Aristotelem, gustabilis qualitas quavis nobis insita, chymus, i. Sapor, nominatur, lib. finit.

Chyphosis, id est, gibborositas, (quam etiam chyrtosin, id est incuruationem dicunt) est distortio spinæ in posteriorem partem. prout in anteriorem Lordosis, id est, sicca fractio, vel solis manibus, vel cum manica, vel solo linteo administrata, citra omne pingue, vel cum coplanè exiguo, 3. de sanit. tuen. c. 13.

Chyrtosis, vide Chyphosis.

*Cicatrix ab Hipp. nunc sumitur pro ipsis ulceribus, nunc pro inductione consolidationis ulcerum, 1. de artic. 56. particulatim autem cicatrix oculi appellatur, ubi nigro oculi ex alto ulcere, membranae crassities superuenit, & color al-
bior.*

tibus, lib. de anatom. viii.

Circumossalis membrana est, quasi ossium inuolucrum dixeris, quæ singulis ossibus in longitudine inditur, 1. de sem. cap. 10. quam in capite, Pericranion dicimus, lib. de anat. oculis, in costis autem Periostrion, 8. de anatom. adm.

Cirros, vide Cornua vulgæ. (cap. 10.)

Cirsocela, vide Celas.

Circos, idest, varices, alias quoque venas omnes dilatatas antiqui sic nominabant, lib. de tum. c. 19. vide Varices.

Cittæ, vide Citta.

Cittosa, idest, vitiosi cibi appetentia, qualis gravidis contingit, 6. de sanit. tuen. cap. 9. dicitur etiam Citta, Pica, & Picatio, 1. de sympt. caus. c. 3. & c. 7.

Claues, siue Iugulum sunt duæ primæ costæ propè guttur, inter os pectoris, ac spina finem, quæ ad scapulas est à natura constitutæ, 13. de usup. cap. 11. claviculas et vocat, lib. de musc. diss. cap. 12. quæ vulgo furcula superior, ut Diaphragma furcula inferior nuncupatur. Recentioribus autem. elatior finis anteriori parte Claves existunt, sic dicta quod Sterno Omoplatas, idest, humerum firment; is autem finis vulgo, furcula superior dicitur, Cavitates sub his Clavibus, appellantur Sphegæ, idest, iuguli, ut sint duæ claves, & iuguli totidem, dexter, & sinister.

Claues, siue Gomphos, est oculi morbus, cum Vinea locum suum egrediens, pelliculas superficie tenus operit, unde eius forma sit quasi Clavus, lib. de ocul. cap. 11. vide Gomphos, & Myrmecia.

Clunes, vide Coxa.

Clydones, Symptoma est retentricis facultatis ventriculi, cibos, vel non complectentis, vel diminutæ, vel vitiose, unde flatulentia, & fluctuationes cum sonitu succedunt;

E

cedunt;

cedunt; flatulentia quidem, ubi & cibi flatuosi sunt; & ventriculus non admodum frigidus; fluctuationes cum sonitu, cum uel nihil in eo continetur, quod uerti inflatum possit, uel ualenter sit refrigeratus, 3. de symp. caus. c. 2.

Clyster, κλύστρον, Latinis idem est quod lauamen, seu ablutio, à uerbo, κλύειν, quod & lauare significat; Alio nomine Græcis ἐνίημα, dicitur quæ vox latinis iniectionem significat; Medici huius temporis, Clysteris, & enematis Græcis uocibus quam Latinis malunt uti; Dicitur adhuc, & Clyisma, uide Diaclyisma, i. Lauatio ad ulcera. & dentes titubantes, infirmosq; Dicitur adhuc & Clysmus, de medic. fac. par. cap. 16.

Cnimi, idest, Tibia, seu alterum ex duobus ossibus tibia eodem cum toto membro nomine, alterum uerò Perone, seu fibula dicitur, 4. de usup. cap. 9.

Coadiutrix causa est, quæ sua uirtute morbum efficere non potest, sed alteri auxiliatur, ut libido articulacæ morbum promouet, & sanguinis eruptionem remigatio, libr. Introd. cap. 8.

Coarticulatio, uide Abarticulatio, & Dearticulatio. Coccyx (vulgo (a)uda). i. (u)culus, est os quod subest in imo lati ossis, lib. de ossib. cap. 12. & 3. de artic. 104.

Coctio, quid sit hinc nosces, cum facultates quatuor sint, atque inter eas non minime ualeat alteratrix, per quã dispensatis ab ea corporibus, natura alimentum assimilat, coctio nuncupatur nutritiue substantiæ permutatio, secundum qualitatem existens, 4. rat. vi. 44. Perf. Et Urinæ coctio est, quando in urinis subsederit aliquid albū, & læue & aquale & continuū; Debilis autē coctio est, quādo ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit, & quidem si turbulenta apparuerit, & talis permanserit, hac quoque occul

ta,

ta, & debilis coctionis est signum, & rufa etiam ac tenuis, ex eodem genere est, 1. de cris. cap. 17.

Coctionis signa sunt quae hominis salutem, non tamen per crisim, futuram ostendunt; quo distinguuntur a Decretorijs, quae salutem hominis futuram, per crisim ostendunt, coctionis autem quae inspirandi sit instrumentis sputa; cuius quae in venis, urinas; illius, quae in ventre, alui excrementa statuere oportet; in febribus) quoniam venosi generis sunt passiones, nam & arterias in hoc genere comprehendimus) ad urinas praecipue attendere oportet, 1. de cris. cap. 7.

Cacum foramen, est angustius illud foramen, quod ex duobus inaequalibus foraminibus, quibus quinta nervorum coniunctio à Cerebro excipitur, prope aures est collocatum cui subditur labyrinthus quidam quem natura effecit, musculis temporalibus consulens, nervum eis durum, & labijs immittens, 6. de usup. cap. 13. vide Meatus auditorius.

Caecum intestinum siue Orbum, siue Monoculum, est quartum intestinum in ordine, primum locum inter crassa obtinens, libr. de anat. viii. Quidam illud saccum nominant.

Celi status, id est, ambientis nos aeris temperies, 9. met. 5.

Caelia apud Gracos, sine adiectione omnem ventrem significat, 6. apho. 20. Apud Aristotelem tamen dicitur Caelia, illa tantum corporis partis cavitates, in quam cibus deuoratur, & prima concoctio peragitur, sed apud Hippocr. nunc cum adiectione superior, & inferior Venter significantur, ut superior sit uenter, inferior, omne quod sub diaphragmate est spatium latius.

Caliaca, id est, Ventralis dispositio; communis morbus est uentriculo, & intestinis, in quo materia, non mor-

Tempus, regionem & consuetudinem, & si qua sunt id genus alia, considerant, 13. meth. 16.

Cola, dicuntur in homine longiora, maioraq; membra à Thorace separata, & quasi dependentia, ut brachia & manus, Latinis dicuntur artus, 3. de usup. c. 1. dicuntur & Cola, ossa narium, uide Ithmoidea.

Colatoria ossa sunt narium foraminulenta & cauernosa ossa, quæ à cribri similitudine Ithmoidea, uel à spōgia spongoidea appellantur, varia enim habent foramina, quomodo, & spongia; neque ea habent recta ut cribra, quod inde superflua Cerebri excrementa transcolent, 8. de usup.

Coles est particula quadam corporis insignis, ad extremum collum uesicæ sita, qua mares feminas exuperant, quā Græci Caulon Παρὰ τοῦ Latini penem, Colē, mētulam, uirgam, & pudendum uirile nominant, 5. de usup. cap. 15.

Colica dispositio est, constitutio plenioris intestini Coloni diuturna, in qua spatijs temporis interiectis, cruciatu intollerabiles, difficultates spirandi, sudores, perfrictionesque suboriuntur, lib. finit. suntq; Colicus & Voluulus intestinorum inflammationes, quorum alter tenuioris intestini, affectus est, alter plenioris, quare deiectiones includuntur, & flatus intestinis inuoluti, eò q̃ exitum non habeant, dolores uehementes, & tormina concitant, lib. Introd. cap. 13. & 2. de loc. aff. 5. Inde Colica medicamentasunt, quæ ad sedandum Coli dolorem sunt comparata, quæ quidem & si anodyna sunt, a communi tamen anodynorum forma, differunt, quod quæ propriè Colica appellantur, aromatis, odoratis, ac urinam cientibus seminibus permiscantur, & quanquā Colica uocentur, non tamen ad Colicos tantum, sed ad omnem dolorem in quacumque corporis parte factum, sedandū admoventur, quo factū est, inquit Gal.

initio libri sexti de locis affectis, ut antidotos omnes dolorē sedantes, ueteres Colicos nuncupauerint, uide *Narcotica*.

Collectiua medicamenti facultas est, quæ ulcera, & uulnera glutinet, 5. de simplic cap. 2.

Collectiua inæqualitas pulsum est, quæ ex inæqualitate plurium pulsum est conflata, 1. de differ. puls. cap. 30. quæ & Systematica dicitur, uide *Systematica*. Colliculum idem est quod *Nympha*, carūcula est ad fissuram colli matricis exorta, quæ dum uirgo defloratur scinditur, quam quod multo promineat, *Ægyptij* in *Virginibus* excidere consueuerunt, lib. *Introd.* cap. 10. Atqui plures ex antiquis *Anatomicis*, tum præsertim *Auicenna*, dicunt hanc quæ non dum uenerem sunt experta circa medium colli uteri, panniculum virginalem dictum esse, qui hymen, alijs hymenæon uocatur, & ut aiunt in prima coitione erumpitur; quod uerisimile non uidetur, nam in dissectione virginum non apparet, nec usquam quod legerim meminit *Galenus*, sed potius credendum est, collum ipsum, quod musculosum sit, & neruosum, ex ipsa textura tantummodo connuere, & angustius esse, *Nympha* uero est adnata *Epiphisis*, & appendix cutacea, lata intra pudendum muliebrem supra alarum commissuram, ad urinarium meatum sita. gemina autem est, utrinque scilicet una, data est à natura tum ornamenti causa, (nam quod peni virili præputium est & *Vua Pharyngi*, id *Nympha* utero) tum etiam, ut Uterum à puluere frigore, & alijs externis iniurijs tueatur, 15. de usup.

Colliquatio, uide *Anastegiosis*.

Collisio, & Contusio est, cum exterior superficies percussu corporis continuitatem seruat, multa uero exigua diuisiones in profundo constituerit; at cum cauitas aliqua apparet, quam rei collisa percussor impresserit, tunc il-

lisio

lisio dicitur, lib. de sympt. caus. cap. 11. quæ Græcè θλάσμα
Thlasma dicitur.

Collum uteri, siue os uteri, est illud quod intus est,
ubi uterus desinit, collum uerò incipit; quod magis pro-
priè os uteri diceretur; nam altera colli extremitas, quæ
mulieris pudendis coniungitur, non uteri sed ipsius colli os
non sine ratione diceretur, 5. aph. 46.

Collum, uide Spina.

Collyria Latinis medicamenta uocantur, quæ oculis
admoventur, Græci Κολλύρια nominat, hæc uerò duum
generum sunt, quædam enim liquida sunt & passim collyria
nominantur, quædam arida, & hæc barbara voce dicuntur
sies, Græci hæc uocant ξηροδολύρια, illa uero υγροκολύρια
9. simpl. & 4. de comp. med. loc. cap. 5. Colobomata Græci
uocant partes, quæ in labijs aut narium aliis, aut aure defi-
ciunt, & decurtantur, 14. met. cap. 16. quæ propriè curta uo-
cantur.

Colon intestinum quintam in ordine, secundum autem
in crassis, 6. de anat. adm. cap. 9. dicitur uerò Colon, idest
Laxius intestinum, quod excrementa ex distributione segre-
gat, suscipit, lib. Introd. ca. 11. quod & pingue intestinum
appellat Galenus, 2. de sympt. cau. cap. 5. Vnde propter sui
latitudinem, ipsum solum quidam uentrem inferiorem ap-
pellant, 4. rat. uicli. 112.

Columella Κίον Κίονις, & Columna siue Gargareon, cari-
cula est à faucibus dependens, uocis instrumentum, lib. finis.
uide Gargareon, & Staphyle.

Coma, idest, Sopor, siue propensio & delatio in som-
num, est, cum uigilare ægri nequeant non apertos habentes
oculos, sed conuiuentes, uel altis somnis uel tenui-
bus, uel uigilijs detineantur, com. 1. in 3. de morb. uulg.

E 4 7. uide

communi innadit, cui oppositus est morbus, qui dispersus, sine Sporas dicitur, qui aliquos separatim tantum; Inter communes alii sunt publici quos uocant Endemos, in quo genere pestis est, alii vulgares, seu publicè grassantes, quos Epidemos seu Epidemios uocant, qui morbus si alicuius sit ciuitatis, uel loci proprius, dicitur Vernaculus, com. 1. in 1. de mor. vulg. in argumento, uide fusius, uerbo Pandemus, & Epidemus.

Communis, siue media (ubiti uena est, quæ fertur communis ei quæ humeralis nominatur, & ei quæ per axillā ad manum, 2. loc. aff. ca. 7. quæ, & medianā, & corporalis, & purpurea & nigra dicitur, lib. de anatom. vin. uide Media.

Compages, Capitis sunt suturæ qua parte ossa capitis inter se mutuò compacta coaptantur; suturæ uerò ex translatione sici consueuerunt, Caluaria enim ossa adeò exquisitè inter se coniunguntur, & coaptantur, ut ipsorum coniunctio per Harmoniam, idest, ex compage, & coaptatione facta. merito suturæ ex panorum qui consuntur similitudine, dicatur, com. 3. in lib. de iis quæ in medic. fiunt. 36.

Complexio febrium est, quando duæ febres horis differētibus inuaserunt, confuso autem quando eodem tempore incæperint, 2. de differ. feb. cap. 8.

Cōpositus morbus est, qui ex pluribus accessionibus, & remissionibus, siue eiusdē generis ut duarum uel plurium tertianarū, quotidianarū, uel quartanarum, siue diuersi, ut unius tertianæ cū quotidiana, uel cū quartana, cōlat; cui oppositus est morbus simplex, unam genere intētionem, & remissionē faciens, lib. de Typis. cap. 3.

Compressio, est laterum cuiusque uasis astrictio, & angustatio per coalitum, 1. de caus. sympt. ca. 3. differens ab obstructione (quæ & oppilatio dicitur, 2. de caus. puls.

cap. 1.) quæ est meatuum nostri corporis interclusio, ex aliquo tumore, vel corpore interposito, non per coalitum, lib. de differ. morb. ca. 7. si quidem compresso extrinsecus nervo, angustia meatui eius contingit, 1. de sympt. caus. cap. 5. & de differ. morb. cap. 5. (cap. 9.

Cōpunctio, est perforatio, quæ acui fit suffusis, 10. de v. sup. Conarium, vide Conoides. (Venaporta.

Concauæ vena, est venaporta, 5. loc. affect. cap. 3. vide Concausa, vide Continentes.

Conceptio, id est seminis comprehensio, motus est quidam vellicationis, & contractionis Vteri dum semen in seipsum ei aculatum, amplectitur, lib. an animal sit id quod, c. 2.

Conchula Κόρυς, vide Aures.

Concoctio est ciborum à ventriculo, in convenientem animaliqua qualitatem alteratio, quæ concoctio, si tarda, & egrè Longiorique tempore fiat, Bradypepsia, si autem in alteram qualitatem, non in eam quæ sit secundum naturam fiat mutatio, Dyspepsia, si uero nulla fiat alteratio sed quales sunt assumpti cibi, tales in omni qualitate manent, & deiciuntur, dicitur Apepsia, lib. de sympt. differ. cap. 4. Alteratio ipsa, & usque quo alimentum in similitudinem partis quæ nutritur, & transmutatur, concoctio, ubi vero iam parti apponitur, nutritio dicitur, 8. de composit. medicam. loc. cap. 6. Concoctio eorum, quæ præter naturam sunt, est ipsa maturatio morbi; at ipsa concoctio in coquentis substantiam deductio quædam est eius quod concoquitur, com. 2. in 1. de morb. vul. 44.

Condensantia medicamenta omnia frigida sunt, & aquea, quare poros tenues in unoquoque corpore condensant, & contrahunt; Caterum instrumentum undique totum constringere nequeunt, unde & Pycnotica dicuntur, & differuntque à siccantibus, quod frigida & sicca sint, ab ob-

obstruentibus, quod frigida & crassa sint substantia, 5. de simpl. cap. 14. vide Obstruentia.

Condyloma, quasi dicas Nodus, est extuberatio, quæ cum phlegmone in rugosa contrahenteq; se ani parte, consurgit, lib. finit. quæ & Tymus dicitur, 14. meth. c. 3. Est adhuc carnis excrescentia callosa in digitis manuum & pedum, in sede item ac uteri ore coalescens, sic dicitur, quod prominet in modum articuli quem Condylon appellant, sed hic affectus in sede præcipue oritur, ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmentatas habet, ubi herò amplius intumuerit, tunc fit Condyloma & aliquando citra inflammationem fit & molle est quandoque uerò cum inflamatione, tumque durum est, & dolorificum.

Condylus, idest tuberculum, seu Nodus, est gibba ossium explantatio Radij, & Cubiti, quæ Carpo dearticulantur, ob id etiam aliquando capita dicuntur, & Apophysis, 2. de usup. cap. 2. Dicuntur & Epiphyses, i. artuum capita, ubi enim os medullam habet, eius finibus utrinq; caput instar operculi cuiusdam, ut plurimum uides adnasci, 10. de usup. cap. 18. vide Nodi, & Articulus.

Confusio februm, vide Complexio.

Congelationes, passionες omnes dicuntur, quæ à causa frigida, & vehementibus algoribus ortum duxerunt, libr. de differ. morb. cap. 5.

Conia stacte, idest, Lixiuum destillatum, 1. ad Gl. c. 3.

Coniectura artificiosa est, quæ propè ad ueritatem accedit, 1. de cris. cap. 9.

Coniunctiua oculi tunica, vide Rhagois,

Coniunctiua causæ, vide Continens.

Conoides corpus, sine Turbinatum, quod & Conarium dicitur,

Contentiua causa, vide Continens.

Contentus pulsus, idem ac vebemens, 3. de diff. puls. c. 5.

Continentes causa (quæ continuæ, & coniunctæ dicuntur) sunt, quæ cum præsentibus sunt, morbi quoque adsunt, cum tollantur morbi etiam discedunt, ut spina, telum; opponuntur euidentibus, seu procataceticis, & antegressis causis, quæ dum aduersam valetudinem creant, separantur, ut labor, solis visio, cruditas. Concausæ sunt, quæ affectum suæ vi generare possunt, generant etiam, & alteri coherentes, unde Synætia dicuntur, ut lapis in vesica, & inflammatio, nam ambæ urinae suppressionis causa sunt, & si per se utraque illam generare possit. Coadiutrices causarum partes, quæ suæ virtute morbum efficere non possunt, sed alteri auxiliantur, ut libido articulare morbum promouet. Præcedens siue interna, quæ ab euidentibus, vel præparantur, vel coadiuuantur, ut sanguinis abundantia nutrimenti soboles est. Introd. cap. 8.

Continens febris, vide Cynocha.

Continentia, Ἰσχυρία, vocat Hippo. solida corpori, membra, ut quæ comprehendant, regantque humida, contenta autem humores, ut quia solidis comprehendantur, quæ impetu feruntur spiritus; si quidem in omnem corporis partem momento temporis, & facili, & citra impedimentum perueniunt, lib. de trem. palp. cap. 5. Continentes autem partes erunt, ut corpus solidum Cordis, arteriarum, & aliarum partium cauarum, atque aliquid suo sinu concludentium, quæ sunt bases, radices, & fundamenta aliarum, in ipsis enim singulis triplex adest substantia, verè ipsa solida, circumfusa alia carnosâ muniens, & fouens, & per utranque sparsa spirituosa.

Continua febris Ζυνεχὴς πυρετός, est quæ ad inbriam
cite

citationem antequam ex toto solvatur, non desinit, & si
 declinatio aliqua sensibilis appareat; Cum verò decli-
 natio aliqua sensibilis non fiat, semper verò à primoprin-
 cipio febris usque ad crisin similis perseveraverit, erit
 febris deurens, ardens, Causon, à continuis sola acutie
 differens (quæ enim idem cum genere nomen sortiun-
 tur, atque in pluribus particularibus accessionibus con-
 tinentur, continua appellantur) quæ & Synocha appel-
 latur, hæc quidem Epacmastica, siue increscens, siue Anaba-
 tica, illa homotena siue acmastica, in eodem semper vigore
 & tenore perseverans, ultima paracmastica, siue decrescēs,
 2. de cris. 6. & 2. de differ. feb. cap. 2. Bisariam veteres uti
 continui nomine, & intermittētis vidētur; nam continuas
 vocant febres, quandoque omnes, quæ nullum tempus libe-
 rum habent accessione, quandoque non omnes, quæ accessione
 nunquam vacent sed solas præcipuè illas, quæ omni carent,
 usque ad iudicium mutatione. Ita intermittētes interdum
 appellant illas solas, quæ accessionē perpetuam non habent,
 interdum eas quarum non recedit accessio sed insignes fa-
 ciunt mutationes singularum accessionum, in initium, incre-
 mentum, vigorem, & remissionem; At medici quidam iu-
 niores, quæ non magnam mutationem habent, non cōtinuas,
 idest, synochas, ceterum synochos nominant, continuas au-
 tem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & inter-
 mittunt singulis accessionibus, has vocant antiqui, interim
 continuas, interim intermittētes, nam sunt recte inter cō-
 tinuas, & desinētes in integritatem, mediæ, Proinde recte
 ubi cū synochis conferūtur, intermittētes appellantur, cum
 ad integritatē venientib, cōtinua, co. 3. in 1. de mor. vul. 2.

Continui solutio, ἀποσάμα, vide Unionis solutio.

Contractiones, vide Ganglia.

Con-

Contraindicare, vide Endixis.

Contraria apud Hippoc. & medicos sunt, non in corporum modo qualitate, ut calidum frigido, humidum siccum, sed in quantitate: et ut magnum paruo, laxum aëso, plenū vacuo. quæ Arist. opposita vocat, quo sensu dicunt Medici, curationem fieri per contraria. 1. 1. meth. cap. 12.

Conturbatio seu Perturbatio, παραξίς, vide Taraxis Con-
tusio, θλάσμα est cum graue aliquid, supra corpus incidit, ac
collidit, ita ut carnea pars disrumpatur; cum verò caro con-
tusa, in locum sub cute cruorem contraxerit, sine vlla cutis
diuisione, exuccatio, sugillatio, effusio, nigror, & nigritia
dicitur, venas tamen exiguas, simul cum carne rumpi, ac
discindi in huiusmodi sugillationibus, est perspicuum, 3. de
his quæ in med. 30. lib. de tumor. cap. 105. de compos. med.
per gen. cap. 3. vide Collisio, & Unionis solutio.

Conuexa Hepatis, vide Sima.

Conuulsio, σπασμός; Cum omnes arbitrarj motus mu-
sculis obeantur, quando ad sua ipsorum capita retracti,
vnam quamque particulam, cui inseruntur, simul attra-
xerint, si affectus aliquis intensionem ipsos ducens, acci-
derit, hunc motus sequitur, similis quidem naturali sed
citra uoluntatem, & uocatur affectus conuulsio, lib. de
Trem palp. cap. 8. quam Celsus lib. 2. c. 1. vocat nervorum
distentionem; quæ conuulsio, vel uniuersalis est, ut cum
totū corpus curuatur, aut in priora, & dicitur ἐμπροσθί-
ονος, aut in posteriora, ὀπισθοτονός, aut in utrāq; partē
æqualiter τέτανος, quib. additur & ἐπιληψία, vel par-
ticularis, aut in musculis oculorum & dicitur σπασμὸς,
aut mandibulae πρισμός, aut oris Κανίλος σπασμός, aut
penis Ματυρίασις, vide Rhegma, & Unionis solutio.

Conuulsio canina, σπασμός κανίλος, est affectio muscu-
lorum

rens à Neruo, & Tendone, quod Nerus à Cerebro, vel spinali medulla exorsus, sensum, aut motum membris inducit, Tendo verò finis musculi nervosus est, ex copula, & Neruo procreatus, 1. de placit. cap. 9. quam quidem homines Neruum nuncupant, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. vide Neruum.

Cor *καρδιά*, est viscus, carne dura, fibrosa, caua, constans, principium vitalis facultatis: sunt qui musculum esse definierint, verum & minus rubet quam Musculus & longe durius, spissius, solidiusq. est, multoq. aliter fibris intertextum; fibris namque validis, & rectis caro eius circumfusa est. Unde & Parenchyma, nomine quoque alijs visceribus communi appellatur à basi ipsius in macronem tendentibus, Arteriarum, & calores natiui, quo animal regitur, quasi fons & domicilium, in medio omnino Thorace situm, praesertim sua basi, quam caput eius nominant. 6. de usu par. & 7. de anatom. adm. vocant adhuc, & Cor veteres omnes, os ventriculi, propter affinitatem maximam, quæ illi est cum Corde, & mutuum consensum, ut ostendit Gal. 2. de placit. & 5. loc. aff. 6.

Coracoide, vide Ancyroide, & Acromion.

Coryphe, vide Vertex.

Cornea, siue Corniformis (*κερατοειδής χιτών*, ἢ *ὄμην*) oculi tunica est, tenuis dura, & densa, quæ à dura Cerebri meninge proficiscitur, & tenuem oculi tunicam choroidem in orbem amplectitur, quæ & Ceratoide dicitur, 10. de usu par. c. 2. quæ & Cerulea dicitur, estq. tunica secunda oculi, hoc est proximè subiecta adnata tunica, quam *ἐπιωρίδα* appellant, vide Cerulea, & Ceratoide.

Cornicularis processus, vide Ancyroide.

Corniformis, vide Cornea, & Ceratoide.

Cornua, *Κίρατα*, numerantur inter affectus præternaturam,

turam, sunt autem duæ eminentiſſe offea, quæ prope tempora naſcuntur; dicuntur. & Dionyſiſci, ſunt & cornua vuluæ, ſiue ſinus, duo processus mamillares, à lateribus vuluæ ad utraq; elia, quos alij vocant Cirros, lib. de vulua diff. c. 3. vide Apices matricis.

Corona oculi, vide Iris, & Stephanos, Ἰρις Στεφάνη.

Coronale os, ut Coronalis futura Στεφανιαία ράχη, Στεφανιαία ὀστέον sunt, futura anterior Craniij ab uno temporum offe ad alterum tranſuerſim perueniens, ſic etiam os frontis coronale dicitur, quoniam ea capitis parte ubi ſunt, coronæ geſtari ſoleant, vel quod in orbem frontem cingant, 9. de uſu par. 2. de offib. c. 1. 6. de anat. adm. cap. 1. Inde, & Coronalis vena, Στεφανιαία φλέψ, propago eſt veniens à magno trunco venæ cauæ ſuſum aſcendentis, cingens cordis baſim in modum corona; Eſt & alia venæ cauæ propago, quæ Coronalis ſtomachica Στεφανιαία ſτομαχικὴ appellatur, quæ à ramo ſplenico venæ cauæ proficiſcitur, & ad ſtomachum effertur, ibiq; bipartito ramo, maiore ceu corona ſtomachum totum cingit, minore ad pilorū deſcendit. Qui admodum autem à venæ cauæ, coronalis hac vena proficiſcitur, ſic à magna arteria ſtatim ubi à corde orta eſt, arteriæ duæ coronatoriæ produnt, maior ſub valvula dextra, minor ſub poſtica, quæ in cordis ſuperficiem, & eius partem craſſiorem, perinde ac venę, diſtribuantur, 7. de anat. adm.

Corona, ſiue Coronon, eſt extremum offis, quod in mucronem deſinit, lib. de offib. in præmio, unde omnes apophyſis rotundas appellant coronas, vel coronus, Κοράνη ἢ κεφάλων, ſic autem dicitur, quia τὴν Κοράνην, hoc eſt cornicis roſtro ſimilis ſit, quæ autem Apophyſis in caput craſſum & rotundum deſinit, non Corone, ſed Auchē Græce αὐχὴν, nominatur, 2. de uſu par. c. 14.

Cor.

Corporalis vena, vide Communis.

Corrugatio pupillæ vide Tabes oculi.

Coryza, grauedo, κορυζα, tenuis, & incoctus humor est, qui per nares secernitur, quasi grauedinem dixeris quem admodum talis defluxio, cum per palatum fit, dicitur catarrhus, 2. progn. 49. est autem hic humor, non qui proprie ὠμὸς, siue crudus dicitur, sed qui ἀπυρτός, hoc est liquidus, & tenuis, Celsus autem author est. & destillationem, & grauedinem κορόζας Hippocratem appellasse. Catarrhum appellamus, cum quod supernacuum est in cerebro, in os diffluit, Coryzan cum in nares, Bronchos autem siue rancitas catarrhis superuenit, faucibus scilicet humore imbutis, quod si in Gargareonem fluxio procumbit, quam ex similitudine Græci Staphylen, id est, acium vocant, in ea gignit, aut alias eam in tumorem attollit, at si glandulas, antiadas, si in eas, quæ ijs proxima sunt Paristhymia, 3. de sympt. caus. c. 4.

Costa extrema est, non parua illa re uera spuria, quæ ab alijs discedit, & carnosæ parti septi transuersi obducta est, sed ipsi proxima, cui manifesta iam membrana tenuis intus subtenditur, ei continua, quæ omnes costas subcingit. 5. de anatom. adm. c. 3.

Costæ, ossa pectoris sunt, quæ a collo toto ad ilia usque ex anteriore parte, ad utrumque latus protenduntur, lib. Introd. cap. 10. & 3. de artic. 37. duodecim ut plurimum numero sunt, ex quibus superiores septem simpliciter πλευραὶ dicuntur, quinque verò reliquæ costæ inferiores ὑψαὶ dicuntur, hoc est spuria, & illegitimæ, quia imperfectæ sunt.

Cotyle, κοτύλη, unde Articulus & Acetabulum.

Cotyledones, κοτυληδόνες, vide Acetabulum.

Coxa, quæ & ἰσχίον, magnum femoris ossis caput est,

Græce ισχον, id est Coxa appellatur, veluti cavitās eius, acetabulum dicitur, 2. de fract. 70. unde affectus fit, qui Ischias & Coxendix appellatur, inde Ischiadici, & coxarij, id est, coxæ morbo laborantes, 7. de comp. med. per gen. cap. 26. Ischion aliquando significat ligamentum ipsum, quo femur coxendicis acetabulo colligatur, interdum verò ipsū articulum; sed & Ischia ισχία dicuntur à quibusdam partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, quæ & σκαρία à Græcis, à Latinis Clunes appellantur, os autem Coxendicis, est apophysis ossis sacri, ad coxendicis acetabulum undique pertinens. Os enim sacrum, qua parte femoris caput ei inseritur, Ischion vocatum est.

Cranium, Calua, Caluaria Κρανιον, est os capitis crassum, rarū, rotundū, ossibus septem compactum, suturisq. distinctum, Cerebrum continens, atque utramque meningem ambiens, quod quasi Κράνος, id est, galea cerebro adiaceat, 8. de usu par. cap. 9.

Crasis, Græce Κράσις, & Κρήσις, temperiem significat, 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana, vide Membrana dura.

Crassa vena, i. humeralis, 1. de artic. 53.

Crassus pulsus, vide Gracilis.

Crea, vide Tibia.

Creber pulsus est, cuius intermedia quietis est brevis tempus, rarus, cum longum; 4. de puls. ad Tyron. c. 4.

Cremasteres, vide Testes.

Cremor, idem est ac Chymus χυμός, 3. de natur. facul. capit. 4.

Cremor ptisanæ est, ubi à decoctione quis ptisanam colauerit, deinde cremorem separauerit, hac ptisana non dicitur, sed ptisanæ cremor. 1. acutor. 26.

Cricoides cartilago, est laryngis cartilago, basim
annuli

annuli figuram representatē efficiens; Tribus enim cartilaginibus constat larynx, quarum prima maxima ex internis partibus collocatur, cuius convexum extra prominet, concavum intus, quę dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, à quo *Anatomici Thyroidem*, id est scutiformem, alij peltalem, quod pelte formam agat, nominant. Posterior quę basim *Cricoidem*, id est annuli figuram imitatem efficit, postremæ ipsis asperę arterię cartilagini, signę literam imitanti, incumbit; Scutiformi verò in priori sui ipsius parte subiacet, (quę & *Cricoides*, *Cymbalaris*, & *Coopertoria* dicitur) Reliqua ab his *Cartilago*, quatum positione, cum magnitudine tertia est, in suprema *Cricoidis*, (quæ, & innominata dicitur) *Cartilaginis* parte sita est, gutturnijs, infundibulisq. quas *Arytēnes* vocant similis, unde & *Arytēnoides* dicitur; Quæ autem à radice linguę exoritur, quā *Epiglottida*, quasi superlingulam dixeris, non est bronchi propria, l. de voc. inst. dist. c. 4. & 7. de usup c. 11. & li. de anat. viii.

Crimnoides *Urina* *Κριμνώδης*, cuius sedimenta *crimneidea* sunt, id est, quæ speciem fursuris, vel spumę referunt, significantq. sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationem, si alba, li. de urinis. cap. 29. vide *Hypostasis*.

Crisis, sine *Iudicium*, sine *Iudicatio* *Κρισις* apud aliquos est subita in morbo mutatio, apud alios est in meliorem statum inclinatio sola, apud alios est ea, quæ antecedit agitatio, apud alios integra totius morbi solutio; apud alios illa tantum morbi solutio, quæ ad bonum fit, l. de cris. cap. 1. Sed ea, quę repente fit, per excellentiam *Crisis* dicitur, quæ natura, quæ præter naturam sunt, superante, exquisite perficitur, 3. de cris. capit. 1. *Iudicatio* per morbos, de foro translatitia appellatione dicta est,

significans præcipitem in morbo mutationem, cum quadã
 zudenti euacuatione, uel abscessu, quæ quadrifariam ex-
 istit, aut enim statim iudicatur a morbis, aut magnam ob-
 tinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut
 multo deteriores euadunt; Itaque duas primas iudicatio-
 nes, proximas duas magna ex parte cum adiectione, malã,
 aut prauam iudicationem, quandoque uerò sine adiectione
 simpliciter, 3. prognost. 1. Vtitur idem Hipp. Crisi pro
 λύσι, id est solutione morbi, ut in progn. optimam eam di-
 cit esse urinam, in qua per totum morbi curriculum, donec
 ipse indicatus sit, subsidet album, laue, & æquale. Tertia ad
 huc est eiusdem Κρίσεως significatio, ad motum uehementẽ
 naturæ pro cuiuslibet rei molestiæ depulsione, secundum quã
 nodo morbi, sed & cõceptiones, & abortiones, & partus,
 & omnino quæcunq; magno conatu naturæ indigent, dicun-
 tur Iudicari, lib. de sympt. par.

Crisis asima, quæ a nullo dierum iudicantium fuerit in-
 dicata, 3. de cris. 10. periculosa quæ cum grauibz sympto-
 matis accidit; Infida seu incerta, cum morbi recidua con-
 tingit; Obscura, quæ citra excretionem, uel abscessum eu-
 identem euenit; Absoluta quæ in morbo nihil facit reliqui,
 1. die. de cr. cap 2.

Crisis imperfecta, quæ non omnino à morbo liberat. 3. de
 cris. 7. sed ex morbo quippiam relinquit, 1. die. de cr. cap. 2.

Crisima signa, i. decernentia, & indicantia, 1. aph. 12.

Crite, i. Hordeum, siue Hordeolum, siue Posthia, & ocu-
 lorum tuberculum, de remed. par. fac. cap. 10. uide Hordeo-
 lus, Posthia, Chalazia.

Crotaphite, Κροταφαίται, id est, temporales muscoli, qui
 maxillam inferiorem mouent, & sursum trahunt, & intra
 os siti sunt, lib. de musc. diss. c 6. uide Mlanducatorij.

Cruda Urina, uide Aquosa.

Crudi-

Cruditas ἀμόρτης est, cum *Ventriculus*, vel proprio morbo, uel vitiosis humoribus in ipso accumulatis, vel praua alimentorum qualitate, ut nidorosa, acida, fœteri, aut putredini, aut corruptioni obnoxia, aut ex præparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, ea non amplectitur, sed in ipso corrumpuntur. Differens ab incoctione, quæ est rerum, quæ non possunt concoqui, ut acinorũ, & omnium, quæ omnino imputria, & immutata deijciuntur, 1. de loc. aff. cap. 3.

Crudus humor ἀμόρ: χυμός est, cum alimentum suam naturam, in uentriculo, hepate, & intestinis, quàm diutissime seruat, nulla alteratione ex particula, quæ ad ipsum concoquendum, est destinata. suscepta, uel cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem, 8. de comp. med. loc. cap. 6. Humor crudus, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet, ijs præsertim quæ ex edacitate sedimẽ multum fabacea pulticulæ simile obtinent. quin & corporibus ijs, quæ ab exercitatione abstinuee cibis verò quàm plurimis, ac balneis post sumptos cibos uti bātur, sæpe eiusmodi humor confertim per alium descendit, sed & una cum hoc humore, perinde ac cum pituita, decolor quadam in toto corpore subest albedo, quæ crudus humor inappetentes homines efficit. lib. de multitud. c. 11.

Crura κνῆμαι dicuntur extremæ corporis partes, quæ thoracem medium, & imum ventrem prætergrediuntur, ut quicquid prominet ultra os sacrum, & carnosos musculos ibi subiectos infernè usque ad pedes, & id quod supernè ultra thoracem & scapulos usque ad manus, id crura dicantur, lib. Introd. cap. 10.

Cryforchis, Κρυσορχῆς, est testiculi, aut testiculorum ocultatio, vel recessio, lib. finit.

CrySTALLINUS humor, Κρυσταλλεινὸς ὕγρην, & *crystat-*
F 4 loidis

lroidis (qui glacialis adhuc dicitur, quod concretam glaciem imitetur 7. de placit. cap. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, in quo fit visio, primumque videnti instrumentum, qui per *Diadosin*, id est, transumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adhæret vitreus oculi humor, qui & *Hyeloides* dicitur, quique quanto crassior, & albior est sanguine, tanto à crystallino humore, humiditate, atque albedine relinquitur; subest huic *Albugineus*, albo oni similis, quem *Hydatoidem* quod aqua sit similis, vocant, 10. de usu par. cap. 1. lib. de ocul. capit. 2. & *Introd* capi. 11.

Ctir, κτήρ, muliebris pudendi sinus, pilis decoratus, appellatur, quæ sinum ambiunt, περιγύματα, id est, alæ vocantur, 15. de usu par.

Cubitus, (πῆχυς αὐτῶν, ἀγὼς οὗ λέγεται πῆχυς ὡς ἐν) est os, quod inter *Humerum*, & *Carpon*, quod brachiale dicitur, situm est; eiusdemque partis os grandius *Cubitus* item dicitur, qui alteri subest ossi, quod *Radium* nominant, lib. de ossib. capit. 17. quem cubitum *Pechym*, id est, vlnam dicunt, 2. de usu par. 2. claurius. *Cubitus Pechys* πῆχυς, seu vlna *Arabibus* facile maius, est ea pars totius brachij, quæ supernè terminatur, qua brachio quidem continua est, per articulum, qui in curvatura cubiti est, cui innitimur; inferne autem qua *Carpo* manus; quo spatio, duo ossa recipiuntur, alterum magnum, & rotundum, nominatum eodem nomine quo pars, id est, cubitus, alterum quod *Cercbis*, *Arabibus* facile minus, id est *Radius* appellatur, 2. de motu muscul. cap. 2. & 1. de fract. 18.

Cubiforme os, quod Κυβοειδὲς ὀστέον, siue os cubiti dicitur, est os quod ab externis pedis partibus firmum in terra statuitur, externisq. *Tarsi* partibus, est locatum & de-

articulatur cavitati calcanei ad finē adiacenti, 3. de usu par. 7. est enim os vnum, ex quattuor tarsis ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus, est autem os, ut reliqua Tarsi ossa, intus cauum, foris gibbum, est autem os cubo simile, quod latera sex habeat cubo communia.

Cuculus, vide Coccyx.

Cucurbitula leues, quę citra scarificationem adaptantur, 3. loc. aff. cap. 4.

Cunei os, quod ὀστέον σφινκτικόν, os basilare, & os palati appellant, medium inter superiora, & inferiora totius capitis ossa, de ossib. cap. 1.

Cunus, inanitas ea est, quę inter ossa pubis penetrat, extrinsecus, pelliculam quandam habens, virorum preputio correspondentem, lib. de vulua diff. c. 2.

Curatoria, Θεραπευτικὴ medicinę pars, est, quę tum factum morbum tollit, ut Hecticam, & Ephemeram febrē, tum quę sit ut putridam, tum quę imminet, aut qui futurus timetur, quod est proprium προεϋλακτικὴς, quę hac ratione, sub Therapeuticam cadit; cuius tres sunt parte ad curationem necessarię διαιτητικὴ, φαρμακευτικὴ, χειρουργικὴ, quarum prima victus rationem instituit, altera medicamenta propinat, postrema manum adiutricem admouet, de part. art. med. cap. 1.

Curta, κολοβώματα, i. mutila & curta id autem dicitur à Græcis Coloboma quod in labijs, aut narium alis, aut aure deficit, huius generis sūt, & quas ī maiore angulo Rhegidas vocant, eo vtique, vel impensius extenuato, minore vel facto, vel prorsus abolito, vide Colobomata.

Cuticula, vide Cutis suprema.

Cuticularis membrana, vide membrana dura.

Cuticulosus musculus est, qui extrema sedis ora cuti com-

*commixtus obtinet, ut vel cuticulosus musculus, vel car-
nosa cutis dici possit. lib. de musc. dist. c. 30.*

Cutis suprema *δερμὶς*, & *δέρμα*, quæ & *Drema* dicitur, quasi *Corium* dixeris, quia excoriari potest, cuius exterior pars, *Epidermis*, siue *summa cutis corporis*, siue *cuticula* est, & toti superextenso, sensuq. destituta, & quæ sæpe citra dolorem facile ab ea separatur, 2. de usu par. cap. 6. & 3. meth. 4.

Cyboides, vide *Cubiforme*.

Cycliscus sunt caua excisoria scalpria, 6. meth. 6.

Cyllum, *Κυλλὸν* dicitur apud Hippocr. crus varum, i. in exteriorem partem luxatum, vel conuersum, adeo ut *Suræ* processus, qui talem exterius complectitur, sine ullo stabilitamento suspensus relinquatur, quamuis propriè mutilum, & imperfectum significet, ut scribit Gal. 3. de diebus criticis, ubi in ea significatione mensem *Κυλλὸν* appellari inquit, qui diebus viginti nouem constet, alios autem perfectos qui triginta. Vnde *Cylosim* *κίλλωσιν* distortionem cruris in exteriorem partem vocat Gal. 4. de artic. Idem tamen com. 3. dicit nonnullos de omni longorum membrorum distortionem *Κίλλωσιν* intelligendam censere. generaleq. ei tribuere significatum; alios verò eo nomine distortionem solum intelligere, in qua in interiorem partem membrum inclinatur.

Cyema, *κύημα*, fœtus est cum nondum menses duos in utero absoluerit, quo tempore *Embryon* dici nequit, sed *Cyema*, i. uteri gestatio, & conceptus, & genitura, 1. de sympt. caus. c. 7.

Cymbalaris, vide *Cricoides*.

Cynæche, est inflammatio extra guttur existens. quæ & *Paracynanche* dicitur, si autem sit inflammatio adiacentium musculorum faucibus adueniens, dicitur *synanche*,
vel

uel parafsynanche, 4. aph. 34. propriè loquendo, angina Græcis est inflammatio, quæ in gutture, & faucibus aduenit; Hippocrates uerò & alij ueteres omnes passionēs in ijs locis aduenientes, quas spirandi difficultas comitatur, angina nomine uocant, nullo existente in pectore, uel pulmone uitio, qua in re differt angina concursus a Peripneumonia, & laterali morbo, atque ex eo, quod angustia sensus in gutture est, suntq. eiusdem exquisitè loquendo quattuor differentia, una ubi fauces inflammantur, altera ubi neque reliquæ oris partes, neque etiam externarum partium ulla inflammata uidetur, æger tamen suffocationis periculum in gutture persentit. Tertia quando gutturis partes, tum externæ, tum internæ similiter inflammantur. quarta ubi ad anteriorem regionem, ceruicis uertebra luxantur, & inde canus apparet locus, doloremq. quando tangitur, æger sentit. Recentiores Græci quidam ut est Paulus, lib. 3. cap. 27. & nostræ ætatis Medici non pauci, inter Cynanchen, & Synanchen, inter Paracynanchen, & Parafsynanchen discrimen faciunt, quod tamen Galenus, lib. 4. de loc. aff. c. 5. & 3. progn. 20. reprehendit. Inflammationem itaque, quæ in interioribus faucium musculis oritur, Συναγχν nominant eam uerò, quæ in exterioribus eorundem musculis fit, Παρασυγχν, Inflammationem item, quæ in interioribus musculis gutturis accidit, uocant Κυναγχν, eam autem, quæ in exteriorib. eiusdem musculis oritur, Παρακυναγχν, uide Angina.

Cynodontes, uide Canini dentes.

Cyphosis κύφωσις, gibbositas, seu gibborositas, uitium spinæ est, quod a casu ictu, & tuberculis duris, anteriorem thoracis partem distendentibus pulmonemq. prementibus, aliquando contingit, ut docet Gal. eo aph. quo scribit Hipp. gibbos ex asthmate, aut tussi factos, ante pubertatē mori, uide

vide Gibborositas; Dicitur eadem, Κύρτωσις, ut annotauit Gal. 1. de artic. opposita huic contorsio, dicitur Lordosis, Δόρδωσις spinae uerteribus in anteriorem partem cōuersis, *vide Lordosis*.

Cyrtoſis, vide Cyphosis.

Cyrtoſis, κύρτωμα, turbeculum in Ilijs appellauit Hip. quod & œdema ab eodem appellari solet. 2. progn. 25.

Cyſaros, κύσαρος, est ultimum intestinum in ordine, quod & rectum dicitur, & podex est, lib. quod animal sit, id, cap. 5. *vide Rectum.*

Cyſtis, κύσις, vesica, est pars membranosa, urinam à renibus excipiens, & foras excernens, exanguis, quæ & si ex nullo neruo corpore originem ducat, quia tamen latissime distendi, & arctissime contrahi potest, ut reliqua omnia alba, & exanguia, ex quadam similitudine neruosa dicta est, licet in eam neruuli quidam inferantur; In qua renes, tanquam in lagenam urinam deponunt per meatus ueteres dictos, qui à renibus prodeuntes, obliquo itinere delati inter ipsius tunicas, paulo supra ipsius os, inferuntur; Cuius uesicæ ceruicem musculus ambit, transuersis constans fibris, quibus undequaque constrictis, uesicam claudit, ne urina efflat.

Cyſtis choledocos, quæ, & uesica fellis, & uesica bilis susceptiua, Græce autem κύσις χοληδοχος, dicitur uesica, est, ad Hepar sita, in cauis ipsius, inter uenæ portæ & cænæ radices, bilem ex iecinore attrahens, quam rectis fibris, trahit ex hepate, obliquis retinet, transuersis uerò expellit, quæ & ob id, fellis folliculus appellatur, 4. de usu par. cap. 12. & 2. de natural. fac. cap. 9. & 9. de anatom. adm. cap. 2.

D

DACTYLION, πρῶτος καὶ ἡ' ὄρα, id est podex,
1. de comp. med. loc. cap. 15. sunt autem qui rectum
intestinum eo nomine intelligant.

Darſis, id est, excoriatio qua cutis, à subiectis partibus
scalpello deciditur, 3. de anat. adm. cap. 2.

Dartos una est è quatuor membranis, quę testes inuol-
uunt; earum prima & intima Epididymis, post eam Ery-
throides, id est vaginalis, tertia Dartos carnosæ, Erythro-
ide multo valentior, quarta & extrema Scrotum est. Introd.
cap. 11. Mulierum autem testes, penitus in vulua latentes,
unica tamentunica contenti sunt, quę Dartæ appellatur,
pro portione respondens tertię testium marium tunicę, ce-
teris autem carent. de dissect. vuluæ, cap. 9.

Dasympa, oculi vitium, idem quod Trachoma, ut scri-
bit Aetius, lib. 7.

Dearticulatio, ea est ossium naturalis coniunctio, quę
evidentem motū habent, ut coarticulatio naturalis ossium
est commissio, quę exiguum & obscurum aliquando, aliquā-
do nullum motū præferunt, 2. de artic. 8. & 1. de artic. 1.

Declinatio est illa paroxysmi pars, quę statum ipsam
subsequitur, usque ad secundę accessionis principium. 1. cri.
3. vide Principium.

Decrescens febris, vide Continua.

Decretorius, siue Indicatorius dies est, in quem pluri-
mum iudicij tempus incidit, 1. de diebus decret. cap. 3. Est
adhuc alius dies Indicatorius incidens, in quo imperfe-
ctę solent fieri iudicationes, ut tertia, quinta, sexta, no-
na, 3. progn. 1. Decretoria autem signa sunt, quę salutem
ægri, per crisin futuram ostendunt, 1. cris. cap. 7. Inci-

den-

Græce ισχον, id est Coxa appellatur, veluti cavitatis eius, acetabulum dicitur, 2. de fract. 70. unde affectus fit, qui Ischias & Coxendix appellatur, inde Ischiadici, & coxarij, id est, coxæ morbo laborantes, 7. de comp. med. per gen. cap. 16. Ischion aliquando significat ligamentum ipsum, quo femur coxendicis acetabulo colligatur, interdum verò ipsū articulum; sed & Ischia ισχία dicuntur à quibusdam partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, quæ & σκαρία à Græcis, à Latinis Clunes appellantur, os autem Coxendicis, est apophysis ossis sacri, ad coxendicis acetabulum undiq. pertinens. Os enim sacrum, qua parte femoris caput ei inseritur, Ischion vocatum est.

Cranium, Calua, Caluaria Κρανιον, est os capitis crassum, rarū, rotundū, ossibus septem compactum, suturisq. distinctum, Cerebrum continens, atque utramque meningem ambiens, quod quasi Κράνος, id est, galea cerebro adiaceat, 8. de usu par. cap. 9.

Crasis, Græce Κράσις, & Κρήσις, temperiem significat, 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana, vide Membrana dura.

Crassa vena, i. humeralis, 1. de artic. 53.

Crassus pulsus, vide Gracilis.

Crea, vide Tibia.

Creber pulsus est, cuius intermediæ quietis est breue tempus, rarus, cum longum; 4. de puls. ad Tyron. c. 4.

Cremasteres, vide Testes.

Cremor, idem est ac Chymus χυμός, 3. de natur. facul. capit. 4.

Cremor ptisanæ est, ubi à decoctione quis ptisanam colauerit, deinde cremorem separauerit, hac ptisana non dicitur, sed ptisanæ cremor. 1. actor. 26.

*Cricoides chartilago, est laryngis chartilago, basim
annuli*

annuli figuram repræsentatē efficiens; Tribus enim chartilaginibus constat larynx, quarum prima maxima ex internis partibus collocatur, cuius conuexum extra prominet, concavum intus, quæ dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, à quo Anatomici Thyroidem, id est scutiformem, alij peltalem, quod pelte formam agat, nominant. Posterior quæ basim Cricoidem, id est annuli figuram imitatem efficit, postremæ ipsis aspergē arteriæ chartilagini, signæ literam imitanti, incumbit; Scutiformi verò in priori sui ipsius parte subiacet, (quæ & Cricoides, Cymbalaris, & Coopertoria dicitur) Reliqua ab his Chartilago, quæ tum positione, cum magnitudine tertia est, in suprema Cricoidis, (quæ, & innominata dicitur) Cartilaginis parte sita est, gutturniis, infundibulisq. quas Arytēnes vocant similis, unde & Arytēnoides dicitur; Quæ autem à radice linguæ exoritur, quæ Epiglottida, quasi superlingulam dixeris, non est bronchi propria, l. de voc. inst. dist. c. 4. & 7. de usup c. 11. & li. de anat. viii.

Crimnoides Urina Κριμνώδης, cuius sedimenta crimneidea sunt, id est, quæ speciem fursuris, vel spumę referunt, significantq. sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationem, si alba, li. de urinis, cap. 29. vide Hypostasis.

Crisis, siue Iudicium, siue Iudicatio Κρίσις apud aliquos est subita in morbo mutatio, apud alios est in meliorem statum inclinatio sola, apud alios est ea, quæ antecedit agitatio, apud alios integra totius morbi solutio; apud alios illa tantum morbi solutio, quæ ad bonum fit, l. de cris. cap. 1. Sed ea, quæ repente fit, per excellentiam Crisis dicitur, quæ natura, quæ præter naturam sunt, superante, exquisite perficitur, 3. de cris. capit. 1. Iudicatio per morbos, de foro translatitia appellatione dicta est,

significans precipitem in morbo mutationem, cum quadā
evidenti euacuatione, uel abscessu, quę quadrifariam ex-
istit, aut enim statim iudicatur a morbis, aut magnam ob-
tinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut
multo deteriores euadunt; Itaque duas primas iudicatio-
nes, proximas duas magna ex parte cum adiectione, malā,
aut prauam iudicationem, quandoque uerò sine adiectione
simpliciter, 3. prognost. 1. Vtitur idem Hipp. Crisi pro
λύσις, id est solutione morbi, ut in progn. optimam eam di-
cit esse urinam, in qua per totum morbi curriculum, donec
ipse iudicatus sit, subsidet album, laue, & equale. Tertia ad
huc est eiusdem Κρίσεως significatio, ad motum uebementē
naturę pro cuiuslibet rei molestię depulsione, secundum quā
modo morbi, sed & cōceptiones, & abortiones, & partus,
& omnino quęcunq; magno conatu naturę indigent, dicun-
tur Iudicari, lib. de sympt. par.

Crisis asima, quę a nullo dierum iudicantium fuerit in-
dicata, 3. de cris. 10. periculosa quę cum grauib; sympto-
matis accidit; Infida seu incerta, cum morbi recidua con-
tingit; Obscura, quę citra excretionem, uel abscessum eu-
identem euenit; Absoluta quę in morbo nihil facit reliqui,
1. die. de cr. cap. 2.

Crisis imperfecta, quę non omnino à morbo liberat. 3. de
cris. 7. sed ex morbo quippiam relinquit, 1. die. de cr. cap. 2.

Crisima signa, i. decernentia, & iudicantia, 1. aph. 12.

Crite, i. Hordeum, siue Hordeolum, siue Posthia, & ocu-
lorum tuberculum, de remed. par. fac. cap. 10. uide Hordeo-
lus, Posthia, Chalazia.

Crotaphite, Κροταφίται, id est, temporales muscoli, qui
maxillam inferiorem mouent, & sursum trahunt, & intra
os siti sunt, lib. de musc. diss. c. 6. uide Masticatoriij.

Cruda Urina, uide Aquosa.

Crudi-

Cruditās ἀμόρνος est, cum *Ventriculus*, vel proprio morbo, vel vitiosis humoribus in ipso accumulatis, vel praua alimentorum qualitate, ut nidorosa, acida, fœteri, aut putredini, aut corruptioni obnoxia, aut ex preparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, ea non amplectitur, sed in ipso corrumpuntur. Differens ab incoctione, quæ est rerum, quæ non possunt concoqui, ut acinorũ, & omnium, quæ omnino imputria, & immutata deijciuntur, 1. de loc. aff. cap. 3.

Crudus humor ἀμὸς χυμὸς est, cum alimentum suam naturam, in uentriculo, hepate, & intestinis, quàm diutissimè seruat, nulla alteratione ex particula, quæ ad ipsum concoquendum, est destinata, suscepta, uel cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem, 8. de comp. med. loc. cap. 6. Humor crudus, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet, ijs præsertim quæ ex edacitate sedimẽ multum fabaceæ pulticulæ simile obtinent. quin & corporibus ijs, quæ ab exercitatione abstinue, e. cibis verò quàm plurimis, ac balneis post sumptos cibos uti bātur, sæpe eiusmodi humor confertim per aluum descendit, sed & una cum hoc humore, perinde ac cum pituita, decolor quadam in toto corpore subest albedo, qui crudus humor inappetentes homines efficit. lib. de multitud. c. 11.

Crura κρῦμαί dicuntur extremæ corporis partes, quæ thoracem medium, & imum ventrem prætergrediuntur, ut quicquid prominet ultra os sacrum, & carnosos musculos ibi subiectos infernè, vsque ad pedes, & id quod supernè ultra thoracem & scapulos vsque ad manus, id crura dicantur, lib. Introd. cap. 10.

Cryforchis, Κρυφορχῆς, est testiculi, aut testiculorum occultatio, vel recessio, lib. finit.

CrySTALLINUS humor, κρυσταλλινὸς ὑγρὸν, & *crysal-*
F 4 *loidis*

lroidis (qui glacialis adhuc dicitur, quod concretam glaciem imitetur 7. de placit. cap. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, in quo fit visio, primumque videnti instrumentum, qui per *Diadosin*, id est, transumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adhæret vitreus oculi humor, qui & *Hyeloides* dicitur, quique quanto crassior, & albior est sanguine, tanto à crystallino humore, humiditate, atque albedine relinquitur; subest huic *Albugineus*, albo oni similis, quem *Hydatoidem* quod aqua sit similis, vocant, 10. de usu par. cap. 1. lib. de ocul. capit. 2. & *Introd* capi. 11.

Ctir, κτῆρ, muliebris pudendi sinus, pilis decoratus, appellatur, quæ sinum ambiunt, περιγύματα, id est, alæ vocantur, 15. de usu par.

Cubitus, (πῆχυς αὐτῶν, αὐτοῦ οὐ λείπειν πῆχυς ὡλεῖν) est os, quod inter *Humerum*, & *Carpon*, quod brachiale dicitur, situm est; eiusdemque partis os grandius *Cubitus* item dicitur, qui alteri subest ossi, quod *Radium* nominant, lib. de ossib. capit. 17. quem cubitum *Pechym*, id est, vlnam dicunt, 2. de usu par. 2. claurius. *Cubitus Pechys* πῆχυς, seu vlna *Arabibus* facile maius, est ea pars totius brachij, quæ superne terminatur, qua brachio quidem continua est, per articulum; qui in curvatura cubiti est, cui innitimur; inferne autem qua *Carpo* manus; quo spatio, duo ossa recipiuntur, alterum magnum, & rotundum, nominatum eodem nomine quo pars, id est, cubitus, alterum quod *Cerchis*, *Arabibus* facile minus, id est *Radius* appellatur, 2. de motu muscul. cap. 2. & 1. de fract. 18.

Cubiforme os, quod Κοκοῖδὸς ὀστέον, siue os cubiti dicitur, est os quod ab externis pedis partibus firmum in terra statuitur, externisq. *Tarsi* partibus, est locatum & de-

articulatur cavitati calcanei ad finē adiacenti, 3. de usu par. 7. est enim os unum, ex quattuor tarfi ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus, est autem os, ut reliqua Tarsi ossa, intus cauum, foris gibbum, est autem os cubo simile, quod latera sex habeat cubo communia.

Cuculus, vide Coccyx.

Cucurbitula leues, quæ citra scarificationem adaptantur, 3. loc. aff. cap. 4.

Cunei os, quod ὀστέον σφινκτερός, os basilare, & os palati appellant, medium inter superiora, & inferiora totius capitis ossa, de ossib. cap. 1.

Cunus, inanitas ea est, quæ inter ossa pubis penetrat, extrinsecus, pelliculam quandam habens, virorum preputio correspondentem, lib. de vuluæ diff. c. 2.

Curatoria, Θεραπευτικὴν medicinæ pars, est, quæ tum factum morbum tollit, ut Hæcticam, & Ephemeram febrē, tum quæ sit ut putridam, tum quæ imminet, aut qui futurus timetur, quod est proprium προελακτικὴς, quæ hac ratione, sub Therapeuticam cadit; cuius tres sunt parte ad curationem necessarię διαγνωστικὴ, φαρμακευτικὴ & χειρουργικὴ, quarum prima vietus rationem instituit, altera medicamenta propinat, postrema manum adiutricem admouet, de part. art. med. cap. 1.

Curta, Κολοβώματα, i. murila & curta id autem dicitur à Græcis Coloboma quod in labijs, aut narium alis, aut aure deficit, huius generis sūt, & quas ī maiore angulo Rhēdas vocant, eo utique, vel impensius extenuato, minoreve facto, vel prorsus abolito, vide Colobomata.

Cuticula, vide Cutis suprema.

Cuticularis membrana, vide membrana dura.

Cuticulosus musculus est, qui extrema sedis ora cuti-

com-

*commixtus obtinet, ut vel cuticulosus musculus, vel car-
nosa cutis dici possit. lib. de musc. dist. c. 30.*

*Cutis suprema δέρμῖς, & δέρμα, quæ & Drema dicitur,
quasi Corium dixeris, quia excoriari potest, cuius exterior
pars, Epidermis, siue summa cutis corporis, siue cuticula
est, & toti superextenso, sensuq. destituta, & quæ sæpe citra
dolorem facile ab ea separatur, 2. de vsu par. cap. 6. & 3.
meth. 4.*

Cyboides, vide Cubiforme.

Cycliscus sunt caua excisoria scalpæ, 6. meth. 6.

*Cyllum, Κυλλὸν dicitur apud Hippocr. crus varum, i. in
exteriorem partem luxatum, vel conuersum, adeo ut Suræ
processus, qui talem exterius complectitur, sine ullo stabi-
limento suspensus relinquatur, quamuis propriè mutilum,
& imperfectum significet, ut scribit Gal. 3. de diebus criti-
cis, ubi in ea significatione mēsem Κυλλὸν appellari inquit,
qui diebus viginti nouem constet, alios autem perfectos qui
triginta. Vnde Cyllōsim κῑλλωσιν distortionem cruris in
exteriorem partem vocat Gal. 4. de artic. Idem tamen
com. 3. dicit nonnullos de omni longorum membrorum di-
storsione Κῑλλωσιν intelligendam censere. generaleq. ei tri-
buere significatum; alios verò eo nomine distortionem so-
lum intelligere, in qua in interiorem partem membrum in-
clinatur.*

*Cyema, Κύημα, fœtus est cum nondum menses duos in
utero absoluerit, quo tempore Embryon dici nequit, sed
Cyema, i. uteri gestatio, & conceptus, & genitura, 1. de
symp. caus. c. 7.*

Cymbalaris, vide Cricoides.

*Cynæche, est inflammatio extra guttur existens. quæ &
Paracynanche dicitur, si autem sit inflammatio adiacen-
tium muscutorum faucibus adueniens, dicitur synanche,
vel*

uel parafsynanche, 4. aph. 34. propriè loquendo, angina Græcis est inflammatio, quæ in gutture, & faucibus aduenit; Hippocrates uerò & alij ueteres omnes passionēs in ijs locis aduenientes, quas spirandi difficultas comitatur, angina nomine uocant, nullo existente in pectore, uel pulmone uitio, quæ in re differt angina concursus a Peripneumonia, & laterali morbo, atque ex eo, quod angustia sensus in gutture est, suntq. eiusdem exquisitè loquendo quattuor diff. ferentia, una ubi fauces inflammantur, altera ubi neque reliquæ oris partes, neque etiam externarum partium ulla inflammata uidetur, æger tamen suffocationis periculum in gutture persentit. Tertia quando gutturis partes, tum externæ, tum internæ similiter inflammantur. quarta ubi ad anteriorem regionem, cervicis uertebra luxantur, & inde canus apparet locus, doloremq. quando tangitur, æger sentit. Recentiores Græci quidam ut est Paulus, lib. 3. cap. 27. & nostræ ætatis Medici non pauci, inter Cynanchen, & Synanchen, inter Paracynanchen, & Parafsynanchen discrimen faciunt, quod tamen Galenus, lib. 4. de loc. aff. c. 5. & 3. progn. 20. reprehendit. Inflammationem itaque, quæ in interioribus faucium musculis oritur, Συναγχνη nominant eam uerò, quæ in exterioribus eorundem musculis fit, Παρασυναγχνη, Inflammationem item, quæ in interioribus musculis gutturis accidit, uocant Κυναγχνη, eam autem, quæ in exteriorib. eiusdem musculis oritur, Παρακυναγχνη, uide Angina.

Cynodontes, uide Canini dentes.

Cyphosis κύρσις, gibbositas, seu gibborositas, uitium spinæ est, quod a casu ictu, & tuberculis duris, anteriorem thoracis partem distendentibus pulmonemq. prementibus, aliquando contingit, ut docet Gal. eo aph. quo scribit Hipp. gibbos ex asthmate, aut tussi factos, ante pubertatē mori, uide

D

DACTYLION, *πρωκτός καὶ ἡ' ὄπα*, id est *podex*,
1. de comp. med. loc. cap. 15. sunt autem qui rectum
intestinum eo nomine intelligant.

Darsis, id est, excoriatio qua cutis, à subiectis partibus
scalpello deceditur, 3. de anat. adm. cap. 2.

Dartos una est è quatuor membranis, quæ testes invol-
vunt; earum prima & intima Epididymis, post eam Ery-
throides, id est vaginalis, tertia *Dartos* carnosæ, Erythroi-
de multo valentior, quarta & extrema Scrotum est. Introd.
cap. 11. Mulierum autem testes, penitus in vulva latentes,
unica tamentunica contenti sunt, quæ *Darta* appellatur,
pro portione respondens tertiæ testium marium tunicæ, ce-
teris autem carent. de dissect. vulvæ, cap. 9.

Dasympma, oculi vitium, idem quod *Trachoma*, ut scri-
bit Aetius, lib. 7.

Dearticulatio, ea est ossium naturalis coniunctio, quæ
evidentem motum habent, ut coarticulatio naturalis ossium
est commissio, quæ exiguum & obscurum aliquando, aliquâ
do nullum motum præferunt, 2. de artic. 8. & 1. de artic. 1.

Declinatio est illa paroxysmi pars, quæ statum ipsum
subsequitur, usque ad secundæ accessionis principium. 1. cri.
3. vide Principium.

Decrescens febris, vide Continua.

Decretorius, siue Iudicatorius dies est, in quem pluri-
mum iudicij tempus incidit, 1. de diebus decret. cap. 3. Est
adhuc alius dies Iudicatorius incidens, in quo imperfe-
ctæ solent fieri iudicationes, ut tertia, quinta, sexta, no-
na, 3. progn. 1. Decretoria autem signa sunt, quæ salutem
ægri, per crisin futuram ostendunt, 1. cris. cap. 7. Inci-
den-

den.

dentes verò, siue Intercidentes dies differunt à Indicatorijs, & decretorijs, cum eorum natura, tum usu; Natura quidem, quod naturæ suæ ratione Indicatorij perfecti sunt, omnibus si quidem ritè factis sola natura sponte agente, in ijs crises fiant, hi autem dies sunt, qui quaternario, & septenario diuiduntur; Intercidentes autem minus perfecti sunt, & in eos, non nisi aliquo errore interueniente, crises incidunt, unde non vi naturæ, sed morbi malitia, aut aliquo extraneo impellente, in ijs crisis accidunt. Atque hinc est ut a nonnullis, dies prouocatoriij nominentur, quod in his natura ad pugnam irritata, insurgat, & su ad huc differunt, quod ad futuri vigoris & indicij cognitionem, quaternariorum circuitus sufficiunt, ad crisin verò iam factam discernendam, num scilicet fida, aut infida sit, intercidentium cognitio, conducit.

Deficiens pulsus est qui admonenti digitos, videtur exsolutus, & tenenti applicatos paulatim prorsus desinit, 2. de caus. puls. c. 3.

Deficiens decoratus *Μωρπιζων οφρυμυδς*, pulsus est, qui & mutilus, & decrescens pulsus dicitur, qui perpetuo diminuitur, nec minui desistit, ad quietem denique prorsus recidit, motuque deficit; qui pulsus si iterum redit, & de integro augetur, decurtatus reciprocus dicitur, 1. de differ. puls. cap. 11. quod si in eo nulla seruetur aequalitas, motuque ipso frequenter deficit, deficiens inæqualis appellatur, 2. de caus. puls. c. 12 nomen autem Græci à figuris, quæ in acutum desinunt, & a Cauda translulerunt, huiusmodi autem pulsum inæqualitas, systematica, idest collectiua dicitur.

Deglutitio, *κατάποσις*, est cibi, potionisque ab ore in ventriculum descensus, larynge simul sublata, sursumq; in tantum currente, quantum gula deorsum trahitur.

De.

Deiectiones, & subduktiones solet Hippoc. vocare, excrementa per alium exeuntia, 7. apho. 64. syncera autem deiectio est, quæ unum tantum humorem, cæteris impermixtum habet, 2. prorrh. 5.

Deleterium, quod & Phtharticum, & Phthoropæum dicitur, lethale venenum est, quod ubi in animalis corpus impressum fuerit, totum id momento temporis immutat, sibi que simili affectione alterat, 1. de sem. cap. 16. quod si etiam alexipharmacum medicamentum ultra modum exhibitum nos interficiat, vel parum assumptum sanet, non ob id deleterium censendum est, quod quocumque tempore, loco, & quantitate sumptum, aptum est interficere, com. 6. in 6. de morb. vulg. 5.

Delirium, desipientia, παραφρέσις, mentis alienatio, duobus modis dicitur, generaliter & speciatim; generaliter est motus errans, & deprauatus facultatis imaginatricis, aut ratiocinatricis, plerumque in utraque facultate consistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando, aliquando verò in altera tantum facultate, ut exemplo illustrat Gal. libr. de sympt. diff. cap. 3. atque hæc tum maxime sine febre est, 1. prorrh. 1. & 4. insanire omnes dicunt eos, qui citra febrem desipiunt; & subdit omnes, qui mente læsi continuè fuerint, Phrenitici vocantur, sola febre ab ijs, qui deliri apellantur, discrepantes. Speciatim verò significat mentis alienationem cum febre, à phrenitide differens quod hæc fiat Cerebro primario affectu laborante, cum symptomatum magnitudine & vehementia, Delirium autem eiusdè febris symptoma est, atque ex subiectis cerebro partib. originem ducit, sublato in capit acri, & feruenti biliosi sanguinis vapore, neque impetus tantos habet, quātos Phrenitis, 5. de loc. aff. 4. vide Phrenitis, & Paraphrosyne.

Del-

Delloides, quasi *deltæ* literæ figuram imitans, musculus est, qui superiorem humeri partem, qua brachij caput est, tegit, qui etiam totius manus initium est, 3. de anat. adm. cap. 3. Græce Δελτοειδής sic dicitur, quod triangularis videatur, ut in Δ similitudinem efformatus.

Deneruationes (α'πνεύρωσις Græci vocant) sunt nervæ musculorum tenuitates, in quas musculi desinunt, & Tendones dicuntur, 1. de motu musc. cap. 1. & 1. de anat. adm. cap. 3. vide Tendones.

Dentem, sepe Hipp. secundam colli vertebra[m] vocat, propterea hunc processum à dentis similitudine, *odon* eodem, id est, dentiformem appellat, lib. de off. ca. 8. Alij *Pyrrinoidem* productionem à nuclei similitudine nominant, 12. de usu par. cap. 7.

Dentes in ossium numero reponuntur, mollium Cerebri nervorum participes, ob idque soli sentiendi vim habent evidentem, lib. de off. cap. 5. priores quaterni, quia secant, *Tomi*, id est, Incisorij ad cultri similitudinem ad eos cibos incidendos, qui mollitiem in se habent; utrinque *Carnini* adiacent, quod Canum dentibus sint quàm simillimi, ad dura cibaria non secanda, sed admodum confringenda. Ultra hos, *mamillares*, & *molares* ab utroque latere, quod ijs cibi (veluti molis cereales, frugei) tenuantur, & attruntur, ibidem.

Dentes genuini, qui omnium novissimi nascuntur *Ξωππερισσῆς*, ut plurimum ab anno duodevigesimo, usque ad annum vigesimum sextum, visi aliquando sunt etiam anno octogesimo nasci, utrobique singulares, penitissima oris parte oriuntur, ideoq. ita nominantur, quod nascantur, cum homo sapere incipit; sunt autem è genere dentium *molarium*.

Dentifricium medicamentum est, quo utimus ad dentes

tes confricandos. & gingivarum circūsitaram contactum, quando humore fuerint pręgnantes, 5. de loc. aff.

Dentitio, *δοντιασμος*, est dentis iam concreti, extra gingiuam eruptio, seu dentium ortus, 8. de placit. c. 6.

Depascens vlcus, idem est ac Phagedęna, vide Herpes, phagedęna.

Deperditio, vide Aborsus.

Deprehensiones, vide Catalepsis.

Depressum, & oblongum est ossis caput, ad cernicem in ipsum cui adnascitur, referentes, lib. de ossib. in proæmio.

Deriuationem appellare consuevit Hipp. quando succus aliquis euacuatione indiget, neque per convenientem regionem ferri inceperit, neque tamen valde procul à conuenienti, neque ad remotissimum locum, ut si per lotij vias exire ceperit, vitiata vesica, aut renibus; tunc enim per aluum deriuare satius fuerit; veluti si per vētrem vitiatis intestinis ferri tentauerit; Contra enim in istis succum euacuandum ad vrinarios meatus dirigemus; In mulieribus verò nonnunquam ad vterum, aut è contrario, interdum vteri profluum, ad vrinę vias, ac ventrem deriuabimus. At si in aliqua id genus euacuatione uomitum citauerimus, reuulsionem hanc nominant, ut si vomitus etiam retraxerimus, ad vterum, aut vesicam, aut sedem incitantes, com. 2. in 6. de morb. vulg. 7. Deriuatio Gręcis *παροχέτευσις* eiusdem est generis, cum euacuatione facta per particulam, quę fluxionem suscipit; fit autem per aliquam vicinarum partium; Riutare igitur est per riuos ducere, deriuare autē est, à riuus ad latera diuertere. Ex Oribas. lib. de Cucurbitulis, vide Purgatio.

Derma, vide Cutis suprema.

Desipientia est, cum egris loquentibus, & agentibus, nihil rationi consentaneum dicunt, 7. aph. 14.

G

Desipien-

Diachylon Διαχυλῶν, emplastrum, quod ex succis est cōpositum. 7. de comp. med. per gen. cap. 9.

Diacodion, confectio est, ex capitibus papaveris, 7. de comp. med. loc. 2.

Diadosis Διαδόσις, digestio, seu distributio alimenti est, cum per venas maiores in minimas, ipsumq; corporis habitum transit, vide *Anadosis*.

Diata, victus ratio, est certa victus institutio, & norma, non in solo cibo, & potione consistens, verum in omnibus alijs, otio, exercitatione, Venere, somno, vigilijs, repletione, inanitione, animi affectibus, atq. alijs cibus, qua quovis modo sunt in humano corpore, ad *Thrasibul*, cap. 35. Inde disciplina quæ hanc instituit diatatica διατητική, dicta est, pars artis medicæ curatiua, tum quæ sanis ad imminentes arcendos morbos, tum quæ agris ad præsentis profligandos debetur, 11. meth. c. 15.

Diagnostica signa sunt præsentium rerum, & morborum declaratiua, li. de opt. sec. emp. c. 5. vide *Prognosticæ*.

Dialemma, est illud interuallum, quo febris ad infestationem venit, antequam sequens annotatio adueniat, lib. de morb. temp. cap. 3.

Diapedesis Διαπιδέσις, est exiguorum vasorum apertio, vel feri non sanguinis excernendi species, 3. de caus. sympt. cap. 2. fit autem ex tunica rarefacta, sanguine verò tenuato, & ex gracilium vasorum ore ad aperto, unde transcolatur sanguis siue sudoris, aut roris more transmittitur 5. meth. c. 2. differt ab *anastomosi*, in qua tum maiorum venarum, arteriarumq; ora aperiuntur, tum sanguis impetu, & copia erumpit.

Diaphanes Græce, Latine dicitur *Lapis specularis*, ex his est, quæ leniter, ac sine morsu exiccant, quæ vltus ulceribus egre cicatricem admittentibus, non item malignis, ac

rebellibus, conducit, 4. de comp. med. per gen. cap. 1.

Diaphoresis Διαφύρσις, Latine digestionem, seu euaporationem dixeris, est quæ humorem qui in phlegmone obfessa parte continetur, per meatus insensibiles educit, 13. metho. capite 16. & medicamenta, quæ id præstant, Διαφύρτικα, hoc est discussoria, & per balitum digerentia, appellantur, duplici ratione, aut humores ebibentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem, 5. de simplic. med. fac. c. 5.

Diaphrattontes membranae, διαφράττοντες ὀμέρας dicuntur membranae illæ, quæ totum thoracis spacium, à iugulo ad septum usque in duos sinus, dextrum, sinistrumque diuidunt; vulgo mediastinum, vocatur; vide Hypezochotes, Cingentes.

Diaphragma, septum transversum est, quod & Phrenas id est mentem appellarunt antiqui (quia, ut aliqui putant,) eo inflammatione affecto mens ledatur, nam multi quidem varios ob morbos delirare solent, sed quæ eo affecto incidunt deliria, non multum distant à Phrenitide; nulla enim pars Cerebro subdita præter septum transversum, perpetuum delirium excitat, itaque maximus illi videtur esse cum mente consensus. A Platone Diaphragma vocari capit, id est septum transversum, est enim musculus rotundus, obliquus, membranofus, & carnosus, medius inter partes alimento seruientes, quas Peritonæum continet, & inter spiritus organa, quæ tunica succingente concluduntur, eamque ob rem diaphragma nominatur, quod eas partes διαφράττει, id est, diuidat quasi septum quoddam medium, quæ ratione Aristoteles illud succincturam appellat, 5. de loc. aff. 4. maiores nostri præcordia nominarunt, Com. 1. in 1. progn. 24.

Dysphthora est corruptio ciborum in ventriculo, 2. de loc. affect. 1.

Diá-

Diapyemata, vide Empyemata.

Diaria febris ἐφημερος πυρετός, *Ephemera febris* est, quæ unica accessione, unoq; plurimum die, ex ipsius saltem natura circumscribitur, à causa manifesta orta, 9. meth. 1. in spiritibus accensa, quam excitant causæ, alijs febribus communes (præter spirationem, & putredinem) ira, dolor, vigilia, cura, æstius sol, fatigatio, Bubo, pertinax studium, cruditas.

Diarrhœa, διαρροία, id est profluuium, copiosior est alui fluor, sine phlegmone, & ulceratione aliqua, lib. finit; quo vel pituita, vel bilis altera syncera, aut inuicem mixta vacuatur, ab humoris copia, vel cruditate, quæ aut in toto corpore, aut in certa quadam parte sedem habet, exorsum; Venter enim multitudine grauatus, quam vel ipse colligit, vel ex alijs sese in eum exonerantibus suscipit, aut præna aliqua qualitate irritatus, quam cruditas (quæ propriè δυσπεψία dicitur,) inuexit, τὴν διαρροίαν infestatur, præsertim si eius orificium, superneq; partes ualentes sint, inferne autem languide: nam si contra acciderit, uomitiones pro diarrhœa succedent, ut docet Gal. 3. de natur. facul.

Diarrhœa in Vrina, vide Diabetes, & Canina cupiditas.

Diartrosis, vide Articulus.

Diaspermaton medicamentum, id est ex seminib. cōstās, 7. de comp. med. per gen. 7.

Diaspoleticum medicamentum est, cuius compositionē, cuminum, piper, ruta ingrediuntur, 4. de sanit. tuen. c. 5.

Diastole est motus dilatationis, & eleuationis arterię, ad substantiam quandam exterius attrahendam, quo natiuus totius animalis calor, per immissum spiritum refrigeretur, quemadmodum Systole est arterię submissio, & contractio, ut id, quod ex humorum densione in toto animali,

contractum, veluti fumida superfluitas est, expellatur, lib. de usu pulsuum, cap. 3. ut eundem usum præstet Diastole, & Systole, totius animalis calori, quem inspiratio, & expirationis, particulatim calori Cordis, ibidem.

Diatefferon, emplastrum, quod ex quattuor rebus constat, Chalcitide, misy, diphyrge, (balcanto; 5. de compos. med. per gen. cap. 14. *Διατίσσορον* Græce.

Diatrion, pipereon, id est, medicamentum, triplici piperris genere constans, 4. de sanit. tuen. cap. 5.

Diatriton id est tridui inedia, ut Diatritarij, qui triduanam inediam præcipiunt, 4. meth. cap. 4. cuius primus autor Thebæus, *Διατρίτων* Græcis.

Dichophya, pilorum defectus est, quando bifurcantur, lib. finit.

Dichroma, (*Δίχρωμον* Græce) emplastra sunt, quæ & Gilug dicuntur, coloris ambigui, 2. de compos. medic. per gen. cap. 1. sunt enim quadam medicamenta, quæ fulua vocant, quibus ubi statim reponuntur, quadam extrinsecus supereminencia fusca concrefcit, sub qua pars medicamēti profundior, plusquam ab initio fulua videtur, propterea dichroma vocant, id est bicolora; quidam verò eadem vocant, *Διπρόσωπα* *διπρόσωπα*, id est bifacia, 2. ad Glauc. 8.

Dicrotus pulsus, *Δικροτός σφυγμός*, seu bis feriens, est cum recessio, quæ creditur arteriæ, non perfecta obitur, sed cunctatur, idq; pro subductionis, aut inhibiti spiritus quantitate, deinde repetitio perfecta, debite fit contractionis, lib. finit. Estq; unus pulsus, non duo (contra Archigenem) qui simul atque omnem distentionem effecit, se paulisper subducit, ac mox pulsat iterum, ut intermittentium quies media ictus intercipiat, cuius dicroti contractio, congressus, vel reditus dicitur, 1. de differ. puls. ca. 17. qui post absolutam diastolen, antequam perfecte contrahatur, secundò tactum

tactum ferit, ut ex malleis incudem percutientibus, & postea resilientibus, apparet.

Didymus, id est testes ipsi, 14. de usu part. capit. 14. Διδύμοι, dicuntur propriè fratres una partu editi, dicuntur & testes, honestiore vocabulo, ut ait Galenus; dicuntur & διδύμοι in Cerebro, de quibus vide Glutia.

Dies in hoc significatu apud Mediceos accipitur, ut non solum lucem, sed etiam noctem complectatur; non id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur, appellantes diem, sed etiam illi tempora noctis adiecentia, 2. de cris. cap. 2.

Difficultas intestinorum, quæ & Διγερτεσία dicitur, 2. de facult. nat. capit. 9 propriè ulcus intestinorum est, ex mordacibile, quam sequitur interaneorum abrasio, cū quibus paulum cruoris secernitur, 6. de loc. aff. cap. 2. in quibus difficultatibus intestinorum, cum adhuc constituuntur, quædam corpora pingua excernuntur; post hæc autem nisi finiri anticipauerint, quædam ramenta intestinorum, ablata ipsarum superficie interiore, quæ membranosa existit, & densa, illi quæ cutem exterius contegit, Epidermidi, id est cuticulæ appellatæ, proportionalis; post hæc autem aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum, sed iam cōpletam dicimus; excernuntur enim partes magnæ intestinorum, quas & carnes, & carunculas vocare possumus. 4. aph. 26 Talis quippe propriè dicta Dysenteria est, nomen habens à læsa particula, quam solam plerique dysenteriam nominandam censent: & si Hipp. atque alij, non ipsam modo intestinorum exulcerationem, verū omnem cruoris per intestina vacationem, Dysenteriam nominent, nomen morbi, symptomati tribuentes, 4. de art. 40.

Difficultas urinae, vide Ischuria.

Difflatio, & difflatus. Quicunque in Hipp. placitis Le-

gitime versatus fuerit, is demum didicit eius, quam medici omnes usitato vocabulo, sensum latentem transpirationem appellant, qua difflantur corpora, aliam quidem talē esse qualis vapor est, alias autem qualis aer siccus, atque aliud esse, cum qua videri possunt, exeunt humiditates. Adversus Lycum, c. 2. quę Gręcis Δύω θεωρητὴ διαπνοή, & εἰς διπλὴν αἰσθησεί διαπνοή, hoc est perspiratio, & diffusus, qui ratione comprehendatur, & transpiratio sensu imperceptibilis appellatur, quę calidioribus temporibus, regionibus, statibus, naturis, diatīs, multa est, non parva substantię nostrę portione per διαπνοήν, exhalante, ut contra in frigidioribus pauca, propter cutis adstrictionem; vide inspiratio.

Digiti, Δακτύλοι, quinque sunt in omni manu, primus Pollex, quod oppositus ceteris quatuor digitis equipolleat, ἀντιχείρ, hoc est pro manum, tamquā pro tota manu esset, vocant; Hippoc. μέγαν hoc est magnum nominat, quamvis parvus sit, quia ceteri sine eo fere inutiles sunt, apud Arist. 4. de part. animal. capit. 10. Magnus Galeno dicitur, non solum viribus, sed & magnitudine, nam principium pollicis ut ait, propē radium est, adeo ut eum fere attingat. Celso, & Aristoteli, viribus tantum magnus dicitur; secundus δακτύλος, index, tertius μέσος, medius, quartus παραμέσος, annularis, medicus à Medicis appellatur, quintus μικρός, minimus, auricularis, omnibus alijs corpore, & viribus inferior; Singuli terna ossa continent (pręter pollicem) mutuò sibi colligata, & ordine sibi succedentia, veluti in acie, unde & φαλάγγες à Gręcis appellantur, ab alijs autem Σκυλάδες, à turma equitum, quam Gręci Σκυτάλην, vocant, Latini communi vocabulo, digitorum internodia dicere solent.

Dignotio est presentis morbi, præcognitio verò est futuri

turi morbi cognitio, 3. de cris. c. 1. dignotionem autem proprio nomine dinotationem appellamus, 1. progn. 5.

Dimotio, vide Frolapsiones.

Dipsacos, vide Diabete.

Diprosopa, vide Dichroma.

Discissiones, magna vulnera solet Hippocrates appellare, quæ lathalia sunt, ut vulnus in cerebro, cum ad aliquom eius ventriculum peruenerit, 6. aph. 18.

Discretiua, Medicina pars est ea, quam significatiuam recentiores vocant, Græci σημωτικὴν, 1. de his quæ in medicar. 1.

Dispersus morbus, vide Communit.

Diffimilare membrum, heterogeneousum, seu compositum est, cuius quamcumque partem assumpseris animalis, toti communicans non erit nomine, uel definitione, sicut manus & facies, lib. anatom. iiii. uide Instrumentale.

Dissidentias uocat Hippoc. cum ossa, quæ natura coherent ac sese mutuò contingunt absque articulo, ob aliquam lesionem dissident à se, ac distant, ut Cubitus, & Radius in brachio ad gibbum, & ad manū; In Crure Tibiam, & Suram, quæ, & Genu, & Calci committuntur, com. 3. in medicat. 31.

Dissolutiones uocant, animi defectus, Græci δυποθομίαι, uocant, 1. ad Glauc. 14.

Distentio, idem est, ac nervorum conuulsio, quæ est triplex, opisthotonos, id est tensio ad posteriora, Emprosthotonos, id est tensio ad anteriora, & Tetanos, i. aequalis tensio, 4. aph. 57. qui Tetanus est per uniuersum corpus nervorum conuulsio, 3. de loc. aff. 10.

Distorsiones sunt, cum uel à suâ sede dilabitur aliquid in exteriorem corporis partem, uel introrsum in inanitatem aliquam prolabitur, ut in naribus, si in exteriorem

riorem

riorem partem, aut os, aut pinnula earum abijt in eam partem, si in foramen descendit, introrsum distorsio fit. 2. de ijs quæ in medic. 33.

Diuretica pharmaca Διουρητικά φάρμακα, medicamenta sunt, quæ ad ciendas urinas accomodantur, quæ & Uretica dicuntur, 11. meth. 16 & 5. simpl. 20. quædum sunt generū, aliqua enim mediocriter id præstant, ut Eccathartica, i. poros expurgantia dicantur, calida & tenuium partium; alia vehementius, ut quæ plurimum movent urinam, quæ magis, & siccant, & exalid faciunt, prioribus.

Diurnus morbus est, quicumque acutorum ex decidentia, terminum prætergreditur, quem nunc quadragesimum, nunc sexagesimum diem Hipp. facit. 2. de dieb. dec. cap. 12.

Dodecadactylon, siue Duodenum intestinum δωδεκάδακτυλον, primum est intestinum fundo stomachi alligatum, à longitudine duodecim d. gitorum sic appellatum, 6. de anat. adm. cap. 9. quod quidam non dignantur vocare intestinum, priusquam in anfractus, orbeshq. conuoluantur, sed ipsum ἐκφυσι, i. productionem simpliciter, vel cum appendice productionem duodecim digitorum, ἐκφυσιν δωδεκάδακτυλον nominant, primumq. intestinum in ordine dicant esse ieiunum, ibidem, cap. 12. hoc idem Duodenum, vocant Portinarium, lib. de anat. viii. In id meatus inseritur, à vesica bilem continente, per quem ea in ipsum expurgatur.

Dolor ἰδῶν, tristis sensus est, ut voluptas blandus, 2. de loc. aff. 2. qui si per inflammationes fiat affectus, atque in corporibus sensibilibus, vel per se, proprio, & primario affectu, in arterijs, vel reliquis partibus sensibilibus omnib. per consensum, eò quod à vicinarum contactu premantur, pulsatorius, siue pulsatiuus ἰσχυμώδης ἢ σφυματώδης, dicitur,

titur, 2. de loc. aff. 3. si verò in aliquo viscerum, circumambiens membrana, per quam nervus dispergitur, à tumore præter naturam extendatur, ita ut gravitas quadam sentiatur, dicetur sensus, siue dolor gravis *Caput*, aut gravitatis, ibid. c. 4. quæ partes si inflammatæ sunt, unico doloris modo vexantur, tensuo *τονώδης*, siue extensionis. Qui verò in membranis sit, ipsius affectus veluti radice, eo loco fixa, ubi membrana pungitur, qualis est in morbo laterali, dolor punctorius *συχνατώδης* dicetur, ibid. c. 5. si nervis ipsis primò accidat dicetur dolor *γλυκὺς*, stupidus, 2. de loc. aff. cap. 2. Quod si in laterib. spiritus quidam flatuosus procreatur, qui tum extenuatus, tum discussus dolorem sedat, deinde rursus procreatus alter, dolorē augeat, dolor *αἰαίς*, rarus dicetur, co. 1. in 1. prorrh. 22. Dolores autem ulcerosos, tum Medici, tum Gymnastæ vocant, eos per quos, inter movendum, vel tangendum lassatas partes sensus veluti ulceratarum partium *ὀσῶς πόνος*, percipi solet, 2. de loc. aff.

Dorsum, quod Græci *Νῶτον καὶ Ἀντισέριον*, & *Μεταστέριον*, appellant, est omnium vertebrarum quos spondylos vocant structura; Nonnulli tamen ex recentioribus medicis, non totam vertebrarum structuram, spinam appellandam censent, sed circa thoracem tantum, & lumbos, non circa collum, 3. de art. 1. Aristoteles verò, 1. de histor. animal. Dorsum dicit esse totam posteriorem corporis partem, ab occipite usque ad extremum Coccygem, triginta quattuor vertebris (si modo ossis sacri partes, vertebris annumerentur) compactam; quod dorsum conficiunt, collum, thorax, lumbi, os sacrum, & Coccyx, in quo costæ velut in carina trabes, connectuntur, totumque corpus stabiliunt. Sed aliter Galenus lib. de ossib. c. 7. his verbis, spina est tota connexio, viginti & quattuor vertebrarum à Capite usque ad os sacrum, ita ut septem primæ à Capite vertebra Collum, si-

ne(cervicem constituent; duodecim quę sequuntur, Dorsum, cui a parte anteriori respondet pectus, quinque reliqui lumbos, os in quod omnes vertebrae finiuntur, sacrum, vel latum dicitur, siue etiam os magnum, 12. de usu part. c. 12. vide Spina.

Dothien, Δοθίλιν, id est, Furunculus, 2. meth. 2. vide Furunculus.

Dracunculus, Δρακοντίον, est vlcus, quod à parte propinqua, ad ipsum nervi dilatationem habet, dictus quod nervus mouendo corpore in vlcus recedat, in eoq. occultetur, lib. finit. vide quid scribat Aetius ex leonida, de dracunculo.

Dropax, Δρωταξ, est medicamenti forma quędam, interdum liquidioris in modum malagmatis, interdum siccioris, emplastri modo, prout usus exigit; cuius materia eadem est, quę Acopis, & emplastris debetur. Est autem dropax duplex, simplex alius, qui & πικρώσις, hoc est, pica-tio appellatur, sola pice arida, olco liquata constans; Compositus est, cui praterea adiunguntur alia ad diuersos usus: In hoc genere est illud medicamentum, quod Gręci Φιλώδρον, id est, depilatorium vocant, quod & Dropax dicitur.

Drymea medicamenta, id est, acria, quę nequitiam humorum extinguunt, lib. de dynam. in proæmio.

Dulcia ulcera, quę Graci ἰχθύωδον, id est Verrucosa ulcera sunt, quę callum contraxerunt, & prætumidas, ac duras oras habent, 4. de comp. med. per gen. c. 12.

Duodenum, vide Dodecadactylon.

Dura mater, vide Membrana dura.

Durum Σαυρόν, Medicis est, quod repletione largo, & superfluo humore, aut vapore in partem aliquam affluentem, tactui renisitur, nec cedit sponte (aliter ac Philosophis)

Et propterea quod ita durum est, proprie α'ντιτυπον, hoc est renitens appellatur.

Durus pulsus, vide Mollis.

Dyonisisci, sunt ossæ eminentia, quæ propè tempora nascuntur, dicuntur autem cornua, detorto à Cornigeris animalibus nomine.

Dyplasiaemus, id est, duplicatio, quæ est duorum musculorum, qui ab ipsa scapula excipiuntur, ad exteriora, posterioraq; membrum circumagunt, amboq; simul agentes, brachij circumductionem efficiunt, lib. de muscul. dissect. capit. 18.

Dyploes, secunda lamina Caluaria, 6. meth. 6.

Dyprosopa, vide Dichroma.

Dypsacos, vide Diabete.

Dysæsthesia, i. sensus difficultas, est vitium actionis sensitiuæ diminutæ, lib. de sym. dif. c. 2. δυσαισθησία, sic δυσμετρία, non modo difficultatem motionis sed etiam immobilitatem significat, de sympt. differ. cap. 2.

Dyscrasia, Intemperies. Est mixtio inæqualis quattuor primarum qualitatuum, ubi enim illæ ita coierint, ut earum pares sint vires et portiones, temperamentum emergit exquisitissimum, quod ceterorum omnium norma est; ab eo quodcumque desciscit, intemperies dicitur, tunc enim aliqua qualitas exsuperet, necesse est, vel duæ.

Dysenteria, vide Difficultas intestinorum.

Dysepulora, vide Cacoethe.

Dyspathia, hoc est ad patiendum difficultas, 1. de usu par. cap. 15.

Dyspepsia, vide Concoctio.

Dysphonia, i. vocis difficultas, ut Aphonia, eiusdem abolitio, de sympt. differ. cap. 3.

Dyspnæa, difficultas spirandi, vel inordinata spiratio, 2. meth. 2.

2. meth. 2. & 1. de diff. respir. cap. 1.

Dyslherapenta ulcera, id est curatu difficilia, 6. de cōp. med. per gen. cap. 1.

Dystichia, est alterius pilorum ordinis in genæ margine exortus, præter naturam. lib. finit.

Dysthymia, i. mæstitia melancholica, 6. de loc. aff. c. 1.

Dysuria, Δυσουρία, est uring difficilis, vel cum dolore excretio, siue utrumque symptoma, siue alterum tantum ad sit, *Dysuria* dicitur, 7. aph. 48. vide *Ischuria*.

Dytriachisis oculi morbus est, cum pilis naturalibus alij subnascentes, ipsum pungunt, fluoremq. concitant, lib. Introd. cap. 15.

E

E*CVOLIA*, Εμβολία, pharmaca, i. abortiva medicamēta quæ abortum faciunt, quæ & ἐμβόλια appellātur; eadem & fœtus demortuos extrahunt, vide *Aborsus*.

Eccarthartica quæ & *Ecphrastica*, vide *Rhyptica*.

Ecchymoma, quæ Græce Εχχύωμα ἢ Εχχύμωσις, id est, sugillatio,) est affectio circa cutem, cum tenuibus in ipsa venis contusis, sanguis per fissuras effunditur, nondum in grumos coactus, sed postquam per *Persultationem*, i. Diapedesim, effusio ipsa facta est, contingit sanè aliquando, ubi ita coierit temporis progressu liuescere, & denigrari, parvis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes, sanguine coactis, 2. de comp. med. loc. capit. 1. & 4. meth. 1. eandem vocat *Ecchymosis*, i. solutionem continuitatis cū contusione, & ruptione. Generatim verò Hipp. solitus est vocare *Ecchymoses*, ex vasculis effusiones, & inanitiones, & alio nomine ραυσιώτις, com. 2. in 6. de morb. vulg. 9. quæ effusio, in phlegmone quoque fit à causa interna, ubi
san-

sanguis è vasis effunditur, & tumor excitatur, tactu molliſ & cedens; diſtinguit tamen Gal. 6. aph. 20. phlegmonem ab Ecchymofi, quod in phlegmone ſanguis per muſculorum cauitates, ſola ratione contemplabiles ſecundum minimas ſui partes effunditur; In Ecchymofi verò in ſpacia effluit, quæ venis adiacent. Species Ecchymomatis ſunt, Hypopion, & Hypoſphagma ὑπόπιον καὶ ὑποσφάγμα, & ſanguinis ad ungues concurſus ex plaga, vide Unionis ſolutio.

Eccoppe, ἐκκοπή, exciſio. Diuiſio eſt Caluaria, qua os offenſum refractum eſt, lib. finit. inde Εκκοπρωτικά. medica-
menta imbecillia ſunt, quæ mouendi tantum ſtercoris, & ea quæ in ſpacijs inteſtinorum continentur, deijciendi vim habent, non etiam ex alto attrahendi, & humores euacuandi.

Eclegma, Græcis ἐκλεγμα ἢ ἐκλεκτὸν) medicamentum eſt per ſputum euacuans, quæ in faucium partibus, phlegmone obſeſſis, continentur, 4. de rat. viſt. 20. ori enim inditum, ſenſim liqueſcit, & deglutitur, ad peſtoris, & pulmonis vitia; quod & alio nomine vocatur Arteriacum, ἀρτηριακὸν, diciturq. ἀπὸ τοῦ λήγειν, id eſt à lingendo. Arabes vocant loch, Paulus verò, lib. 4. cap. 57. nomen tribuit medicamentiſ, quæ deuorantur ad lumbricos educendos, vide Arteriaca.

Ecphraxis, id eſt pororum apertio, & recluſio, 11. meth. c. 13. Inde ἐκφρακτικά. medicamenta vocantur, quæcunque obturatione liberant facultate nitroſa, & amara; oppoſita emplaſticis medicamentiſ, quorum eſt meatuſ obducere, & obturare, 4. de comp. med. loc. cap. 1. quæ dicuntur alio nomine Eccathartica, ἐκκαθαρτικά.

Ecphyſis, id eſt, exortuſ, ſeu proceſſuſ alicuiuſ offiſ, vel inteſtini, vel viſceriſ, 2. de anat. adm. capit. 5. ſed ſine adiectione prolatum Ecphyſis eſt illud ſpaciũ, quod eſt me-

medium inter intestinum ieiunum, & fundum uentriculi, carens circumuolutionem, lib. 1. de usu par. cap. 3. uide Dodecadactylon.

Ecpnysefis, efflatio, siue exsufflatio, est exspiratio cōsertim facta, 2. de motu musculi. Græcis ἐκρόσησις, ἢ ἀθρόα τοῦ πνεύματος ἐξωρπά; propria est vocis materia, neque vox citra eam fieri potest; differt à simplici exspiratione, tum violentia, tum musculis à quibus efficitur; 4. de usu pa. nam & paulatim exspiratio fit & à solo septo transuerso, 4. de loc. aff.

Eclipseis est subitus, & vehemens timor, ἐκπληξις, cuius oppositum Pericharia dicitur, περιχαρείαν, Græci vocant, quasi excessum gaudiij dixeris; Scimus autem amborum occasione, plures subito perijisse 12. meth. c. 5.

Ecpiesma, ἐκπίεσμα, caluarię in multas partes diffraetio, & simul ubi intrusę ossis partes, in imū decubuerint, ac membranam innixō suo premant, lib. finit. in qua profundius fracta ossicula descendunt, & membranam Cerebri comprimunt. Vnde Ecpiesmus ἐκπιεσμός, est totius oculi prolapsus extra suam cauitatem, ut prominens permaneat. Differt à Proptosi, ἀπὸ τοῦ προτώσεως, hoc est à procidentia. quod in hac Vnea tantum tunica, in illa totus oculus foras erumpat, præsertim ijs qui strangulantur, Athleticis, & fæminis quę præ dolore partus vehementius distenduntur, aut fluxionibus à capite in oculos tentantur.

Ecpyema, ἐκπνύμα, dicitur ab Hippocr. vniuersi puris collectio tumore aliquo qui præter naturam est, concocto, & ἐκπύωνσθαι ad suppurationem perducere.

Ecrhythmus pulsus est, qui nullus ætatis rhythmum seruat, 1. de diff. puls. cap. 9.

Eclasiā melānsolicā, mentis motionē, aberrationemq. intel-

intelligimus vehementem, & ferinam, quæ irrigante Cerebrum aßata flaua bile oritur, Co. 1. in 1. prorrhet. 14.

Ecthlima, est exulceratio, quæ in summa cute ex compressu nascitur, 2. de fract. Græce item ἐκθλιμμα.

Ecthymata, ἐκθύματα papulæ sunt per summam cutem erumpentes, ab humoribus superfluis, & tenuibus, ideo in cute leniter extuberant, quod tenues humores exulcerationem potius, quam tumorem procreant. Dicuntur & alio nomine Græce ἐξανθήματα, neque enim harum vocum discrimen ullum comperi; eius generis sunt, tum quæ, per febres ardentes exeunt, tum Variolæ vulgo dictæ, & Morbilli.

Ectosis, ἐκτῶσις, luxatio, hoc est ossium à propria sede amotio, & diuulsio, citra fractionem; nec verò id modo significat, sed etiam ἐξάρθρωσις, siue ἐξάρθρωμα, apud Hipp. ut notat Gal. in initio libri de Articulis, cuius luxationis causa alia est externa, id est, vis omnis quæ articulum loco dimouere potest, alia interna: estq. humoris defluxio articulum præcopia, vel mollitie loco propellentis.

Ectropion est suppullatio carnis in genâ, quæ genam ipsam sua gratuitate foras conuertit, causa est genâ euertere, vel caro adnascens, vel resolutio, vel cum cicatrix inducitur, lib. finit. Sed alibi Ectropion id est diuersio, palpebrarum est vitium, cum exulceratis oculis, plus extra feruntur, lib. Introd. c. 15. Est autem affectus solius inferioris palpebræ oculum contegentis, ita inuersa, & retracta deorsum, ut parum sursum attollatur, sed pendeat, & hiet, neque ex toto oculum integat; Quod vitium si palpebræ superiori acciderit λαγώφθαλμον dicitur sed tamen lagophthalmos non naturaliter contingere potest, Ectropion verò non nisi à causa præter naturam, & cicatrice, carnis excrescentia, relaxatione, medicamento, sutura, vel vñtione inartificiosa, vel senectute.

Ekstrosmos, apud *Arist.* 7. de hist. animal. sunt imperfectorum fœtuum corruptiones infra diem quadragesimum factæ, quæ vero intra septimum diem fiunt, non ἐκτροσμοὺς, seu abortiones, sed ἐκρύσεις, idest effluxiones vocat.

Eczemata, sunt pustulæ ardentes, & feruida, dolorem cientes, citra saniem; ingens enim feruor, omnem materiam absomit, Græcis ἐκζέματα.

Efflationes, sunt magnæ, & vehementes spiritus expulsionones, quæ per eadem instrumenta fiunt, per quæ tussis, & tussiendo efficiuntur, quæ & efflatus dicuntur, ab expiratione, quæ sine strepitu fit, copia & velocitate motus differentes, 2. de motu muscul. cap. 8. & 2. de sympt. caus. cap. 4. vide *Ecphysefis*.

Efflorationes sunt ulcerationes factæ in superficie subrubra, & aspera, de medic. fac. par. capit. 5. quas si noctu enascantur, *Epinyctidas* vocant, lib. de tumor. cap. 15. & 2. meth. 2. quas *Celsus* vocat pustulas pessimas colore subliuidas, & subnigras albas, suo humori similes, magnitudine fabam non superantes, cum vehementi inflammatione, & dolore, à quibus ad apertis sanies effluit, & exulceratio mucosa intus retenta: *Paulus*, & *Aetius* dicunt esse ulcuscula sponte nascentia phlyctænis similia subrubra, ex quibus cruenta sanies effluit; utrumque verum est, & pustulas & ulcuscula esse.

Effulgescentiæ quas Græci ἐπιλάμψεις vocant, tum præsertim *Hipp.* significant morbum puerorum propriū, id est *Epilepsiam*, com. 1. in 6. de morb. vulg. 5. & si alij de hoc significatu contendant.

Effusio, vide *Contusio*.

Effusa & *Nigrores* fiunt, sanguine à venis effuso, nunc per tunicas contusas, nunc verò in sinibus reſeratas, lib. de tumor. cap. 10.

Elcos,

Elcos, Latine *Ulcus*, solutio continuitatis est in omnibus corporis partibus. (præterquam in solo osse) ab interna causa, humore scilicet uitioso acri, & erodente, particula cui incumbit, continuitatem, siue ea caro sit, siue cutis, siue cartilago, siue membrana soluens. Id autem uitij ubi in os incidit, *τρεψιδν* appellatur in alijs partib. *έλκος*. Aliquādo uerò Hipp. *ulceris* nomine ad omnem morbum dolorificum extendit, continui solutionem eo nomine significans.

Elementa, *στοιχία* Græcis, apud medicos sunt calidum, frigidum, humidum, siccū, ex quibus homo primis partibus, & simplicibus, minimisq. est constitutus, & in quæ ultima apparentia, & simplicissima, ac minima, resolutionem capiti lib. finit. Adhuc elementum appellatur minima pars eius rei, cuius est elementum; omnium enim corporum quæ gignuntur, & corrumpuntur, quatuor sunt elementa, ignis, aer, aqua, terra, ut minimum intelligatur, id quod minime diuisionem suscipere potest, 8. de placit. c. 2.

Elephas (qui, & *Elephantiasis* dicitur) morbus est in quo naturalis faciei figura mutatur, resimatur nasus labra crassa fiunt, extenuantur aures, ad *Satyrorum* effigiem, lib. de caus. morb. cap. 7. ex sanguine melancholico primam generationem habēs, quam affectionem cum incipit, *Satyrismum* nominant, quoniam vultu *Satyris* similes fiunt. aliqui uerò osseas eminentias quæ in temporibus fiunt, sic uocant; In alijs autem partibus quoque fiunt tales ossium eminentiæ, quas *exostoses* uocant, lib. de tumor. c. 14. *ἐλεφας καὶ ἐλεφαντίσις*, uniuersi corporis cancer est. Id neminis natum est hoc malum, quod in eo cutis corio *Elephanti* persimilis uideatur; nam maculis quibusdam ad atrum colorem uergentibus inficitur, atque inæqualiter aspera, crassa, ac ueluti squamis sæda, liuens, ferinaq. redditur; Nec *Elephas* quidquam (apud aliquos) a *lepra Arabum* differt.

Elminthes, ἐλμινθες, lumbrici, animalia sunt in humano corpore genita siue in intestinis, siue in auribus, siue in vesica, siue in vetriculo, interdum etiam in sordidis vlceribus. quos *Græci* σκώληκες vocant; sunt autem trium generum, primi generis sunt teretes, seu rotundi à figura, quæ est secundum crassitudinem, longitudine aliquando palmares, sæpe longiores, quos vocant ἐλμινθας στρογγύλας, in gracilibus plerumque intestinis consistunt, & superiorem ventriculum subeunt, ideoq. sæpe per os eijciuntur. quibusdam è naribus redduntur. & plurima parte cum febricula, atque hoc genus pueris infantibus & puberibus peculiare est. Alterius generis sunt qui lati vocantur, ἐλμινθα πλατείαν, aliquando κείριες, hoc est institas à similitudine quam cum institis obtinent, instar enim harum lati sunt, & longi, aliquando ταινίαι, id est fascias vocant, quod fasciarum effigiem sua latitudine, & longitudine, referant. *Plinius* lib. 11. cap. 33. tradit tricenum pedum taniar ventris aliquando visas, interdum plurium. Tertiij generis lumbrici sunt, qui *Ascarides* nuncupantur, breues ac tenues. paruis vermibus similes, qui in extremo intestino reperiuntur, qui glomeratim in multas phalanges, per sedem deijciuntur.

Elythroide mēbrana. quæ & *Erythroide* ἐρυθροειδής dicitur, testium est tunica, vaginalis dicta, 2. de sem. cap. 5. quæ tunica, & scroto feminarum testes carent, lib. de vuln. ad. cap. 9.

Embroche, *Græcis* ἐμβροχή ἢ ἐμβρέγμα, medicamēti genus est, cum locis affectis, liquore aliquo humectatis, perfusisq. lanam deinceps aut linteum, eodem liquore imbutum perfundimus, imbecillus cataplasmate.

Embryon, est animal utero gestatum, sexto de usu partium, capite decimotertio, licet non antea *Embryon* dici debeat.

debeat, quam duos menses in utero absoluerit, vide (γῆμα.

Emmota, ἐμμοτα, medicamenta, id est linamenta sunt, vel humida consistentia, simili: ijs, quæ linamentis vel linæolis excipiuntur, cerati specie, 13 meth 5. Emmotos vero vocat Hippoc. eos, qui ulcus canum, & exasum contraxerunt, & suppurarunt, quod curationem per linamenta desideraret, 3. art. 55.

Emollientia, uide Chalaistica.

Emphraxis, ἐμφράξις, obstructio, est meatuum, aut cavitatum naturalium stipatio, & copia, vel uisiosa qualitate, ut lentore, & crassitie succorum proveniens cuius species Gal. 12. meth ponit ἐγγνωσιν, & πύκνωσιν Unde medicamentum quod suo lentore obstruit ἐμπλαστικόν, huic contrarium est medicamentum ἐκπρακτικόν, quod obstructione liberat 5. simpl. 12. uide Rhyptica.

Empirici sunt (Græce ἐμπειρικοί) qui à sola experientiarum notitia procedunt. nomine ab ἐμπειρία, hoc est experientia deducto, lib. de sect. cap. 1. unde Empirica medicorum secta, accidentium concursus qui agris accidunt, respicit, illorumq. curationem ab experientia observat, idq. nec morbo. nec causa cognita, in Introd. cap. 3.

Emphysema inflatio, quæ Græcis ἐμύσημα, ἐμπνευμάτωσις, καὶ πνευμάτωσις, est spiritus flatuosi collectio, in inanibus corporis partibus, vide fuse, infra Physis.

Emplastron siue emplastrum ἐμπλαστikon, pharmacum est, quod meatus obducit, ut picatio, quæ imponitur pilis in totum abrasis, 1 de comp. med. loc. c. 1. atque hoc pharmacorum emplastricorum genus, substantia terrestris est, citra refrigerationem, aut caliditatem manifestam, aut in primo ordine refrigerantium, vel calefacientium, 4. de comp. med. loc. capit. 1. suntq. sine mordicatione siccantia,

H 3 4. simpl.

4. simpl. cap. 5. & lib. 5. cap. 11.

Emplattomena medicamēta vocant, quæ exiguis totius corporis meatibus hærentia, prohibent ne quid per urinas, vel uniuersam cutim diffusetur, & effluat, 8. meth. cap. 2.

Emprosthotonos, vide dislentio.

Empyemata, quæ & *Dyapiemata*, ἐμπυεµάτα, suppuratitia omnia sunt; aliqui cum in viscere tale aliquid factum est, id solum empyema nomināt, & qui sic affecti empyus, alij eos solos empyus dicūt, quibus inter Thoracem, & Pulmonem, pus aggregatum est, lib. de tumor. cap. 3. ἐμπύους ἢ ἐμπύικος Græci vocant, suppuratos, & purulentos, qui multum puris in capedine inter thoracem, & pulmonem collectum habent, 4. de caus. puls. cap. 9. Tandem omnes quibus inflammatum viscus aliquod suppurauit, suppuratos vocant, ubi pus uniuersum constiterit, concocto tumore quoque præter naturam, Com. 1. in 1. progn. 40. & 2. progn. 59. & 60.

Empyreuma, reliquæ sunt caloris febrilis post solutam accessionem; intermittentium enim, & putridarum febrium proprium est, ut soluta accessione supersit non nihil caloris, vel in ipsis humoribus relictis, vel in solidis etiam partibus impressi, quem aliqui febris fomitem appellant; huic contraria est, ἀπύρεξια.

Emulgentes venæ & arteriæ quæ sint, hinc patet, vena caua ubi ex hepate primum emergit, vicinis partibus prætenues impertit furculos. Deinde ramum maximum in utrumque renem subiectum mittit; Similiter, alia duo vasa æquè magna à maxima agteria, quæ spinæ incumbit profecta, non aliter quam venæ in renes inseruntur, quæ venæ, & arteriæ vulgo emulgentes appellantur, per quas renes urinam à sanguine secernunt, & trahunt, simul etiam multibilis, ac propemodum omne id quod ipse cōtinuerint,

attra-

attrahunt, lib. de venar. dif. cap. 5.

Enarthrosis species est *Diarthroseos*, cum os cauum excipiens altum admodum est, caputq. quod in id inseritur, oblongum, lib. de ossib. in proæmio, vide *Artbrodia*.

Engemon, ἐνγάμων, est medicamentum quod glutinat, 6. meth. 2. imponiturq. maxime cruentis vulnerib. sistendo sanguini, 1. de com. med. per gen. cap. 14. atque ideo, & sanguinarium, & cruentis opitulans, & glutinatorium dicitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2. vide *Glutinatorium*, & *Sanguinarium*.

Enæorema, ἐναιόρημα, quod & *Appendiculum* quidam vocant, vide *Sublimamentum*.

Enchantis, ἐγκανθίς, id est inangularis, immoderatum est augmentum angulorum oculi, ut *Rheas* immoderata diminutio, de differ. morb. cap. 9. est enim quidam præter naturam tumor in magnis *Hircis* oculorum, quod tuberculum, non est omnino præter naturam, lib. de tumor. cap. 17. estq. ut plurimum in maiori angulo, quam carunculam quidam chirurgici rescindentes, effluxum excrementis, ea parte aperuerunt, quem affectum *Rhæada* quidam appellarunt, 10. de usu pa. c. 11. *Encanthis* propriè angulum oculi significat, maior autem angulus qui naso est proximus, proprio nomine *Rhanter* ῥαντήρ dicitur, minor qui est ad tempora παρωπιάς, Inde verò eius nomen, morbo inditum est.

Encathisma, ἐγκάθισμα est sessio in aqua medicata, ab imis pedibus, vel feminibus, usque ad umbilicum, ita ut superne partes non madescant, 5. de comp. med. per gen. c. 13.

Encephalos, ἐγκέφαλος & *Cerebrum*, vide *Cerebrum*.

Encharaxis, ἐνχαράξις, scarificatio, est cutis & subiectæ eius carnis per scalpellū sectio non punctim, sed cæsim facta, multis foraminib. differt à *Phebotomia*, q. hac uno vulnere venā adaperiat, illa multis sectionib. cutē, carnēq. diuidat.

Encheridæ. grumî sunt ceræ modo facti in emplastris, dñ
liquida illis infunduntur, 4. de com. med. per gen. c. 5.

Enchymoma, est sanguinis, & humorum in partem aliquam naturalis effusio, per quam, & partis eius venule replentur sanguine, & color vividus parti inditur, ut in ira, verecundia, gaudio, somno fit, diciturq. Græce ἐγχυμῶμα ἢ ἰγχιμῶσις, quæ effusio si fiat præter naturam, ut in vulnere, abscessu, phlegmone, dicitur *Ecchymosis*, vel *Ecchymoma*, vide *Ecchymoma*, 2. de morb. vul.

Enchyta, medicamenta sunt quæ oculis instillantur, ut *fænogræci decoctum*, candidum, & tenue oui, lac muliebri, & quæ in hunc usum præparantur collyria, de remed. par. fac. cap. 10.

Encope, ἐγκοπή & διακοπή vide *Hedra*.

Encranion, vide *Cerebellum*, & *Parenchephalis*.

Enema, id est infusum, quod per inferna in aluum infunditur, dicitur adhuc ἐγκλισμα κλυσηρ, libr. de ren. aff. cogn. cap. 4.

Endemus, & *Endemius* morbus appellatur, quasi patrium dixeris, & *Vernaculum* qui morbus communis est multis, qui alicui regioni supervenit, & accedit, ut *Epidemus*, & *Epidemius* morbus est, qui cum perniciosus non sit, tempore tamen aliquo in regione aliqua abundat, & inolescit, si enim perniciosus sit, pestis dicetur, 1. de vict. rat. 9. Morborum enim alij sporades hoc est dispersi, Σποράδες, qui singulos separatim corripiunt, non ab aere, sed potius à victus ratione cuique propria exorfi. Alij communes sunt, quos Græci κοινῆς, παγκοινῆς ἢ πανδρµῆς vocant, qui sunt certi morbi, & singulares, qui alicubi vagantur, & multos aequè simul corripiunt, causamq. habent communem, ut aerem quem omnes inspiramus, vel depravata aquæ potum, aut gravem, & vitiosum

sum cibum, quem omnes pariter absorbuerint, vel tetram exhalationem, vel quid simile, quod vitari nequeat. Qui morbi communes Pancœni, & Pandemi, si patrij sunt Vernaculi, & alicuius regionis familiares, Endemi, & Endemij vocantur, causamq. communem agnoscunt, & cōmunem insultum, de quibus Hipp. lib. de aqua, aere, & locis; si verò à communi causa nati, communes tamen sunt, non tamen patrij & familiares, sed potius externi, & aduentitij, si autem perniciosi, & contagiosi, pestilentes dicuntur, Græce Λοιμώδεις, si verò non pestilentes, sed pestilentibus mitiores sunt, μὴ Λοιμώδεις, carent proprio nomine, quamquam Galenus quasi oblitus eorum, quæ in præmio, lib. 1. epid. scripserat, asserat eos qui pestilentes non sunt, vocari Epidemios mutuato, scilicet generis nomine.

Endixis, ἐνδείξεις, Indicationes sunt, idest communitates, scopi, & auxiliorum materię, ἀντίδείξεις, verò his opposita sunt, 9. meth. c. 7.

Engisomata, instrumenta sunt, quibus in Calvaria fracturis utimur, vel ut alij, est ossis pertusio, cum pars affecta in profundum descendit, ac super illasum os corruit, lib. finit.

Engonios, idest, angulosa brachij figura, quæ illi membro naturalis est, omnis enim cuiusque partis figura rectissima, maxime est à dolore aliena, 6. meth. 5.

Engisomata, vide Camarosis.

Enthythmus pulsus, commune quoddam genus est, ad Eurthythmum pulsum, & Arythmum, 1. de diff. puls. cap. 9. qui enim naturalem, & optimū servat rhythmum ἐρεθμῶς δῖ, unusq. est & indivisus; qui verò non servat, ἀρρυθμῶς in tres divisus differentias, omnis autem pulsus qualis ille sit, aliquem servat Rhythmum, qui ἐρεθμῶς appellatur, & octava est pulsus differentia.

Ensi-

Ensiformis chartilago, vide *Chartilago ensiformis*.

Entera ἔντερα, *intestina*; sunt corpora caua, rotunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anum protensa, distribuendi ad iecur chyli, & continendi, expellendiq. stercoreis instrumenta, in orbem inuoluta, fibris circularibus, & transuersis contorta, ad Chili, & Stercoris expulsionem; Quorum tria superiora tenuia sunt, ἑκφυσις, siue δώδεκα-δάκτυλον, νῆσις, εἰλεὶον ἢ λεῖπὸν, hoc est, *Ecphysis*, ieiunum, *Ileon*, siue tenue; tria inferiora crassa, τυφλὸν, κῶλὸν, ἀπὸ θυσιμῶνον, cecum, colon, & rectum; atque inde patet, & si unum, & continuum numero sit intestinum, loco tamen, magnitudine, numero orbium, & anfractuuum euariat, senariisq. resultat numerus, & 5. de usu par. & 6. de anat. adm. Vbi verò ἑντερον, in singulari numero, i. intestinum ab Hip. profertur, docente Gal. com. 4. in 6. de morb. vul. apud alios significatur Colon, per excellentiam, ratione suae magnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descendit, & Enterocelen efficit, i. herniam intestinale, apud alios verò Caecum, 4. de usu par. c. 17.

Enterocoele, *Epiplocele*, & *Hydrocele*, sunt species ex articulationum, in quibus magna ex parte laxantur articuli capita; nonnunquam etiam rumpitur is meatus, qui à Peritoneo ad testiculos pertingit, lib. de caus. morb. c. 10. cum articuli suis sedibus excidunt, aut loco tantum mouentur, aut cum omentum, vel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas deuoluuntur, alterum morbum Graeci *Epiplocele*, alterum *enterocelen* appellant, de differ. morb. capit. 10. praeter hac ex ambobus etiam compositum, plus iusto connexum, *Enterocpiplocele*, iuniorum medicorum nomine appellatur, libr. de tumor. capit. 15. vide *Celas*.

Enthusiasmus, id est fanatica percussio, seu numinis affla.

afflatio, est velut cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ viderint, aut si tympana, vel tibiae, vel signa audierint, lib. finit.

Epacmaistica, 9. meth. 4. vide Continua.

Epapheresis, id est repetita sanguinis missio, de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores secundum aures, in ægrotantibus exortas, vocat Hippocr. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Sed Galen. 3. de comp. med. loc. cap. 2. dicit Eparmata (quæ & Parotides sunt) è genere esse inflammationum, quæ fiunt glandulis, circa aures, affectis; Paulus cum Hipp. non inflammationem sed affectionem tantum dixit, ut tumor omnis, siue oedematosus, siue scirrhus, citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, παρωτίς, dici potest.

Ephegeon, pubes & pecten aqualiculus Latine, Græcè ἐφῆγειον, ἐπίστοι; ἢ ἐπὶ ἰατρικῷ, quod est ab Hypogastrio seu imo ventre (quem & sumen vocant) usque ad pudenda. Introd.

Ephelcis, id est ramentum, seu cruoris exigua guttula, quæ interdum tussu in hæmoptoica passione, reijcitur, 4. de loc. aff. 5. aliquando generalius, ἐφελκίς, crustula est, quæ ulceri obducitur, diciturq. de internis; quandoque enim crustula & per tusses è pulmonibus, & per deiectiones, & intestinis, deijciuntur.

Ephelis, ἐφελίς, est aspreudo, & nigrities in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ τοῦ ἡλίου, id est Sole, nomen desumens.

Ephemera, febris est, quæ a causa procatartica, siue præincipiente sit cum urina coctione, prima die apparente, suavi caliditate, pulsu ad magnitudinem, & celeritatem effatudignam accedente, systole pulsus parum à naturalibus

turali tenore mutata, equali atque incompresso ascensu in caliditate, ac pulsibus, etiam consistente febre, sudore, aut rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore declinans, ubi integra febris cessatio sequitur, 1. de differ. febr. ca. 7. in spiritibus citra humorum putredinem accensa, ibid. c. 5. vide Diaria.

Ephialtes affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & suffocatio, cum quis somni initio, supinus iacens, grandi se mole opprimi, atque ab alio inuadi imaginatur, cū difficili respiratione immobilitate, ac noce prepedita, prope suffocari, eger videatur; adhuc Græcis dicitur ἐπιβλην πνιγάλιον, Latine vero Incubus, vel Incubonus dicitur, forte quia ex veteribus quicam Dæmonem, alij cupidinem, alij incubātem vetulam, aut externam quandā vim, quæ quiescentes inuaderet & pondere oppressos, grauaret, esse voluerunt. quamuis tota mali causa, intra corpus esset, in libello de utilitate respirationis, Galeno ascripto.

Ephidrosis ἐφιδρώσις, duo significat, vel sudoris circa thoracem, & caput exortum, vel in vniuerso corpore sudoris prouentum, tum paucum, tum inutilem.

Epialus, vide Febris Hepiala.

Epicauma est velut, ex gne crustulosa ulceratio, quæ oculi nigro aduenit, nec permanet, lib. finit. id morbi ἐπικαύμα & ἐγκαύμα vocant Græci, Latini verò vstionem, siue exustionem.

Epicerastica, ἐπιχεραστικά, medicamenta sunt, quæ & tēperantia dicuntur, quæ si valentiora euaserint humoribus mordicantibus, morsum eorum retundunt, 2. simpl. 12.

Epicrasis, ἐπιχράσις est vitiosi succi curatio, cum indicationes sibi aduersantur, in qua paulatim quod vitiosum est, vacuatur, & paulatim inuicem, quod salubre est, pro eo reponitur. 9. meth. 10.

Epi-

Epicrisis, id est, adiudicatio, ad *Thrasib.* cap. 6.

Epicrusis certa quadam est percussio, qua mangones puerorum, hoc ipso praesidio succurrunt ijs, quibus à natali die, gracilia sunt membra, 14. meth. c. 16.

Epicyema, ἐπικύημα; est secundus fœtus conceptus grauida iam muliere, id quod fit, ut scripsit Hippoc. cum fœtus iam conceptus non clauditur exactè uterus sed semen aliud etiam postea intro admittit; Arabibus super impregnatio dicitur.

Epidemus. vide *Endemus*, & *Communis*.

Epidermis, summa cutis corporis, seu cuticula, 3. metho. 4. sola sensatione à vera cute differt, hæc enim à nervorum extremitatibus dilatatis fit; *Epidermis* verò à Cutis excremento provenit: itaq. vel sensu caret, vel exigui sensus est, proinde citra dolorem facile à sub. ecta cute separatur.

Epidismus, siue *Hypodesmidas*, id est fascias, subfasciationes, & subligamina, siue vlla distinctione, veteres vocauerunt; At Hipp. fascias, quæ ipsi corpori circumdantur, subligamina, seu subfasciationes appellat, quæ plagulis extrinsecus superligantur, 3. de his, quæ in medic. 6. vide *Plagule*.

Epidesis, genus ligationis est ad sanguinis profluvium fluentibus vasis, iniecta, quamquam ipsum vas circulo non complectatur, sicut vinculum, verum cum ex parte, suo complexu committat quoddam modo vulnerati membri labra dissidentia, & quæ superimposita sunt, contineat. merito inter claudentia remedia, numeratur, 5. meth. 3.

Epididymis, ἐπιδιδυμῖς, i. supergeminalis tunica, testium involucrium est, & appendix; est enim pars quadam animalis gemini, hoc est testis capiti superimposita, id quod nomen ipsum præfert, ex qua multæ fistulæ, seroso quodam humore plenæ ad testem permeant, 1. de semin. c. 15.

Epiga-

Epigastrium, vide *Abdomen*.

Epigenema, ἐπιγενημα, quasi superueniens, vel supergenitum, idem est ac symptoma, de sympt. diff. cap. 1. vide *Symptoma*.

Epiglottis, ἐπιγλωττις, id est superlingula, est membrana cartilaginosa, rotunditatis oblonge in interiori gutturis parte collocata, 1. de loc. aff. 1. quæ à radice linguæ exoritur, lib. de vocal. instr. diff. capit. 4. quæ & Glottis dicitur, 7. de usu par. cap. 13. Dicitur etiam lingula, ligula, i. laryngis lingua; est enim corpus quoddam simile linguæ alicuius fistulæ ubi arteria, & larynx inter se connectuntur, 7. de usu pa. c. 12. quæ velut operculum rectè quidem omni tempore quo animal respirat stans, quo transglutit laryngi accumbens, ibid. c. 17. Cuius ligulæ nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs quem nunc habet, vomentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferrentur, ad laryngis cauitatem aceruata, ibid. Estq. hæc proprium vocis instrumentum, 1. de loc. aff. 6.

Epigonatis, vide *Patella*.

Eoilampsies, vide *Effulgescentia*.

Epilepsia, (quæ & *Epilepsis* dicitur,) id est morbus Comitialis, de diff. morb. cap. 5. estq. totius corporis convulsio, 2. de sympt. caus. c. 2. vide *Comitialis*.

Epilogismus communis est quædam ratio, & omnium assensu conspecta, 1. prorrhet. 6.

Epiludes, *Parulides*, *Thymi*, tumores sunt præter naturam, nihil selectum habentes præterquam quod sunt carnosæ germina, lib. de tumor. cap. 17.

Epinyctides, vide *Efflorescences*.

Epiparoxineste, id est superacui, & superexacerbari dicimus, cum paroxysmus plures habet insultus, sicut & pulsuum *Thlipsis*, i. compressio, sic enim nominant, quando incipiente

cipiēte accessione satis paruos, atque inæquales eosdem habet, 1. de dif. feb. cap. 7.

Epiphora, ἐπιπόρα, tum inflammationis magnæ, uniuerso illata corpori, tum largorum fluorum, & fluxionum commune nomen est; propriè verò, de oculis proferitur, ubi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia influxerit, lib. Introd. cap. 15.

Epiphysis, ἐπιφύσις est, ubi os cum osse ad unionem coit, siue adnata appendix, li. de ossib. in præmio: differt autem ab *Apophysi*, ut idem Gal. annotat, quod *Apophysis*, sit totius ossis extrema pars, *Epiphysis* verò non est ossis pars, sed aliquid ossi adnatum.

Epiphysis vermiformis ἐπιφύσις σκεληνοειδής, idem est ac *Conarium*, siue *Conoides* corpus, & *Turbinatum*, vide *Conoides*.

Epiplasma, idem est ac *Cataplasma*, ut cum tritici farina, ex hydreleæ decoquitur, ac vulneribus imponitur, 3. de comp. med. per gen. c. 2.

Epiptocle, vide *Celas*.

Epiptocomista pleriq. homines dicuntur, quasi dicas *Omenti gestores*, dum in magnam molem excreuerit, 6. de anat. adm. cap. 5.

Epiptoonphalon, omenti est in umbilicum decursus, & prolapsus, lib. finit.

Epiptoon, siue *Epilun*, vide *Omentum*.

Episarcidum, vide *Anasarca*.

Episemasia est ipsum principium, siue insultus accessionis febrilis, in quo agri solent horrere, refrigerari, scitare, pandiculari, dormire, aut aliud quid simile pati: dñ autē ἐπισημασία. hoc est significatio, dñ etiā, ἐπισβολὴ παροξυσμοῦ, id est annotatio paroxysmi, vide *Annotatio*.

Episio, vide *Aquaticulus*, siue *Aqualiculus*.

Epis-

Epispasthon, vide *attrahens*, est medicamen aridum in-
 sperfile, ad malignorum vlcera curationem, non inefficax,
 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis valen-
 tiora, quæ tum ex unguentis, tum ex ijs, quæ similem vim
 obtinent medicamentis componuntur, 7. meth. 4. *Epithe-*
ma adhuc, operculum est, 2. de usu par. c. 9.

Epnematosis, vide *Physis*.

Epoche, est suspensa sententia, nihilq. definiens, quod
 est de nulla re pronunciare, nec assenerare certò, lib. de op-
 timo docendi gen.

Epomida, i. superhumeralem, superiorem humeri partem
 dicunt, 1. de anat. adm. cap. 11. vide *Ala*.

Epulis, ἐπουλῖς, est tuberculum, & carnis excrescentia
 in gingivis proveniens, & ad intimos molares dentes, per-
 tinens, ita ut egger aliquando os aperire nequeat, 5. de com-
 pos. med. loc.

Epulotica, ἐπουλωτικά φάρμακα, medicamenta sunt quæ
 non detrabere, neque liquare carnem, sed indurare, desic-
 care, & cicatricem inducere apta sunt, ut alumen, galla
 omphatica, as combustum presertim lotum, 5. simplic.
 cap. 15.

Equus, (qui Græce *Hyppos* dicitur, lib. finit.) oculorum
 affectus est, insitus quibusdam, quibus oculi nullo tempore
 manere possunt requieti, sed tremule subinde niſtant, sem-
 per instabiles, 1. prog. 21.

Erratica febris, siue inordinata est, quæ extra horas
 consuetas, vel tardius, vel celerius inuadit, modo enim in-
 ordinate movetur, modo inordinate persistit, nunquam au-
 tem ordinate, lib. de Typis, c. 4. sunt enim in erraticis, in-
 ordinata principia.

Errhina, medicamenta sunt, quæ naribus, quas Graeci

ci Rhinas vocant, capitis purgandi gratia infunduntur, 5. simpl. c. 20.

Erythroide, est internat esticulorū tunica, de caus. morb. cap. 10. vide Elythroide.

Eruptionem, siue ut Græci dicunt, Exanthematum nomen quidam in communi vsorant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis; in mento sua sponte provenientib. 5. de comp. med. loc. cap. 6.

Erysipelas est tumor præter naturam non alte descēdēs sed in cute consistens, à bilioso humore obortus, colore pallido, 14. meth. 1. si verò ipsius color non sit omnino pallidus, sed mixtus ex pallido, & rubro, erit etiā mixta affectio, ex phlegmone in qua sanguis peccat, coloris rubei, & ex Erysipelate, utique ab eo, quod in mixtura superat nomen ipsi inditur, ac dicatur de eo id, quod superatur, sicut vel Phlegmonem erysipelatosam, vel erysipelas phlegmonosum, 14. meth. 1. & 2. Dicunt autem erysipelas, id est Vicinitrahā, vel Vicinirubiam, quod incensum quidem atque inflāmatum est semper, cum tumore verò non semper, lib. 3. de his. quæ in med. 30. & 2. ad Glau. 1. Exactū autem erysipelas est, quod à biliosa fluxione ortum ducit, 7. simpl. dictione Coriandrum.

Eschara crusta est, quæ ulceribus veluti septum, vel sua sponte, vel arte adnascitur, 5. meth. c. 3. vide Caustica.

Escharoticum medicamentum est, quod perinde ut causticum, in crassa essentia est, quod cuicumque inhaerit parte stipitis ritu infixum excruciat, 5. simpl. 15.

Esthiomenō herpes, est inflammato ex syncera flaua bile ad cutem decumbente acriori, & mordaciori quam herpes miliaris; in hoc enim fluor pituita mistus videtur, in illo exacta bilis totam exulcerans, & corrodens cutem, lib. de tumor. cap. 9. vide Herpes, Phagedæna, Nong.

Ectomyodes platysma, i. latus ille musculosus, siue musculosa dilatatio, quæ cuti subnascens, Gnaton, i. buccam, sine maxilla mouet, lib. de neruorum diff. cap. 6.

Euacuationem omnē, siue fiat inedia, siue sanguinis missione, siue purgante medicamento, solitus est vocare Hipp. vasorum inanitionem; *Euacuatio* autem est humorū, qui sua quantitate molestant, purgatio; ut purgatio est humorum, qui sua qualitate molestant, euacuatio, 6. aph. 2.

Euchymia, id est succorum in corpore bonitas, 2. de simplic. 13. unde *Eushymon* autrimentum est boni succi, 6. de sanit. tuen. cap. 7.

Eucrasia, est medium omnium temperamentorum, 1. de hisanit. tuen. cap. 4. ex optima, & conuenienti cuique mixtura quattuor primarum qualitatum consurgens. Unde eius magna est latitudo, quam qui adeptus est *ιουκρατ*, siue *Eucraton* corpus, id est optime temperatū appellabitur, secus *dyseraton*, siue intemperatum, 2. de temper. 1.

Euectica medicine pars, quā alij *Gymnasticam* vocāt, est quæ optimum habitum corpori inducendum studet, de part. art. med. cap. 5.

Euexia, est bona corporis habitudo, 1. de sanit. tuen. ca. 8. ut huic opposita *Cachexia*, i. prauus corporis habitus, *εὐξία καὶ κακὴ ξία*, illam complent bona omnium partium temperies, actionum robur, *Euchymia*, sanguinis, carnis, totiusq. corporea mel s *Symmetria*.

Euidentes causa, vide *continentes*.

Euoxon, vinculum, vocat Hippoc quod bene gestat, & sustinet, hoc est firmiter, & sine ulla compressione continet, 3. de artic. 22.

Eupathia, id est patiendi promptitudo, 4. de usu. p. 14.

Euphyiam, vocat Galenus, bonam habitudinem, 1. de usu part. 9.

Eup-

Eupnea εὐπνοία proba spiratio, quæ secundum naturam fit, opposita *dyspnæa* quæ est difficilis spiratio, apud Hipp. ut annotat Gal. in commento prognost.

Eurhythmus pulsus est, cuique etati, loco, tempori, temperamento, naturalis pulsus, cum suum rhytmum seruat, 1. de differ. puls. cap. 9.

Eusarcon, vide *Quadratum*.

Eusema crisis, quæ cum bonis signis à sua indicatoria die fuit indicata, ut quæ undecimo die coctionem in urina, noctem gravem, quæ accessionem præcedit, insultus cum cōcussione pulsuum decretoriam commotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit, 1. dier. decr. cap. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, ventremq; roborans, 6. de tuen. san. cap. 9.

Euthyporos, id est in vectum procedens, alterum ex instrumentis, & organis est, quæ fractis, vel luxatis cruribus supponuntur, (quæ σάλονιας, Græci vocant) quod quidem *Euthyporos* per unicum axem, qui in sine machinæ ad infernam eius partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, gemina tensione efficit; quod verò prius sursum, mox deorsum, illud *Metalepticum* dicitur, quasi translationem dixeris 6. meth. c. 5.

Entrophia, id est bona, & uberior nutritio, 3. de sanit. tuen. cap. 8.

Exanastomosis, vide *Osculorum apertio*.

Exanguis corporis partes sunt, ut ossa, & cartilagine quæ mucoso quodam humore aluntur, qui lentore quodam, & albedine præditus est, cum imbecilla ita natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat, 3. de art. 65.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis in aliqua

Ensiformis chartilago, vide Chartilago ensiformis.

Entera εντερα, intestina; sunt corpora caua, rotunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anum protensa, distribuendi ad iecur chyli, & continendi, expellendiq. stercoreis instrumenta, in orbem inuoluta, fibris circularibus, & transuersis contorta, ad Chili, & stercoreis expulsionem; Quorum tria superiora tenuia sunt, εκφυσις, siue δοδεκαδακτυλον, νῦσις, εἰλεον ἢ λεῖπρον, hoc est, Ecphysis, ieiunum, Ileon, siue tenue; tria inferiora crassa, τυφλόν, κῶλόν, ἀπιδυσμάνον, cecum, colon, & rectum; atque inde patet, & si vnum, & continuum numero sit intestinum, loco tamen, magnitudine, numero orbium, & anfractuuum euariat, senariusq. resultat numerus, & 5. de usu par. & 6. de anat. adm. Vbi verò εντερον, in singulari numero, i. intestinum ab Hip. profertur, docente Gal. com. 4. in 6. de morb. vul. apud alios significatur Colon, per excellentiam, ratione suae magnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descendit, & Enterocelen efficit, i. herniam intestinale, apud alios verò Cæcum, 4. de usu par. c. 17.

Enterocèle, Epiplocele, & Hydrocele, sunt species ex articulationum, in quibus magna ex parte laxantur artuum capita; nonnunquam etiam rumpitur is meatus, qui à Peritoneo ad testiculos pertingit, lib. de caus. morb. c. 10. cum articuli suis sedibus excidunt, aut locotantum mouentur, aut cum omentum, vel intestina, ad inferiores testiculorum, lunicas deuoluuntur, alterum morbum Græci Epiplocele, alterum enterocelen appellant, de differ. morb. capit. 10. præter hæc ex ambobus etiam compositum, plus iusto connexum, Enteroeiplocele, iuniorum medicorum nomine appellatur, libr. de tumor. capit. 15. vide Celas.

Enthusiasmus, id est fanatica percussio, seu numinis affla.

afflatio, est velut cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ viderint, aut si tympana, vel tibiae, vel signa audierint, lib. finit.

Epacnastica, 9. meth. 4. vide Continua.

Epapheresis, id est repetita sanguinis missio, de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores secundum aures, in ægrotantibus exortas, vocat Hippocr. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Sed Galen. 3. de comp. med. loc. cap. 2. dicit *Eparmata* (quæ & *Parotides* sunt) è genere esse inflammationum, quæ fiunt glandulis, circa aures, affectis; Paulus cum Hipp. non inflammationem sed affectionem tantum dixit, ut tumor omnis, siue oedematosus, siue scirrhusosus, citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, *παρωτίς*, dici potest.

Ephebeon pubes & *peñten* aqualiculus Latine, Græcè ἐφηβαίον, ἐπίπτεον, ὃν ἐν ἰστίον ἐστὶν, quod est ab Hypogastrio seu imo ventre (quem & *sumen* vocant) usque ad pudenda. Introd.

Epbelcis, id est ramentum, seu cruoris exigua guttula, quæ interdum tussi in hæmoptoica passione, reijcitur, 4. de loc. aff. 5. aliquando generalius, ἐφελκίς, crustula est, quæ ulceri obducitur, diciturq. de internis; quandoque enim crustula & per tusses è pulmonibus, & per deiectiones, & intestinis, deijciuntur.

Epbelis, ἐφελίς, est aspreudo, & nigrities in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ τοῦ ἡλίου, id est Sole, nomen desumens.

Ephemera, febris est, quæ a causa procatartica, siue præincipiente sit cum urinæ coctione, prima die apparente, suavi caliditate, pulsu ad magnitudinem, & celeritatem effatudignam accedente, systole pulsus parum à naturali

turali tenore mutata, equali atque incompresso ascensu in caliditate, ac pulsibus, etiam consistencie febre, sudore, aut rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore declinans, ubi integra febris cessatio sequitur, 1. de differ. febr. ca. 7. in spiritibus citra humorum putredinem accensa, ibid. c. 5. vide Diaria.

Ephialtes affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & suffocatio, cum quis somni initio, supinus iacens, grandi se mole opprimi, atque ab alio inuadi imaginatur. cū difficili respiratione immobilitate, ac nocte pre-pedita, prope suffocari, eger videatur; adhuc Græcis dicitur ἐπιβλην πνιγῶν, Latine vero Incubus, vel Incubonus dicitur, forte quia ex veteribus quicam Dæmonem, alij cupidi nem, alij incubantem vetulam, aut externam quandā vim, quæ quiescentes inuaderet & pondere oppressos, grauaret, esse voluerunt. quamuis tota mali causa, intra corpus esset, in libello de utilitate respirationis, Galeno ascripto.

Ephidrosis ἐφιδρώσις, duo significat, vel sudoris circa thro-ractem, & caput exortum, vel in uniuerso corpore sudoris prouentum, tum paucum, tum inutilem.

Epialus, vide Febris Hepiala.

Epicauma est velut, ex gne crustulosa ulceratio, quæ oculi nigro aduenit, nec permanet, lib. finit. id morbi ἐπικαύμα & ἐγκαύμα vocant Græci, Latini verò vstionem, siue exustionem.

Epicraistica, ἐπικραστικά, medicamenta sunt, quæ & tēperantia dicuntur, quæ si valentiora euaserint humorib. mordicantibus, morsum eorum retundunt, 2. simpl. 12.

Epicrasis, ἐπικράσις est vitiosi succi curatio, cum indicationes sibi aduersantur, in qua paulatim quod vitiosum est, vacuatur, & paulatim inuicem, quod salubre est, pro eo reponitur. 9. meth. 10.

Epi-

Epicrasis, id est, adiudicatio, ad *Thrasib.* cap. 6.

Epicrusis certa quadam est percussio, qua mangones puerorum, hoc ipso presidio succurrunt ijs, quibus à natali die, gracilia sunt membra, 14. meth. c. 16.

Epicyema, ἐπικύημα; est secundus fœtus conceptus grauida iam muliere, id quod fit, ut scripsit Hippoc. cum fœtus iam conceptus non clauditur exactè uterus sed semen aliud etiam postea intro admittit; Arabibus super impregnatio dicitur.

Epidemus, vide *Endemus*, & *Communis*.

Epidermis, summa cutis corporis, seu cuticula, 3. metho. 4. sola sensatione à vera cute differt, hæc enim à nervorum extremitatibus dilatatis fit; *Epidermis* verò à Cutis excremento provenit: itaq. vel sensu caret, vel exigui sensus est, proinde citra dolorem facile à sub. eſſa cute separatur.

Epidemus, siue *Hypodermidas*, id est fascias, subfasciationes, & subligamina, sine ulla distinctione, veteres vocauerunt; At Hipp. fascias, quæ ipsi corpori circumdantur, subligamina, seu subfasciationes appellat, quæ plagulis extrinsecus superligantur, 3. de his, quæ in medic. 6. vide *Plagule*.

Epidesis, genus ligationis est ad sanguinis profluvium fluentibus vasis, injecta, quamquam ipsum vas circulo non complectatur, sicut vinculum, verum cum ex parte, suo complexu committat quoddam modo vulnerati membri labra dissidentia, & quæ superimposita sunt, contineat merito inter claudencia remedia, numeratur, 5. meth. 3.

Epididymis, ἐπιδιδυμῖς, i. supergeminalis tunica, testium inuolucrum est, & appendix; est enim pars quadam animalis gemini, hoc est testis capiti superimposita, id quod nomē ipsum præferat, ex qua multe fistule, seroso quodam humore plene ad testem permeant, 1. de semin. c. 15.

Epiga-

Epigastrium, vide *Abdomen*.

Epigenema, ἐπιγενημα, quasi superueniens, vel supergenitum, idem est ac symptoma, de sympt. diff. cap. 1. vide *Symptoma*.

Epiglottis, ἐπιγλωττις, id est superlingula, est membrana cartilaginosa, rotunditatis oblonge in interiori gutturis parte collocata, 1. de loc. aff. 1. quæ à radice lingue exoritur, lib. de vocal. instr. diff. capit. 4. quæ & Glottis dicitur, 7. de usu par. cap. 13. Dicitur etiam lingula, ligula, i. laryngis lingua; est enim corpus quoddam simile lingue alicuius fistule ubi arteria, & larynx inter se connectuntur, 7. de usu pa. c. 13. quæ velut operculum rectè quidem omni tempore quo animal respirat stans, quo transglutit laryngi accumbens, ibid. c. 17. Cuius ligule nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs quem nunc habet, vomentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferrentur, ad laryngis cauitatem acervata, ibid. Estq. hæc proprium vocis instrumentum, 1. de loc. aff. 6.

Epigonatis, vide *Patella*.

Eoilampsies, vide *Effulgescentia*.

Epilepsia, (quæ & *Epilepsis* dicitur,) id est morbus Comitialis, de diff. morb. cap. 5. estq. totius corporis conuulsio, 2. de sympt. caus. c. 2. vide *Comitialis*.

Epilogismus communis est quædam ratio, & omnium assensu conspecta, 1. prorrhet. 6.

Epiludes, *Parulides*, *Thymi*, tumores sunt præter naturam, nihil se electum habentes præterquam quod sunt carnosæ germina, lib. de tumor. cap. 17.

Epinyctides, vide *Efflorescences*.

Epiparoxineste, id est superacui, & super exacerbari dicimus, cum paroxysmus plures habet insultus, sicut & pulsuum *Thlipsis*, i. compressio, sic enim nominant, quando incipient

cipiēte accessione satis paruos, atque inaequales eosdem habet, 1. de dif. feb. cap. 7.

Epiphora, ἐπιπόρα, tum inflammationis magnę, uniuerso illata corpori, tum largorum fluorum, & fluxionum commune nomen est; propriè verò, de oculis proferitur, ubi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia influxerit, lib. Introd. cap. 15.

Epiphysis, ἐπιφύσις est, ubi os cum osse ad unionem coit, siue adnata appendix, li. de ossib. in proœmio: differt autem ab *Apophysi*, ut idem Gal. annotat, quod *Apophysis*, sit totius ossis extrema pars, *Epiphysis* verò non est ossis pars, sed aliquid ossi adnatum.

Epiphysis vermiformis ἐπιφύσις σκωληκοειδής, idem est ac *Conarium*, siue *Conoides corpus*, & *Turbinatum*, vide *Conoides*.

Epiplasma, idem est ac *Cataplasma*, ut cum tritici farina, ex hydrelæo decoquitur, ac vulneribus imponitur, 3. de comp. med. per gen. c. 2.

Epiplotele, vide *Celas*.

Epiplocomista pleriq. homines dicuntur, quasi dicas *Omenti gestores*, dum in magnam molem excreuerit, 6. de anat. adm. cap. 5.

Epiplonphalon, omenti est in umbilicum decursus, & prolapsus, lib. finit.

Epiplon, siue *Epilun*, vide *Omentum*.

Episarcidum, vide *Anasarca*.

Episemasia est ipsum principium, siue insultus accessio-
nis febrilis, in quo ægri solent horrere, refrigerari, scitare,
pandiculari, dormire, aut aliud quid simile pati: dñ autē
ἐπισημασία hoc est significatio, dñ etiā, ἐπισκοπή παροξυσμοῦ,
idest annotatio paroxysmi, vide *Annotatio*.

Epision, vide *Aquaticulus*, siue *Aqualiculus*.

Epis-

Epispasthon, vide *attrahens*, est medicamen aridum in-
persile, ad malignorum vlcernum curationem, nō inefficax,
4. de comp. med. loc. cap. 5.

Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis valen-
tiora, quæ tum ex unguentis, tum ex ijs, quæ similem vim
obtinēt medicamentis componuntur, 7. meth. 4. *Epithe-
ma* adhuc, operculum est, 2. de usu par. c. 9.

Epneumatosis, vide *Physis*.

Epoche, est suspensa sententia, nihilq. definiens, quod
est de nulla re pronunciare, nec assenerare certò, lib. de op-
timo docendi gen.

Epomida, i. superhumeralem, superiorem humeri partē
dicunt, 1. de anat. adm. cap. 11. vide *Ala*.

Epulis, ἐπουλῖς, est tuberculum, & carnis excrescentia
in gingiuis proueniens, & ad intimos molares dentes, per-
tinens, ita vt eger aliquando os aperire nequeat, 5. de com-
pos. med. loc.

Epulotica, ἐπουλωτικά φάρμακα, medicamenta sunt quæ
non detrabere, neque liquare carnem, sed indurare, desic-
care, & cicatricem inaucere apta sunt, vt alumen, galla
omphatica, æs combustum præsertim lotum, 5. simplic.
cap. 15.

Equus, (qui Græce *Hyppos* dicitur, lib. finit.) oculorum
affectus est, insitus quibusdam, quibus oculi nullo tempore
manere possunt requieti, sed tremule subinde niſtant, sem-
per instabiles, 1. prog. 21.

Erratica febris, siue inordinata est, quæ extra horas
consuetas, vel tardius, vel celerius inuadit, modo enim in-
ordinate mouetur, modo inordinate persistit, nunquam au-
tem ordinate, lib. de Typis, c. 4. sunt enim in erraticis, in-
ordinata principia.

Errhina, medicamenta sunt, quæ naribus, quas Græ-
ci

ci Rhinas vocant, capitis purgandi gratia infunduntur, 5. simpl. c. 20.

Erythroide, est internat esticulorū tunica, de caus. morb. cap. 10. vide Elythroide.

Eruptionem, siue ut Græci dicunt, Exanthematum nomen quidam in communi vsorpant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis; in mento sua sponte provenientib. 5. de comp. med. loc. cap. 6.

Erysipelas est tumor præter naturam non alte descēdēs sed in cute consistens, à bilioso humore obortus, colore pallido, 14. meth. 1. si verò ipsius color non sit omnino pallidus, sed mixtus ex pallido, & rubro, erit etiā mixta affectio, ex phlegmone in qua sanguis peccat, coloris rubei, & ex Erysipelate, utique ab eo, quod in mixtura superat nomen ipsi inditur, ac dicatur de eo id, quod superatur, sicut vel Phlegmonem erysipelatosam, vel erysipelas phlegmonosum, 14. meth. 1. & 2. Dicunt autem erysipelas, id est Vicinitrahā, vel Vicinirubiam, quod incensum quidem atque inflāmatum est semper, cum tumore verò non semper, lib. 3. de his. quæ in med. 30. & 2. ad Glauc. 1. Exactū autem erysipelas est, quod à biliosa fluxione ortum ducit, 7. simpl. dictione Coriandrum.

Eschara crusta est, quæ ulceribus veluti septum, vel sua sponte, vel arte adnascitur, 5. meth. c. 3. vide Caustica.

Escharoticum medicamentum est, quod perinde ut causticum, in crassa essentia est, quod cuicumque inhaerit parte stipitis ritu infixum excruciat, 5. simpl. 15.

Esthiomenō herpes, est inflammato ex syncera flaua bile ad cutem decumbente acriori, & mordaciori quam herpes militaris; in hoc enim fluor pituita mistus videtur, in illo exacta bilis totam exulcerans, & corrodens cutem, lib. de tumor. cap. 9. vide Herpes, Phagedæna, Nong.

Echmyodes platysma, i. latus ille musculosus, siue musculo-
sa dilatatio, quæ cuti subnascens, Gnaton, i. buccam, sine
maxilla mouet, lib. de neruorum diff. cap. 6.

Euacuationem omnē, siue fiat inedia, siue sanguinis mis-
fione, siue purgante medicamento, solitus est vocare Hipp.
vasorum inanitionem; *Euacuatio* autem est humorū, qui
sua quantitate molestant, purgatio; ut purgatio est humo-
rum, qui sua qualitate molestant, euacuatio, 6. aph. 2.

Euchymia, id est succorum in corpore bonitas, 2. de sim-
plic. 13. unde *Eushymon* autrimentum est boni succi, 6. de
sanit. tuen. cap. 7.

Eucrasia, est medium omnium temperamentorum, 1. de sa-
nit. tuen. cap. 4. ex optima, & conuenienti cuique mixtura
quattuor primarum qualitatū consurgens. Vnde eius ma-
gna est latitudo, quam qui adeptus est ιουκρατ. siue *Eucra-
ton* corpus, id est optime temperatū appellabitur secus dy-
scraton, siue intemperatum, 2. de temper. 1.

Euectica medicine pars, quā alij *Gymnasticam* vocāt,
est quæ optimum habitum corpori inducendum studet, de
part. art. med. cap. 5.

Euexia, est bona corporis habitudo, 1. de sanit. tuen. ca.
8. ut huic opposita *Cachexia*, i. prauus corporis habitus,
εὐεξία καὶ καχεξία, illam complent bona omnium partiū
temperies, actionum robur, *Euchymia*, sanguinis, carnis,
totiusq. corporeæ mēis Symmetria.

Euidentes causæ, vide Continentes.

Euoxon, vinculum, uocat Hippoc quod bene gestat, &
sustinet, hoc est firmiter, & sine ulla compressione cōtinet,
3. de artic. 22.

Eupathia, id est patiendi promptitudo, 4. de usu. p. 14.

Euphyiam, uocat Galenus, bonam habitudinem, 1. de
usu part. 9.

Eup-

Eupnea εὐπνοία proba spiratio, quæ secundum naturam fit, opposita dyspnæa quæ est difficilis spiratio, apud Hipp. ut annotat Gal. in commento prognost.

Eurhythmus pulsus est, cuique ætati, loco, tempori, temperamento, naturalis pulsus, cum suum rhythmum seruat, 1. de differ. puls. cap. 9.

Eusarcon, vide *Quadratum*.

Eusema crisis, quæ cum bonis signis à sua indicatoria die fuit indicata, ut quæ undecimo die coctionem in urina, noctem grauem, quæ accessionem præcedit, insultus cum cōcussione pulsuum decretoriam commotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit, 1. dier. decr. cap. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, ventremq; roborans, 6. de tuen. san. cap. 9.

Euthyporos, id est in rectum procedens, alterum ex instrumentis, & organis est, quæ fractis, vel luxatis cruribus supponuntur, (quæ σάλοινας, Græci vocant) quod quidem Euthyporos per unicum axem, qui in fine machinæ ad infernam eius partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, gemina tensione efficit; quod verò prius sursum, mox deorsum, illud Metalepticum dicitur, quasi translationem dixeris 6. meth. c. 5.

Entropbia, id est bona, & vberior nutritio, 3. de sanit. tuen. cap. 8.

Exanastomosis, vide *Osculorum apertio*.

Exangues corporis partes sunt, ut ossa, & cartilaginee quæ mucoso quodam humore aluntur, qui lentore quodam, & albedine præditus est, cum imbecilla ita natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicōctum relinquat, 3. de art. 65.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis in aliqua

Ensiiformis chartilago, vide Chartilago ensiiformis.

Entera ἑντέρα, intestina; sunt corpora caua, rotunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anum protensa, distribuendi ad iecur chyli, & continendi, expellendiq. stercoreis instrumenta, in orbem inuoluta, fibris circularibus, & transversis contorta, ad Chyli, & Stercoris expulsionem; Quorum tria superiora tenuia sunt, ἐκφυσις, siue δώδεκα-δάκτυλον, νήσις, εἰλεὼν ἢ λεῖπὸν, hoc est, Ecphysis, ieiunum, Ileon, siue tenue; tria inferiora crassa, τυφλὸν, κώλὸν, ἀπὸ θυσιμῶν, cæcum, colon, & rectum; atque inde patet, & si unum, & continuum numero sit intestinum, loco tamen, magnitudine, numero orbium, & anfractuum cuariat, senariusq. resultat numerus, & 5. de usu par. & 6. de anat. adm. Vbi verò ἑντερον, in singulari numero, i. intestinum ab Hip. profertur, docente Gal. com. 4. in 6. de morb. vul. apud alios significatur Colon, per excellentiam, ratione sua magnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descendit, & Enterocelen efficit, i. herniam intestinale, apud alios verò Cæcum, 4. de usu par. c. 17.

Enterocèle, Epiplocele, & Hydrocele, sunt species ex articulationum, in quibus magna ex parte laxantur artuum capita; nonnunquam etiam rumpitur is meatus, qui à Peritonæo ad testiculos pertingit, lib. de caus. morb. c. 10. cum articuli suis sedibus excidunt, aut loco tantum mouentur, aut cum omentum, vel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas deuoluuntur, alterum morbum Greci Epiplocele, alterum enterocelen appellant, de differ. morb. capit. 10. præter hæc ex ambobus etiam compositum, plus iusto connexum, Enteroepiplocele, iuniorum medicorum nomine appellatur, libr. de tumor. capit. 15. vide Celas.

Entusiasmus, id est fanatica percussio, seu numinis affla.

afflatio, est velut cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ viderint, aut si tympana, vel tibias, vel signa audierint, lib. finit.

Epacmaſtica, 9. meth. 4. vide Continua.

Epapheresis, id est repetita sanguinis missio, de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores secundum aures, in ægrotantibus exortas, vocat Hippocr. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Sed Galen. 3. de comp. med. loc. cap. 2. dicit Eparmata (quæ & Parotides sunt) è genere esse inflammationum, quæ fiunt glandulis, circa aures, affectis; Paulus cum Hipp. non inflammationem sed affectionem tantum dixit, ut tumor omnis, siue oedematosus, siue scirrhus, citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, παρωτις, dici potest.

Ephegeon, pubes & pecten aqualiculus Latine, Græcè ἐφῆβαιον, ἐπίσσιον; ἤβη iactotum est, quod est ab Hypogastrio seu imo ventre (quem & sumen vocant) usque ad pudenda. Introd.

Ephelcis, id est ramentum, seu cruoris exigua guttula, quæ interdum tussi in hæmoptoica passione, reijcitur, 4. de loc. aff. 5. aliquando generalius, ἐφελκίς, crusta est, quæ ulceri obducitur, dicitur q. de internis; quandoque enim crustula & per tusses è pulmonibus, & per deiectiones, & intestinis, deijciuntur.

Ephelis, ἐφελίς, est aspreudo, & nigrities in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ τοῦ ἡλίου, id est Sole, nomen desumens.

Ephemera, febris est, quæ a causa procatartica, siue præcipientente sit cum urina coctione, prima die apparente, suavi caliditate, pulsu ad magnitudinem, & celeritatem effat dignam accedente, systole pulsus parum à naturalit

turali tenore mutata, equali atque incompresso ascensu in caliditate, ac pulsibus, etiam consistente febre, sudore, aut rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore declinans, ubi integra febris cessatio sequitur, 1. de differ. febr. ca. 7. in spiritibus citra humorum putredinem accensa, ibid. c. 5. vide Diaria.

Ephialtes affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & suffocatio, cum quis somni initio, supinus iacens, grandi se mole opprimi, atque ab alio inuadi imaginatur, cū difficili respiratione immobilitate, ac nocte prepedita, prope suffocari, eger videatur; adhuc Græcis dicitur ἐπιβλην πνιγάλιον, Latine vero Incubus, vel Incubonus dicitur, forte quia ex veteribus quicam Dæmonem, alij cupidinem, alij incubātem vetulam, aut externam quandā vim, quæ quiescentes inuaderet & pondere oppressos, grauaret, esse voluerunt, quamuis tota mali causa, intra corpus esset, in libello de utilitate respirationis, Galeno ascripto.

Ephidrosis ἐφιδρώσις, duo significat, vel sudoris circa thoracem, & caput exortum, vel in vniuerso corpore sudoris prouentum, tum paucum, tum inutilem.

Epialus, vide Febris Hepiala.

Epicauma est velut, ex gne crustulosa ulceratio, quæ oculi nigro aduenit, nec permanet, lib. finit. id morbi ἐπικαύμα & ἐγκαύμα vocant Græci, Latini verò vñionem, siue exustionem.

Epicerastica, ἐπικεραστικά, medicamenta sunt, quæ & tēperantia dicuntur, quæ si valentiora euaserint humoribus mordicantibus, morsum eorum retundunt, 2. simpl. 12.

Epicrasis, ἐπικράσις est vitiosi succi curatio, cum indicationes sibi aduersantur, in qua paulatim quod vitiosum est, vacuatur, & paulatim inuicem, quod salubre est, pro eo reponitur. 9. meth. 10.

Epi-

Epicrisis, id est, adiudicatio, ad *Thrasib.* cap. 6.

Epicrusis certa quadam est percussio, qua mangones puerorum, hoc ipso presidio succurrunt ijs, quibus à natali die, gracilia sunt membra, 14. meth. c. 16.

Epicyema, ἐπικύημα; est secundus fœtus conceptus grauida iam muliere, id quod fit, ut scripsit Hippoc. cum fœtus iam conceptus non clauditur exactè uterus sed semen aliud etiam postea intro admittit; Arabibus super impregnatio dicitur.

Epidemus, vide *Endemus*, & *Communis*.

Epidermis, summa cutis corporis, seu cuticula, 3. metho. 4. sola sensatione à vera cute differt, hæc enim à nervorum extremitatibus dilatata fit; *Epidermis* verò à Cutis excremento provenit: itaq. vel sensu caret, vel exigui sensus est, proinde citra dolorem facile à subiecta cute separatur.

Epidismus, siue *Hypodermidas*, id est fascias, subfasciationes, & subligamina, sine ulla distinctione, veteres vocauerunt; At Hipp. fascias, quæ ipsi corpori circumdantur, subligamina, seu subfasciationes appellat, quæ plagulis extrinsecus superligantur, 3. de his, quæ in medic. 6. vide *Plagule*.

Epidesis, genus ligationis est ad sanguinis profluvium fluentibus vasis, injecta, quamquam ipsum vas circulo non complectatur, sicut vinculum, verum cum ex parte, suo complexu committat quoddam modo vulnerati membri labra dissidentia, & quæ superimposita sunt, contineat, merito inter claudentia remedia, numeratur, 5. meth. 3.

Epididymis, ἐπιδιδυμῖς, 1. supergeminalis tunica, testium involucrium est, & appendix; est enim pars quadam animalis gemini, hoc est testis capiti superimposita, id quod nomen ipsum præfert, ex qua multe fistule, seroso quodam humore plena ad testem permeant, 1. de semin. c. 15.

Epiga-

Epigastrion, vide Abdomen.

Epigenema, ἐπιγενημα, quasi superueniens, vel supergenitum, idem est ac symptoma, de sympt. diff. cap. 1. vide Symptoma.

Epiglottis, ἐπιγλωττις, id est superlingula, est membrana cartilaginosa, rotunditatis oblonge in interiori gutturis parte collocata, 1. de loc. aff. 1. quæ à radice linguae exoritur, lib. de vocal. instr. diff. capit. 4. quæ & Glottis dicitur, 7. de usu par. cap. 13. Dicitur etiam lingula, ligula, i. laryngis lingua; est enim corpus quoddam simile lingue alicuius fistule ubi arteria, & larynx inter se connectuntur, 7. de usu pa. c. 13. quæ velut operculum rectè quidem omni tempore, quo animal respirat stans, quo transglutit laryngi accumbens, ibid. c. 17. Cuius ligule nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs quem nunc habet, vomentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferrentur, ad laryngis cavitatem acervata, ibid. Estq. hæc proprium vocis instrumentum, 1. de loc. aff. 6.

Epigonatis, vide Patella.

Eoilampsies, vide Effulgescentia.

Epilepsia, (quæ & Epilepsis dicitur,) id est morbus Comitialis, de diff. morb. cap. 5. estq. totius corporis convulsio, 2. de sympt. caus. c. 2. vide Comitialis.

Epilogismus communis est quædam ratio, & omnium assensu conspecta, 1. prorrhet. 6.

Epiludes, Parulides, Thymi, tumores sunt præternaturam, nihil seletum habentes præterquam quod sunt carnosæ germina, lib. de tumor. cap. 17.

Epinyctides, vide Efflorescences.

Epiparoxineste, id est superacui, & superexacerbari dicimus, cum paroxysmus plures habet insultus, sicut & pulsuum Thlipsis, i. compressio, sic enim nominant, quando incipiente

cipiēte accessione satis paruos, atque inaequales eosdem habet, 1. de dif. feb. cap. 7.

Epiphora, ἐπιπόρα, tum inflammationis magnę, uni-
uerso illata corpori, tum largorum fluorum, & fluxio-
num commune nomen est; propriè verò, de oculis profer-
tur, ubi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia
influxerit, lib. Introd. cap. 15.

Epiphysis, ἐπιφύσις est, ubi os cum osse ad unionem coit,
siue adnata appendix, li. de ossib. in proœmio: differt autem
ab Apophysi, ut idem Gal. annotat, quod Apophysis, sit to-
tius ossis extrema pars, Epiphysis verò non est ossis pars, sed
aliquid ossi adnatum.

Epiphysis vermiciformis ἐπιφύσις σκεληνεειδής, idem est ac
Conarium, siue Conoides corpus, & Turbinatum, vide Co-
noides.

Epiplasma, idem est ac Cataplasma, ut cum tritici fari-
na, ex hydrelæo decoquitur, ac vulneribus imponitur, 3. de
comp. med. per gen. c. 2.

Epiplocele, vide Celas.

Epiplocomista pleriq. homines dicuntur, quasi dicas
Omenti gestores, dum in magnam molem excreuerit, 6. de
anat. adm. cap. 5.

Epiploonphalon, omenti est in umbilicum decursus, &
prolapsus, lib. finit.

Epiploon, siue Epilon, vide Omentum.

Episarcidum, vide Anasarca.

Episemasia est ipsum principium, siue insultus accessio-
nis febrilis, in quo agri solent horrere, refrigerari, escitare,
pandiculari, dormire, aut aliud quid simile pati: dñ autē
ἐπισημασία. hoc est significatio, dñ etiā, ἐπισβολή παροξυσμοῦ,
idest annotatio paroxysmi, vide Annotatio.

Epision, vide Aquaticulus, siue Aqualiculus.

Epis-

Epispasthon, vide *attrahens*, est medicamen aridum inspersile, ad malignorum vlcerum curationem, non inefficax, 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis valentiora, quæ tum ex unguentis, tum ex ijs, quæ similem vim obtinent medicamentis componuntur, 7. meth. 4. *Epithema* adhuc, operculum est, 2. de usu par. c. 9.

Epneumatosis, vide *Physis*.

Epoche, est suspensa sententia, nihilq. definiens, quod est de nulla re pronunciare, nec assenerare certò, lib. de optimo docendi gen.

Epomida, i. superhumeralem, superiorem humeri partem dicunt, 1. de anat. adm. cap. 11. vide *Ala*.

Epulis, ἐπουλῖς, est tuberculum, & carnis excrescentia in gingiuis proueniens, & ad intimos molares dentes, pertinens, ita ut eger aliquando os aperire nequeat, 5. de comp. med. loc.

Epulotica, ἐπουλωτικά φάρμακα, medicamenta sunt quæ non detrabere, neque liquare carnem, sed indurare, desiccare, & cicatricem inaucere apta sunt, ut alumen, galla omphatica, æs combustum præsertim lotum, 5. simplic. cap. 15.

Equus, (qui Græce *Hyppos* dicitur, lib. finit.) oculorum affectus est, insitus quibusdam, quibus oculi nullo tempore manere possunt requieti, sed tremule subinde niſtant, semper instabiles, 1. prog. 21.

Erratica febris, siue inordinata est, quæ extra horas consuetas, vel tardius, vel celerius inuadit, modo enim inordinatè mouetur, modo inordinatè persistit, nunquam autem ordinatè, lib. de Typis, c. 4. sunt enim in erraticis, inordinata principia.

Errhina, medicamenta sunt, quæ naribus, quas Græci

ci Rhinas vocant, capitis purgandi gratia infunduntur, 5. simpl. c. 20.

Erythroide, est internat esticulorū tunica, de caus. morb. cap. 10. vide Elythroide.

Eruptionem, siue ut Græci dicunt, Exanthematum nomen quidam in communi vsorant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis; in mento sua sponte provenientibus. 5. de comp. med. loc. cap. 6.

Erysipelas est tumor præter naturam non alte descēdēs sed in cute consistens, à bilioso humore obortus, colore pallido, 14. meth. 1. si verò ipsius color non sit omnino pallidus, sed mixtus ex pallido, & rubro, erit etiā mixta affectio, ex phlegmone in qua sanguis peccat, coloris rubei, & ex Erysipelate, utique ab eo, quod in mixtura superat nomen ipsi inditur, ac dicatur de eo id, quod superatur, sicut vel Phlegmonem erysipelatosam, vel erysipelas phlegmonosum, 14. meth. 1. & 2. Dicunt autem erysipelas, id est Vicinitrahā, vel Vicinirubiam, quod incensum quidem atque inflāmatum est semper, cum tumore verò non semper, lib. 3. de his. quæ in med. 30. & 2. ad Glau. 1. Exactū autem erysipelas est, quod à biliosa fluxione ortum ducit, 7. simpl. dictione Coriandrum.

Eschara crusta est, quæ ulceribus veluti septum, vel sua sponte, vel arte adnascitur, 5. meth. c. 3. vide Cautērica.

Escharoticum medicamentum est, quod perinde ut causticum, in crassa essentia est, quod cuicumque inbaserit parte stipitis ritu infixum excruciat, 5. simpl. 15.

Esthiomenō herpes, est inflammato ex syncera flaua bile ad cutem decumbente acriori, & mordaciori quam herpes miliaris; in hoc enim fluor pituita mistus videtur, in illo exacta bilis totam exulcerans, & corrodens cutem, lib. de tumor. cap. 9. vide Herpes, Phagedæna, Nong.

Eupnea εὐπνοία proba spiratio, quæ secundum naturam fit, opposita *dyspnæa* quæ est difficilis spiratio, apud Hipp. ut annotat Gal. in commento prognost.

Eurhythmus pulsus est, cuique ætati, loco, tempori, temperamento, naturalis pulsus, cum suum rhythmum seruat, 1. de differ. puls. cap. 9.

Eusarcon, vide *Quadratum*.

Eusemacrisis, quæ cum bonis signis à sua indicatoria die fuit indicata, ut quæ undecimo die coctionem in urina, noctem gravem, quæ accessionem præcedit, insultus cum cōcussione pulsuum decretoriam commotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit, 1. dier. decr. cap. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, ventremq; roborans, 6. de tuen. san. cap. 9.

Euthyporos, id est in rectum procedens, alterum ex instrumentis, & organis est, quæ fractis, vel luxatis cruribus supponuntur, (quæ σάλπιγξ, Græci vocant) quod quidem *Euthyporos* per unicum axem, qui in fine machinæ ad infernam eius partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, gemina tensione efficit; quod verò prius sursum, mox deorsum, illud *Metalepticum* dicitur, quasi translationem dixeris 6. meth. c. 5.

Entrophia, id est bona, & uberior nutritio, 3. de sanit. tuen. cap. 8.

Exanastomosis, vide *Osculorum apertio*.

Exanguis corporis partes sunt, ut ossa, & cartilagines quæ mucoso quodam humore aluntur, qui lentore quodam, & albedine præditus est, cum imbecilla ita natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat, 3. de art. 65.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis in aliqua

corporis parte provenientibus, quæ & pustulæ, & Bothor dicuntur, 5. de comp. med. loc. c. 6. sunt autem ἐξανθήματα, id est papulæ quædam leues eruptiones humorum per cutem efflorescentiam; rubræ, pallidæ, flavæ, non nunquam, & nigre, & livide, pro humorum ratione, nunc indolentes, nunc prurientes cum scalptu, interdum sine pruritu, nunc ulcero sæ, nunc ad ulcus non devenientes, harum generum sunt φλυκταίναι, ὑδράκαι, ὀπινύκτιδες, λειχύναι. Variolæ, Morbilli, quæque in sue Venerea gignuntur, & quæ in febribus pestilentibus, vide Pustulæ, Eruptionum.

Exartbrema, luxatio est, non omnis, sed ea tantum, in qua totus articulus à sua sede excidit, nam parvam luxationem, non ἐξάρθρωμα sed παράρθρωμα, quidam vocari contendunt, 2. meth. 2.

Exarticulatio est alicuius membri luxatio, li. de morb. diff. cap. 13. Exarticulationes interdum vocat exarticulata, id est ossium à propria sede excessus, sine fractione, co. 1. in 1. de fract. 1. vide Luxationes.

Ex agitudine senectus, siue ex morbo senium (quod & Tabes, seu Marasmus & Marcor, febrisq. a qua proficiscitur, tabida, vel marasmodus dicitur) est entinfectioni caloris, ad quam totum corpus contabescit, instar arboris cuiusdam supra modum arefactæ, aut ob longitudinem temporis, aut flammæ viciniam, aut vehementem, atque immoderatum squalorem; Cumq. hæc qualitas senibus, annorum multitudinis ratione cōparetur tabidis, tamē a febrili caliditate, 5. de sanit. tuen. c. 9. & 1. de differ. feb. ca. 8. Fitq. ex defectu nutrimenti, ubi quis vel ex electione famē tolerat, vel præ ciborum inopia, fame conficitur, lib. de marco-re, capit. 1. vide Marasmus.

Excavatio, vide Lordosis.

Excidentia apud Hipp. nunc sine adiectione luxationē ossium

fiu à ppria sede significūt, 1. de fruct. 1. nūc articularū tātm luxationes, com. 3. de ijs, quā in med. 31. vide Luxationes.

Excrementum id omne dicitur, quod in alendo corpore, nec confici, nec assimilari potuit; Cumq. propterea corpori non adnascatur, nec adcreseat, per ipsius laxiora intus spatia nunquam superuacaneum errat, unde nomen quoque recte à maiorib. eirei περιττώμα. i. pererrans est inditum, 1. de sanit. tuen. c. 3. vide Attrahitrix, & Lotium.

Excitationes. i. ossium extra cutem eiectiones, de offibus enim extantibus est sermo, 4. de artic. 34.

Exelcismus, est ossis, vel ossium deductio à superficie in profundum, lib. finit.

Exercitatio acuta, cuius celeres motus sunt, quæ corpus tenuat, contraria crassum reddit, multa corpus siccatur, mediocris obæsum præstat, 5. de sanit. tuen. 3.

Exipotica, id est excolentia, & digerentia medicamentum, 7. de comp. med. per gen. 9.

Ex morbo senium, vide ex egritudine senectus.

Exōphalos, dicitur cui umbilicus foras prominet, quod malum, alij rupturam vocant, alij egressionem umbilici, quod accidit, vel Peritonæo rupto, aut procidente Omēto, aut intestino, vel humore ibidem collecto, vel carne subnata, vel sanguine irrumpēte, per Diapedesim, vel Aneurisma, vel solo aliquando spiritu irruente, vide Bubonecele.

Exostoses, vide Elephas.

Expansa ἐκπεπταμένα, vide Abscedentia.

Experientia, est eius, q. sapius, & eodē modo visum est, observatio, atque memoria. ad Trasibul. c. 11.

Expiratio est motus, quo spiritus per respirationem ad interiora latus, ad exteriora propellitur, 4. aphor. 68. qua in cordis compressionibus, id quod fuliginosum est eo, ac fumidum per laues arterias, extra funditur, 7. de

usu part. 9. vide Inspiratio.

Exspiratus, species quædam est, ex conuulsione proueniens, quæ musculorum qui exspiratum efficiunt, conuulsionem sequitur, quam appellat Hipp. spiritum inter exeundū offendentem, 2. de sympt. caus. c. 2. & 4. aph. 68.

Expultrix facultas, vide Attract. ix.

Exquisita & extēsa tertiana, vide Tertianæ simpliciter.

Extrasis, id est mentis emotio, insania est, quæ breui finitur, lib. finit.

Extensum intestinum, vide Rectum.

Extergentiæ, vide Rhyptica.

Externa causa, vide Procatartica & Cōtinentes causæ.

Extuberatio, est vertebræ alicuius ab interiori, ad exteriorem regionem luxatio, 9. de placit. 4.

Exsuccatio. i. sugillatio, 2. de fract. 24. vide Contusio.

Exsudare est circa frontem, & clauiculas parum sudare, com. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Exufflatio est multi spiritus extra animal per guttur affatim facta emissio, agentibus ad id intercostalibus musculis, contractoq. Thorace, 1. de loc. aff. 6. quæ duplex est, altera citra sonitū, & strepitum, cū ex utriusque thoracis partibus nihil omnino exspirat animal; altera cum una tantū thoracis parte respirat animal, ita ut semispirans, vel seminocale reddatur, diciturq. exsufflatio strepens, vel cum sonitu, 4. de loc. aff. 6.

Exustio, quæ & Deustio dicitur, siue ipsa Solis operatio talem sortiatur appellationem, aut qui ab eodem fit in corpore affectus, siue ille qui iam effectus est; est quidem sane, & hoc ipsum calor præter naturam nondum tamen febris, nisi Cor una calefiat, 1. de differ. feb. cap. 3.

F

FACIES, Græce πρόσωπον, est quicquid à priore capitis parte sub tota fronte, auribus, oculis, naso, & ore ad mentum usque, à supercilijs incipiens, circumscribitur, lib. Introd. cap. 10.

Facies Hippocratica, quam mortiferam vocant, est cuius nasus acutus, caui oculi, adstricta tempora, aures frigida, & contractæ, & fibræ earum versæ, cutis circa frontem dura, intenta, arida, color totius vultus viridis, aut niger est, 1. prog. 7.

Fœtus, (quod tempore in utero semen seminis speciem refert, ut in abortu & dissectione visum est) ab Hipp. non appellatur, donec sanguine repletum Cor, Cerebrum, & Iecur, indistinctam quidem, & informem, quandam tamen coagulationem, & magnitudinem præstulerint, & carnea fœus substantia, & non amplius seminalis appareret, tunc non genitura, ut prius, sed fœtus ab Hipp. appellatur, 1. de sem. c. 9.

Fames, vide Sensus indigentia.

Fatuitas (quæ & μωρία, Stultitia, & Stoliditas dicitur) symptoma est citra delirium, ægros naturalibus fatuis similes reddens, quales etiam ex ijs, qui dicuntur consensescere, nonnullos fieri novimus, cui pathemati similem quidam est, quâquam non idem quod vocant ἀνοία, aniam. i. ignorantiam, de qua Thucydides scripsit in his qui ex peste servati sunt, hoc pacto, ignoraverunt, tum seipsos, tum familiares, com. 2. in 1. prorrh. 60.

Fauces sunt internus oris locus, ubi simul conveniunt, & gulæ & gutturis partes extremæ, 4. de loc. aff. c. 3. quas fauces Pharynga vocant, id est, præiacentem gulæ, & gutturis sedem, quæ aperiendo deorsum, evidentem amplitudinem,

in qua gemina ostiola visuntur, tum gulæ, tum etiam gut-
ris, commonstrat, 3. progn. 16. vide Isthmus, & Pha-
rynix.

Fauus, qui & Κηρίον, & μελικηρίς dicitur, vide Achæ-
res & Cerion.

Febrire siquidem existimamus, non eum modo qui in cu-
te, in superficie exteriori igneam habet caliditatem, verū
etiam, & hoc magis, qui eā, in corporis imo, & viscerib.
continet, ro. 1. in 1. prorrh. 7.

Febris, secundum communem omnium hominum cōsen-
sum, est caliditas præter naturam, maxime quidem in totū
animale effusa: sin minus at omnino vel in plurimis partib.
vel in nobilissimis accensa, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.
cū is calor adeo auctus est, ut & hominem offendat, & a-
ctionem lædat, 8. meth. ca. 1. siue idem calor, ipsum Cordis
corpus occupauerit, siue eos, qui in eius ventriculi continē-
tur humores, 1. de diff. feb. c. 1. & 3. & de cur. per san. ca.
5. febrem autem dicit Hipp. à feruore, & igne deducta ap-
pellatione, ut significet febrem quoque ipsam, quæ πυρετός
dicitur ἀπὸ τοῦ πυρός, id est ab igne fuisse nominatam, eāq.
esse febris essentiam, quod calorē igneū habeat, 3. de fract.
& de caus morb. cap. 2.

Febris ab apostomate (quam febrem phlegmonodē vo-
cat, 14. meth. capit. 9.) est cum aliqui, vel ob inflamma-
tionem abortam, abscessum, dolorem, vel erysipelas, vel la-
teris inflammationem, pulmonis, vel alterius partis febrici-
tant; licet veteres eos nō simpliciter febricitare, sed vel
pleuriticos, peripneumonicos, tiencos, simpliciter dicerēt,
4. aphor. 73. Eadē etiam febris accidēs dicitur, si post sen-
sibilem alicuius membri, aduenerit affectum, alioquin æ-
gritudo, & passio censenda est, de differ. morb. capite 5. &
com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris

Febris accidens, vide Febris ab apostemate.

Febris Acmaſtica, Anabatica, Epacmaſtica, Paracmaſtica, Homotena, Gauſon ardens, deurens continua, ἀμαſτικοῦς καὶ ὁμοτόνους, ἀναβατικοῦς καὶ ἑταρμαſτικοῦς, παραρμαſτικοῦς καὶ συνεχῆ Græci vocant, vide Cōtinua febris.

Febris Amphimerina ἀμφιμέριρος, vide Amphimerina febris.

Febris Cathemerina, vide Cathemerina febris.

Febris Colliquatina σωπτήλων τυρετὲς, ex genere eſt februm quas maraſmodes vocant, hoc ſolo tamen differūt, quod quæ portio carnis in his colliquatur, ea ſemper vaporis vice digeritur, in illis, in ventrem deſluit; in ardentiffimis enim febribus, ſi carnes humidæ, ac molles cū adipis copia fuerint, eas ſenſu liquari deprehendas, ſin' ſine adipe & ſicca ſint in maraſmodes febres tranſeūt, in quibus ſicciores carnes redduntur, & corij ritu durantur, nec deſluit vlla ex his ſenſibilis liquatio, 10. meth. 11. idque fit cum corporis humores tenues fuerunt, & febris calor acris; nam euaporantur, qui ita extenuantur, per inſenſibilem euacuationem, 2. de ratione viſt. 47.

Februm confuſio, κράσις, vide Complexio februm ἐμπλοκή.

Febris Diaria, vide Diaria febris.

Febris diurna, & nocturna, quam Græci Cathemerinā & Mathemerinā vocant, eſt febris quotidiana, quæ nocte, vel die remittit quidem, ſed non intermittit, quæ vero remittit, & ad infebricitationem venit Amphimerina dicitur, co. 3. in 1. de mor. vulg. 2. & 9. vide Amphimerina.

Febris Ephemera, vide Ephemera febris.

Febris facta & ſiens, vide Febris ſcetica.

Febris focus, eſt ea animalis particula, quæ prima ſuis ipſius

ipsius solidis partibus immodice fuerit calefacta, quod in Etlica febre primum est Cor, tum Iecur, tum Venter, tandem quacunque possunt secum Cor concalefacere, lib. de Marcore, c. 7. qualis est particula, quam vel obstructio, vel putredo, vel pblegmone obsederit, 11. meth. 20.

Febres Hefticas appellant, quæ solidas animalis partes occuparunt, vel quoniam firmæ, ac solutu difficiles sunt, quemadmodum habitus, aut quoniam ipsum corporis habitum comprehendunt, 1. de diff. febr. c. 7.

Febris Heftica exquisitè est, quæ nullum particularis accessionis, aut principium, aut incrementum, aut vigorem, aut denique remissionem habeat, à solo autem cibo, hefticæ febres efferuescunt, quo incremento ablato, aequales semper perseverant, lib. de marcor. c. 8.

Febris Helodes, quæ & Typhodes, & humida dicitur est, cum à prima iatim die agrotantes sudant. sudoreq. ipso, aut parum, aut nihil leuantur; Econtra sicca, in qua sitis urget uehemens ac scabra visitur lingua, duraq. tanquam Corium cutis, plurimusq. adest in corpore squallor. Aduersus Licum, cap. 2.

Febris hemitritigus, vide Febris Semitertiana.

Febris Hepiala ηπιαλός, de genere est quotidiana, quando simul egri rigent, & febricitant, atque eodem tempore in toto corpore utrumque sentiunt affectum; (& si quidam, eum rigorem, qui febrem antecedit, ita nominant) 2. de diff. febr. cap. 6. quæ & Epialus appellatur, lib. de inæq. intemp. capite 8.

Febris homotena, vide Continua.

Febris horrida, est, in qua magna accessionis pars horrore consumitur, 2. de diff. febr. cap. 8.

Febris humida, vide Febris Helodes.

Febris Hyemalis, ea est apud aliquos, quæ hyeme fit;
apud

apud alios ea, quæ hyemis tempori est peculiaris, 4. rat. vi. 61.

Febres liuidæ, à colore cognomen adepta sunt, ægri. n. cutis tota liuida, & labia qualia ex æsis moris esse solent, & oculorum alba lineſcunt; quæ sanguinem succum deficere nunciant, & cum ipso idem ingentium calidum, atque idcirco mortiferæ sunt, ex quib. nonnulla ſyncopas euacuationem ſequentes, efficiunt, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris lyparia λεπύρια eſt, in qua intus, & in ipsis viſceribus calor ſentitur vrens, ut neque valde ſubtilium veſtimentorum, neque linteolorum velamenta, neque aliud quidquam præter nuditatem ferre poſſint; in externis autem partibus, frigus, aut tepor. lib. de inæquali intemp. c. 8.

Febrē magnam, aut parvam, conſueverunt Medici appellare, non propriè quidem rei quali, nomen quanti accommodantes; hoc tamen facere aſſueti nov in febrib. tantum, ſed in mille alijs rebus quæ tūc in qualitate ſubſiſtant, magna tamen, ac parvæ dicuntur, 1. de diſ. feb. cap. 1.

Febris maraſmodes, eſt febris marcida, in qua omnes corporis partes æqualiter marceſcunt, lib. de marcor. ca 5. vide Maraſmus.

Febris marcida apud Philippum datur, quæ idem eſt ac ex morbo ſenium, ſed eam Galen. non vult febrem dici, cum in ea frigidius quàm natura poſtulat Cor ſit factum, oſtendunt: d. pulſus parvus & rarus redditus, reſpirationo parva tarda. ac per longa intervalla, quæ & ipſa Cordis, & partium ad Cor pertinentium frigiditatem indicat, lib. de marco. ca. 5. Senium igitur ex morbo, quoniam frigiditas ſiccitati adiuncta eſt. febris non eſt; ſed is tantum febris dici poteſt, qui & marcor torridus dicitur, & marcor ſyncopofus; his enim ambobus eſt pulſus frequens, & parvus, ægriq. dum oſcitant ſpiritum efflant calidum, ut iure
ipſum

ipsum ardori, & aestui assimilare possis, qui marcor torridus, ex caliditate, ardentissimisq. febribus, praesertim in sicciore corporis habitu fit; frigidus autem marcor, qui senectutis similem affectionem obtinet, fit ex permutatione febrium, quae tum per aquae frigidae potionem, tum per ea auxilia, quae refrigerandi gratia hypochondrijs, ac Thoracis imponi solent, fuerint secus ac oportet refrigeratq. lib. de marc. cap. 5. vide, Ex egritudine senectus.

Febris Mathemerina, vide Febris diurna.

Febris mitis, est quae medici manum non mordicat, neque exurit, sed vaporem minimè mordacem exhalat. huiusmodi est Diaria febris, mitis autem dicitur non simpliciter quidem, sed per cōparationē. hoc est minus mordax, si quidem febrilis omnis calor, cū sit igneus acer & mordax est, sed hic magis, ille minus; vide Febris simplex.

Febris modos nonnunquam mores vocant, nonnunquā differentias, vel essentias, ut quod febris boni, vel mali moris sit benignus, vel malignus, 1. de morb. vulg. 10.

Febris Pemphigodes πεμφιγώδης est, quae per caloris intensiorem, pustulas in ore, quae Graecis Phlyctides dicuntur, generat, lib. finit. nec hoc solum, sed pemphigodes febres, hoc est spiritibus affluentes interpretamur, sentimus enim plerumque per febricitantium cutes, aerium quendam halitum effluentem. Dicitur itaque Pemphigodes, id est flatulenta, vel flatuosa, sed hanc plerique vario modo interpretati sunt. Quidam diariam febrem intelligunt, natam spiritibus accensis; Alij febrem madentem, & humidam, ab effluio quodam aëroso, & vaporoso, per autem sepius erumpente; alij eam febrem sic vocant, quae voluti exilientium & manui occurrentium scintillarum opinionem prabet; vel ita appellatur pestilens ημετά πεμφιγώδης, id est, quae cum pustulis efflorescit. Quamquam pos-
sit

fit adhuc intelligi synochus non putris, quam ob id inflationem vulgus medicorum vocat, quod sanguinis calore febriliferuentis copia, vena omnes plurimum sint inflata, & sanguine flatuoso, & bulliente, plena. Verum Galenus in eam sententiam inclinavit, ut diaria intelligatur, quæ in spiritibus accensis, & interdum putrescentibus, subsistit, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris pestilens est, quæ a calidioribus ambientis aeris statibus, quales maxime circa Canis ortum contingunt, vel à putrescibili vaporazione effecti, per inspirationem quidem manifestè cor calefacientis, excitatur; qui corpori extrinsecus circumfusi, totum ipsum calidius efficiunt, & præsertim arterias, ut quæ substantiæ ipsius ambientis aliquid trahant; Cum quib. omnibus simul cor affici est necessarium, & cum supra modum incaluerit, ipsum primùm atque potissimùm febrile calorem suscipere, atq. ad uniuersum corpus transmittere, 1. de diff. febr. c. 4. vide Endemus.

Febres putridæ sunt, quæ ex humorum putredine accenduntur, cum rigore, frigore, vel horrore incipientes, in aqua litate pulsuum, & caloris, siue in principio, siue augmento, plurib. paroxysmorum insultibus, acris, & mordaci calore submissione pulsuum, quam systolen vocant, velocitate, urina, cruditate, cuius febris declinationem integra non subsequitur quies, 1. de diff. febr. c. 7. generantur autem à precedentibus causis, non à præincipientibus, quas cumq. n. in ipso animali, vel dispositiones, vel motus præter naturam, egritudinum præcedentes causas nominant, quæ verò extrinsecus adueniunt, & alterant corpus, atq. transmutant naturam vehementes, præincipientes appellant. de caus. morb. c. 2.

Febris putrida intermittens est, quæcumque ad sensibilem in febricitationem peruenit, ortum habens ab humore febrem generante, qui per omnes corporis partes suo motu defer-

tur,

tur, 2. de diff. feb. cap. 1. cuius tres sunt omnes differentiae, quotidiana, tertiana, quartana; quotidiana, quæ ex pituitæ putredine est, ex utriusque verò bilis flava quidem tertiana, nigra autem quartana, 2. de diff. febr. cap. 2.

Febris quartana, vide Febris putrida.

Febris quintana, sextana, septimana, est, cum agri non prorsus affectione morboſa sunt liberati, sed semen aliquod retinuerunt; his usu venit ad victum negligentioribus, sepe sexto die à principio febricitare, saepe septimo, non raro octauo, vel alio; & cum febris cessauerit, putantib; se prorsus esse liberatos, eodem omnino victu utentibus, ex semine morbi reliquo, totidem diebus in eandem affectionem devenientib; similiter febricitare, nō igitur ex vi morbi hic circuitus datur, sed ex residuo affectionis, & inordinato infirmorum victu, com. 2. in 1. de morb. vulg. 7.

Febris quotidiana, vide febris putrida intermittens.

Febris remissio, totum illud tempus est, quod accessionē sequitur, quod tempus ali; interuallum, declinationē, submissionem, vel ablationem nominant. de morb. temp. c. 6.

Febris reuersiva est, nō acuta sed diuturna, imperfectas habens solutiones, quæ postea rursum exoriuntur, & per secundam in abscessu expulsionem integrè soluantur.

Febris sanguinis est febris simplex, in qua sanguis secundum naturam se habens, accenditur quidem, sed nō putrescens generat febrem similem ephemeris quæ ex inflammationibus inguinum accidunt; nam & inguinis inflammatio, ex bono sanguine, sed accenso, fit, 2. de cris. 12. putrescit quidem interdum sanguis, sed ex eo simpliciores sunt febres, quàm ex alijs humoribus, similem verò accessionum proportionem assumunt, qualem tertiana febres ostendunt; Quod si sanguis supra modum aëtur, pars eius subtilior, ac pinguior, in flauam omnino convertitur bilem, quæ au-

tem

tem crassior in atram, ut in carbunculis contingit, in quib. sanguine supra modum effervescente, ad melancholicum humorem fit transmutatio, 2. de dif. febr. cap. 9. quam uidetur reponere in ordinem febrium synocharum non putridarum, in quo genere etiam enumerat febres diarias, 9. meth. 2.

Febris scetica, quæ facile discutitur, opposita febrī hectica, quæ difficile, ut. n. illa fit, ita hæc facta est. 8. meth. 1.

Febris semitertiana, siue Hemitritæus, ἡμιτρίταιος est, quæ ex quotidiana, continua, & tertiana intermittente fit, & confunditur, 2. de dif. febr. c. 7. in qua cum pituita, & flua bilis sibi proportionem respondent, & equipotentes sunt, dicitur Hemitritæus, ibid c. 8.

Febris significatio, quæ Græcè Epifemasia dicitur, est primus insultus accessionis tempus indiuisibile, exactè iam primum, lib. de morb. temp. c. 6. quæ & Annotatio dicitur, 2. aph. 1. uide Insultus.

Febris simplex, clarioris doctrinæ gratia, fugiendo æquiocationem à medico dicitur, quæ à primo statim die, & si acuta est, non tamen supremè, simplicissimaq; & cum turcissimis signis, quam Hippoc. πυρεθόν, id est mitem nominat, seu boni moris, 1. de cris. c. 16.

Febris singultuosa est, in qua ægri singultiendo, rodentem, acerrimumq; humorem uomuerunt, a quo symptoma te non sunt liberati, donec febris in totum soluta sit, uel propè, 4. acutor. 69.

Febres spirituosas quidam nominant (quas Pempbigodes aliter appellant) non ad tactum notitiam referentes, sed ad difficilis anbelitus speciem, in qua magnus creberq; spiritus redditur, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris syncopalis, σινκοπνὴς πυρετός, est in qua aliqui febricitare incipiunt, ubi maximam crudorum succorum copiam,

febricationem peruenit, 2. de cris. 6. vide Synocha.

Febris tabida, vide Marasmus.

Febris Tertianæ exquisita, est ea quæ tertia quoque die accessionē faciens intermittens, cum breui accessionis tempore, cum frigore inuadens, sudore, bilis vomitu, & biliosis excrementis terminatur, à bile putrescente exorsa, cui si aliquid horum deficit, non exquisita, sed simpliciter tertiana dicitur, quod si intermissio sit minor, & accessio longior, dicitur tertiana extensa, 2. de diff feb. 8. & com. 2. in 6. de morb. vulg. 25. vide Febris putrida intermittens.

Febres Tritæophyes, τριταίφεις, hoc est tertianarum naturam referentes sunt, quæ tertio die inualescunt, 2. de diff. feb. cap. 2. vide Tritæophyes febris.

Febris Typhodes, τυφώδης, vide Febris helodus.

Fellis folliculus, est vesica fellis, 5. de loc. aff. 7. vide Cystis, & Choledocos.

Femen, vide Interfemineum, & Perimæon.

Femur, quod & Crus, os magnitudine cunctis animalis ossibus præstat, supra coxendici infratibiæ alligatur, cuius cervici duo sunt exigui processus, quos Trochanteres vocant, quorum exteriorem, qui longe maior est, Gluton, hoc est Natem appellant, lib. de ossib. cap. 21.

Fermentatio, vide Feruor.

Ferina desipientia, vide Desipientia ferina.

Feruor, siue fermentatio, affectus est, ab atrabili proueniens, ubi amplius incaluerit, aut propter putredinem aut febrem phlegmonodem, quam nullum animal, ne ipsi quidem mures gustauerint terra quoque raditur ab ea, ac partes quæ raduntur, omnes in altum attolluntur, 14. meth. c. 9.

Fibræ seu villi sunt tennues quadam, & subtiliores nervorum, & ligamentorum propagines, aponeurosis, & denuationes, quibus tanquam digitis manus, nervi & musculi

actiones suas obeunt, 9. d. vs. p. 2. & 1. de placit. c. 10.

Fibula, uide *Cnimi*.

Ficationes, uide *Sycos* 3.

Ficatum, id est *Iecur*, quod quia omnium animalis partium crassissimum est succi, ac ad coquendum difficile tardeque permeet, propterea macerandi animalis iecur, multarum ficuum siccarum esu preparatur, euaditque illud seipso melius, cum animal ipsum caricas affatim comederit; eaque ratione factum est, ut hanc appellationem sortiretur, 3. de aliment. fac. c. 12.

Ficosus tumor, est tumor in mento natus ex crassiori humore, & serosiori tenuitate, quam *Varus*, 5. de comp. med. loc. cap. 4.

Ficus in oculo, est tuberculum quoddam a crassiori humore oculi partibus affectis adhaerescere, collum modo, hoc est ἐχθιδὴ comm. 3. in 3. de morbo uulg. 48. Græco σὺκα κὶ σὺκα σις, eruptiones, ulceroſæ sunt, rotundæ, subduræ, rubicundæ, quas dolor comitatur; fit hoc malum magna ex parte in capite, sed & reliquo etiam corpore, fit etenim in ano, & *Marrisca* dicitur, in palpebris adhuc fit, & dicitur etiam σὺκα σις, quod scilicet ficus granorum referat similitudinem, unde de ficosam appellant palpebram.

Fistula Σὺρις, est angustus & longus sinus, lib. de tumor. c. 5. per translationem dictus à musicis instrumentis, quæ oblonga obtinent caua, & fistula nominatur, 2. progn. 64.

Fistula Urinaria quæ *Urethra* dicitur Græce, est meatus urinae reddendæ accommodatus, qui in pene est, quarto aphorif. 76.

Fistulosus, seu flatuosus uernus, uide *Cavernosum*.

Flatuosus morbus, uide *Hypochondriacus*.

Flatuosus spiritus qui & *Flatus* dicitur, tumorem excitans flatuosum, crassus ac uaporosus est uapor, non ethereus atque

atque tenuis, ille enim aeri, qui Astrinis constitutionibus fit, hic verò, qui Aquilonaribus regnat, assimilatur; estq. hic is, qui in nobis secundum naturam est, spiritus, hic conservandus, ille ut qui crassus est, extenuandus, 2. ad Glaucon. sexto.

Flaua bilis, vide Amara.

Flexus variciformis, est plexus ille venarum, et arteriarum in testi. multipliciter flexarum, in cuius primis flexuum partibus sanguinem synceum continent, qui certè in ultimis flexibus ad ipsos testiculos non amplius ruber, plandè est, sed iam quodam modo albicat succus is, qui in ipsis continetur, exiguum adhuc requirens ad perfectam substantię seminis generationem, quod ei à testiculis ipsis accedit, 9. de usup. c. 4. vide Glandulosi assistentes.

Fluctuatio cum sonitu Græcè κλύδων, symptoma est facultatis concoctricis. & retentricis, completentis alimentum. sed quæ illud sufficienter concoquere non potest; unde eò diutius in eorum ventre, grauitas ex alimento manet, quo tardius concoquitur, præsertim cum nihil in eo continetur, quod verti in flatum possit, aut cum ventriculus vehementer fuerit perfrigeratus.

Fluxio quædam est apparentium inflammationum causa, quæ non admodum occulta est nisi quandoque illis coniungatur, quæ aliqua alia ex causa, euidenter facilius videntur; quandoque enim nulla ex his præcedente, mēbrum confestim patitur inflammationem, ea quæ hanc passionem generat, Rheuma, id est, fluxio vocatur, ipsa verò passio, dispositio Rheumatica, 2. ad Glaucon. 2. Fluxio adhuc simpliciter dicitur, pilorum defluuium, quod tabescentibus magna ex parte, atque ex diuturno morbo conualescentibus, euenit lib. finit.

Fluxiones ventris, vocat Hippocr. cum, & semper, &
k 2 assidue

affidue humida deliciuntur excrementa, sine tenefmo, & liē seria, 1. de morb. vulg. 36.

Fluxus est tenuiū humorum delatio, quam cohibere ne queas, non ex nostra voluntate proveniens, lib. finit.

Fluxus hepaticus is est, in quo ob imbecillitatem hepatis, alui sedimina, aqua in qua nuper macinata caro abluta est, redduntur simillima, 5. de loc. aff. 7.

Fluxus muliebris, est sanguinis ex utero profluvium, 9. simplic.

Focile maius, & minus, vide Cubitum.

Focus febris, vide Febris focus.

Fœtus ab Hippoc. vocatur, ubi semen in uterum iniectum sanguine repletum fuerit, & Cor, et Cerebrum, & Iecur indistinctam quidem adhuc, & informem quandam, coagulationem, & magnitudinem alicuius momenti presertulerint, carneaq. appareat fœtus substantia, & non amplius seminalis, unde neque genituram amplius talem formam appellat Hipp. sed fœtum, 1. de sem. cap. 9.

Folliculus fellis, vide Fellis folliculus.

Fomenta, & fatus, sunt qui per spongas calida aqua de coctionis alicuius simplicis imbutas, & expressas, alicui corporis parti fiunt, 2. de loc. aff. 1.

Foramen cœcū, id est auditorius meatus, vide auditorius meatus, & Cæcum foramen; Cæcum verò dicitur, nō quod tenera cæcum sit, sed ob flexuosam meatus obliquitatē quæ causa est cur funiculum, aut setam porcinam in ipsū foramen dimissam, transmittere non possis, 9. & 11. de usu p.

Foraminulenta ossa, vide Cauernosa.

Foratio est, qua utimur in fracturis Capitis, cum usque ad Cerebri membranas, Caluariam dividimus, 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Formatrix uirtus est, quæ iactō in uterum semine; sine inter-

in terram, statis in quibusdam temporibus multas conflat partes eius quæ gignitur, quæ est optima, & summa ars, quæ omnia alicuius gratia molitur, sic ut nihil otiosum sit, aut superuacaneum, 1. de natur. fac. cap. 6.

Formica, quæ & Myrmecia, & sessilis verruca dicitur, 2. meth. 2. uide Myrmetica.

Formicans pulsus, uide Vermiculans.

Fornices seu testudines, quas Græci Psallidas ψαλλιδæ uocant, est forma, & figura concava, figurarum omnium ad patiendum difficillima, qua forma, multa ædificia configurantur, ad cuius similitudinem, pars Cerebri efformatur, 11. de usupar. c. 15. uide Camarion.

Fauæola est canum ulcus, ac paruum in nigro oculi, lib finit.

Fractura, uide Unionis solutio, & Rhegma.

Fractura Caulatim facta, uide Abductio.

Friccio (quæ τριψις) sicca est, cum corpus uniuersum solis manibus uel linteolo, nullo admisto, aut humido aut pingui corpore, fricatur; cui opponitur friccio humida, quæ fit per aquam, & olei admistionem; ubi enim cum oleo aqua confunditur, haud facile solubili mistione coit, ut quibus ita corporibus inungatur oleum, necesse sit, & plusculum inhaerere aquam: sola enim aqua quæ foris circumfunditur, facile defluit, & quæ in poros ingressa corporis, nullam habens ansam, promptè effluit, nisi oleum admisceatur, 3. simplic. cap. 25.

Frigus χεῖμς, non eodem modo in sanis, & agris sumitur; in agrotantibus enim aliud est frigere, aliud horrere, aliud algere; sepe enim accessionis insultus cum rigore, alteri cum horrore, alteri cum sola frigiditate suboritur: Ita ut cum quis cum nulla concussione, & agitatione corporis perfrigit/cit, nec corpus, nec omnino cutis inæqualiter, & præter uoluntatem moueatur, perfrictio di-

k 3 citur

citur, non hic tamen riget nisi motum concussionis inequalem, & cutis, & totius corporis sentiat, isq. Rigor $\pi\acute{\iota}\gamma\sigma\varsigma$, dicitur; si autem cutem quidem perturbet, & per quosdam insultus quatiat, corpus autem totum non commoveat, Horror & Horripilatio, Græci $\epsilon\pi\iota\kappa\eta$ nominatur, ut hic affectus solius cutis talis ex: fiat, qualis totius corporis Rigor, lib. de Trem. palp. cap. 6.

Frons, Μέτωπον , est pars faciei supra oculos sita & ad tempora usque protensa, substantia musculosa, & osse subiecto (quod Coronale vocant) consistans, superposita supercilijs, pilis nuda, inter utramque aurem sita. Introd. c. 10.

Fugaces fructus, qui & Horarij & Horæ dicuntur sunt qui nascuntur eo tempore, quod Horam vocant; Est autem Hora Græcis id anni tempus, in cuius medio Caniculam exoriri contingit; Tempus autem id est dierum quadraginta. quo tempore Horarij fructus constant, nuntiij iam declinantes, alij incipientes, alij in suo vigore, aut ultra vigorem, aut citra consistentes; Vocant autem ipsos horarios, non quod id solum temporis sint, sed (ut mea fuit opinio) quod ipsos ab his qui ad reponendum sunt idonei, distinguant quando, et triticum & bordentem semina cerealia, & omnia quæ æstivam, atque annuæ sariam habet generationem. sed non cito corrumpantur; quo modo, cucurbitæ mora. pepones, melopepones, persica, & alia id genus; quæ si quis in hyemem servare volens, ex siccata reposuerit, eo etiam modo veterem naturam, in contrarium imitabunt, 2. de aliment. fac. c. 2.

Fuliginosus vapor, qui ex deustione assatorum eleuatur, lib. de usu puls. 7.

Fuligo, vide Fumus.

Fumus, & fuligo, vapores sunt qui eleuantur, ille quidem ex materijs seministis, hic verò ex immodicè assis. vtilisq. Est namque fuligo, vapor terrestris. fumus, mistio quadam ex terre-

terreſtri. aqueaq. ſubſtantia, 8. meth. 5. utrūque enim materia aduſtum excrementū, quod in ſubl me fertur, ſignificat, non ſecus in febris fuliginosum excrementum, exſpiratione, & contractione arteriarum, natura expellit, 3. de praſag. expulſ. cap. 7.

Fulua, vide Dichroma.

Funis brachij vena eſt, pars vene humeralis, qua protenditur, ſecundū diuerſas adiutorii. i. eſſis humeri partes lib. de anat. viu. & de ratione cur. per ſang. cap. 16.

Fungos vocant craſſas paltebrarū emenuias, cōmen. in 3. de morb. vulg. 49.

Furcula ſuperior, & inferior, vide Claues.

Furfuratio, quę & furfur, & πυττα, eſt cum quibuſdam ſe ſcalpentibus ſurfuribus ſimilia, ex capitis cute decidunt, à vitiatſis ſaniebus prouenientia, 1. de cūmp. med. loc. 6. quę & Pityriasis dicitur.

Furor, vide Melancholia.

Furor ἐρωτικὸς amatorius, qui ex amore fit, perinde atque is qui ex Muſis ποτετικὸς dicitur.

Furunculi, Dothiernes, Δοθιῆες d. ἔτι, tumores ſunt præter naturam, ex ſimilibus humoribus quibus Vari. geniti, per vniuerſum corpus, qui duplices ſunt, aliqui ut ita dixerim, varoſi, duri, & egre concētiles: aliqui inflammati, in quibus aliquando etiam febres conſiſtunt, & tumor in magnitudinem excreſcit, & in puſt tranſmutatur, 5. de comp. med. loc. cap. 7. Eſtq. furunculus mitis quidem, cum in ipſa ſola cute conſtituitur, malignus verò cum aliē exoritur, Phymati id eſt tuberculo ſimiſis, à quo ſola duritie differt, lib. de tumoribus, cap. 15.

Fuſaneus morbus eſt, qui omni loco, & tempore fit, libr. finit.

G

GALIANCONAS, vide Ancos.

Gangilia γάγγλιον, quæ Auic. & Paulus vocant glândulas, apostemata sunt glandulosa, sicut auellana, & nux, & aliquando minus sæpeq. accidunt super manus, & frontem, quæ si comprimantur, digitos effugiunt, tum redeunt, & aliquando multiplicantur, sæpeq. cum impositione, & forti alligatione lamina plumbea curantur, & discutuntur, quas etiam Contractiones vocat Gal. 5. de comp. med. per gen. cap. 7. Paul. lib. 4. cap. 14. vocantur etiam, & Gāgilgia quasi concretiones, & contortiones quadam, ex lento & mucoso humore accrescente, & conglomerato quod proprium nervorum alimentum est, 2. de art. 56.

Gangrena γάγγραινα, est alicuius membri mortificatio, ex magnitudine inflammationis, quæ iam fit, non quæ facta est, 2. ad Glauc. 9. nam cum omnino membrum effectū est demortuum, ut punctum, vel sectum, vel usum non sentiat quæ patitur statim rescindere oportet, quæ sanam partem vicinam attingit, sed quod ita effectū est denigratur, quod verò in medio est constitutum, ita ut tendat ad mortificationem, Gangrena nominatur, ibidem, vide Syderatio. Adhuc Hipp. Gangrenas, emortuarum venarum torporem nominat, qui ex nimia inflammatione consequitur, 2. de fract. 24.

Gargareon, sine Gurgulio, Cion, Columna, Gurgulio, est ea gutturis pars, quæ Faucibus adiacet, cum secundum naturam se habet; cum autē morbo afficitur, ita ut eius extremitas phlegmone laboret, fit similis Acino vugæ, & dicitur Vua; quando tota Cion, Columna, quando verò fit, dicitur Himas, Γαργαρεὼν, σαφύλη κίων κιονίς, & Γμάς, 4. de loc. aff. cap. 3.

c. 3. quod quia ad vocis modulationem fit, ideo a quibusdam pleetrum, *πλετρον*, i. vocis refractorium appellatur, 7. de usu par. cap. 5. Hanc eandem partem, Columellam, Staphilem, & carnosam particulam summo ore dependentem vocant, 6. de com. loc. cap. 3. vide Columella, Pharynx, Staphyle, Epiglottis.

Gastrocnemion est posterior carnosae Tibiæ pars seu tibia vëter (ut anterior tibiæ pars carnis expers, dicitur Anticnemion, *αντικνημιον*.) Græce *Γαστροκνημιόν καὶ Γαστροκνημὶ*, Sura appellatur, lib. de musc. diss. cap. 32. & 2. de anatom. adm. cap. 4. vide Sura.

Gastrorophia, i. abdominis futura, 5. de anat. adm. c. 6.

Gemelli, vide Nates Cerebri.

Gene *γένους*, faciei pars sunt, quæ inter nasum & aures sitæ sunt, quæ bene coloratis, & ingenuis, pudore suffusis, rubent, quæ & Male dicuntur, Introd. cap. 10.

Genion, vide Mentum, lib. de musc. diss. cap. 2. vide Mentum.

Genitalis meatus, quem varicosum assistentem vocant, maxima illa via est, quæ genituram a testibus hausam, ad Colis radicem defert, 1. de semin. c. 15.

Genituram appellat Hippoc. illud quod in abortu, vel dissectione uteri, seminis speciem representat, non animal constitutum, quod primis duobus mensibus solet accidere, quo tempore neque fætum, neque embryon vocat, sed genituram, 1. de sem. cap. 9. genituram adhuc aliquando appellat, membra genitalia, in fæminis uterum, in maribus seminaria vasa quæ nuncupantur, 3. de art. 41. vide Cyema, frequentius autem genitura sumitur pro semine recenter emisso, vel in suis vasis contento, Græce *γόνι*, Hipp. lib. de natura pueri.

Genu, Græce *γόνυ*, est femoris & Tibiæ dearticulatio,

in

in qua sinus est quidam prominens, alterius caput excipiens, quod anteriori parte quo firmitus fieret Rotulâ, seu patellâ munivit, quam μέλλω, & ἰπιγοτάτιδα, vocant, quæ prohibet, ne femur curuatis, aut per decliuia currentibus loco excidat, & dilabatur, lib. de ossib. cap. 21. & 22. & lib. Introd. c. 10.

Gerocomica, γηροκομικὴ, est ea medicinæ pars quæ senes regit, de part. medic. cap. 5. incertum an ad ὀγυιῶν, an ad Θεραπευτικὴν, pertineat, cum senum corpus, neutrum sit, plures tamen eam salubris medicinæ partem esse statuunt.

Gibba Hepatis, vide Sima.

Gibborositas, quæ Græcis Κυφωσις, dicitur, est distortio spina in posteriorem partem, 3. de artic. 2. vide (γυψosis, & Incuruatio.

Gibbus est, ubi inter distractas uertebras, uel una, uel plures idasæ permanserint, sic affl. s gibbus accidere solet; ubi enim unica dumtaxat uertebra, aut etiam duæ aut tres, sese deinceps consequentes distrahuntur, ea parte spinam cauari contingit, 4. de loc. aff. 5.

Gilua emplastrâ, vide Dichroma.

Gingiuæ Οὐλα: carnes sunt, quæ sunt circa dentes, 9. de usu par. cap. 15. ubi primum è locellis emergunt, 5. de cõp. med. loc. cap. 8.

Ginglymos species est Diarthroseos, qua ossa sese inuicem ingredientia, coniunguntur, ut uertebræ inter se, ac cubitus, humerusq. alligantur, lib. de ossib. in præm.

Glabrities, vide Madarosis.

Glacialis humor, vide Crystallinus.

Glandium, vide Thymus.

Glans est finis, & extrema totius Colis pars, cuius cutis quæ eam uestit, præputium dicitur, 5. meth. c. 13. Aristoteles

les verò 1. de hist. animal. cap. 13. dicit cutem, quæ Glandem integrit, carere nomine, & totum quod ex ea cute, glandeq. constat, præputium appellat. Dicitur etiam in alio significato glans, suppositorium, quod clysteris loco sedi infunditur, 6. de comp. med. loc. cap. 3.

Glandula, corpus quoddam carniforme est, quod utique velut cunei quidam, uasorum diuisionibus incubantes, fulcimentum ipsis suggerunt, ut à nullo violento casu afficiantur, 4. de usu par. cap. 20. glandulam etiam suppositorium vocat, com. 2, in 1 prorrhæ. 6. glandulam etiam Thymum dicunt, 3. de alim. facult. cap. 6 sunt autem glandulæ, quas etiam Adenes vocant, imbecilliores corporis partes, ad quas ualentiores corporis partes, superuacua sibi tum quantitate, tum qualitate, & præsertim ad eas, quæ rariores natura sunt, transmittunt, quippe ualentius est arteriarum, uenarum, neruorum, musculorum robur, imbecillius autem, aut prorsus nullum corporum, quæ glandularum sunt nature, 13. meth. cap. 5.

Glandulæ laryngis sunt corpora laxiora, & fungosiora cæteris glandulis. laryngi utrinque adiacentes factæ à natura, ut partes omnes, quæ tum ad laryngem, tum ad fauces. pertinent, humore perfunderent, 7. de usu par. 17.

Glandulosi assistentes, uel astites, uel parastatæ, uasa seminaria, uasa spasmatica, plexus seu flexus variciformis (plexus Capreolaris, & Hederarius, 1. de sem. c. 12. homonyma sunt, significantia duo uasa, uenam scilicet cui subiacet arteria, utraque flexus multos numero æquales, instar Capreolorum quorundam, uariè complexorum efficientia, quo implexus sanguis, & spiritus, qui ad testes feruntur, diutissime coquuntur, in quibus semen elaboratur, qui flexus postremi in testes terminantur, qui in testibus, ut qui laxi, & cavernosi sunt, chymum, qui in uasis

vasis ceptus erat concoqui, excipientes, rursus conquunt, donec perfectam seminis formam induxerint; idemq. per aliud vas, quod ad pudendum porrigitur, semen eiacularantur, (quod varicosum assistentem uocant, 1. de sem. 15. vulgus vasa deferentia, ut priora, vasa preparantia appellat) quod vas spermaticum maribus latum & longum, feminis angustum & breue natura concessit, 14. de usu p. 10. & 11.

Glandulosa corpora, quæ primus Herophilus, ἀδνοειδεις προστάδες, quasi glandulosos præsidēs, aut prostatae appellauit, utraque parte colli vesicæ sunt locata, in quibus humor quidam spermatis similis, verum longè tenuior continetur, qui in coitu repente, ac simul unda cum semine elabatur, reliquo autem tempore omni paulatim, eoq. sensu non deprehenditur; cuius usus est, ut ad uenerium coitum excitet, & in coitu delectet, denique quod crassus is ac viscosus instar olei meatum urinarium humectet, & inungat aduersus urinae rosionem, & ne exsiccatus considerat, prohibeatq. quo minus per se lotium ac semen facile feratur; in masculis glandes hæc notabilis magnitudinis sunt. 14. de usu par. & 1. de semin.

Glaucosis, γλαύκωσις, glaucedo est oculorum affectus, qui ex immodica siccitate, uel cōcretionē humoris crystal lini, uel ex largiori eius euacuatione, quæ fit in computationibus solet progigni, quiq. cæcitatem præ omnib. maxime qui oculis accidunt morbis, inferre solet, 10. de usu par. cap. 6. Glaucoma uero τλαύκωμα est naturalium humorum, in glaucum colorem mutatio. lib. finit. diciturq. id oculi uitium quod orta prius suffusione, & humore circa ea pupillam ualde concreto, & resiccato contractum est, unde Glaucedo à siccitate est, ut glaucoma ab humiditate, & propterea Gal. 3. aph. 31. dicit Glaucoma speciem esse

ὁπρὸς ὑμᾶτος, id est suffusionis, non tamen docet esse eundem morbum, differt enim suffusio, tum à Glacéine; tum à Glaucomate; est enim suffusio extranei humoris, & aliunde influentis concretio; glaucedo verò ipsius humoris crystallini, densatio, & resiccatio; Nec omnes suffusiones tantæ sunt, ut toti pupillæ prætendantur, & uisum ex toto adimant; Glaucoma uerò crystallini uniuersi est, atque siccitas per ipsum totum ex æquo diffusa, & ex siccitate concretio. Ad hæc pleræque suffusiones curationem recipiunt, cum tamen nullum glaucoma curetur, uti nullus alius morbus ab immodica siccitate proueniens.

Glaucedo, vide Glaucofis.

Glaucoma, vide Glaucofis.

Glène est id, quod in superficie extremi ossis situm est, ab ocularis sinus similitudine, sic dicta, lib. de ossibus. in præm. vide Articulus.

Glenoides, sunt duo sinus leniter caui, in inferiore summa uertebre parte, quos ab ocularis sinus similitudine sic appellant, similes superioribus; sed sinus superiores, cum caput ipsum excipiant, non ab re sunt maiores, infra uerò minores sunt, qui uertebam secundam admittunt, lib. de ossib. cap. 8.

Glossocomion, quod & Glottocomion dicitur, machina quædam est, in qua extenduntur, & uinciuntur fracta membra laqueis, ad iustam eorundem distentionem, 7. de usu p. cap. 14.

Glutia, Græce γλοῦτια, id est paruæ nates, sunt tenues, ac prælongæ Cerebri eminētis, ex utraque parte illius meatus, qui spiritum ex medio Cerebri ventriculo, in Parencephalidis uentriculum transmittit, quarum concursus, hominū coniunctis inter se femoribus, quæ nates vocant, rectissime comparaueris; sunt autem qui Didymis hoc est

testi-

testiculis ea assimilantes, malunt vocare Didymia, quæ verò his proxima glutia, 9. de usu par. c. 14.

Glutinatorum medicamentum, quod & sanguinarium, & cruentis opitulans, & enamon dicitur, est quod vulneris oras committere, & glutinare molitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Gluton, hoc est Natem appellant, alterum ex duobus processibus cervicis, ossis femoris, qui maior, & exterior, & gibbus est, lib. de ossib. cap. 21. vide Femur.

Glycea medicamenta sunt, quæ aliquando purgant, & interdum acres humores indulcant, lib. de Dynamid. in proæmio.

Gnaton, vide Ethmyodes platysma.

Gomphos, affectus oculi est, qui latine dicitur Clavus, cum pupilla egrediens pelliculas Vues, superficie tenus operit, unde eius forma sit quasi Clavus, lib. de ocul. c. 11. vide Clavus.

Gomphosis, Synarthroseos species est, cum ad instar clavios ossi infigitur, vel cum quippiam penitus est infixum, ut ne tantillum quidem (veluti dentes suis alveolis) dimoveatur, lib. de ossib. in proæmio.

Gonorrhœa est seminis inuita, & assidua excretio coles non extenso, Gonorrhœa autem nomen plane compositum est, quasi seminis genitalis fluor, ob imbecillitatem continentium ipsum corporum, 6. de loc. aff. 6.

Gracilis, siue tenuis pulsus est, in quo longitudinis dimensio, quodammodo duabus reliquis præstat, in quo autem dug reliquæ hac, turgidus siue crassus appellatur, 1. de diff. puls. cap. 5.

Grando, est tumor crassus, in partibus interioribus palpebrarum coagulatus, ut quasi grandio videatur, lib. de ocul. cap. 9.

Græ-

Graphioides, aut *Belenoides* processus, id est graphio, seu stylo & acui similes, qui & styloides dicuntur, à Columne specie, qui partibus his sunt, tenues ossium capitis processus, appellitāt, 10. de usu par. ca. 4. Adhuc graphioides, & styloides processus est Cubiti processus, quem è directo parui digiti porrectum. à graphii, seu styli modo, Graeci dissectores, sic vocant, 1. de anat. adm. cap. 10.

Grauius dolor, vide *Dolor tristis*.

Grauedo, siue *Coryza* est tenuis & incoctus humor, qui per nares secernitur, 2. progn. 49. quem docet non esse pituita speciem, ut quidam falsò asserunt, sed excrementum, quod a Cerebro distillat, quod & mucum & *Coryzam* vocat, qui frigidus, & humidus succus est, qui tum in senibus, tum ijs, qui ratione quavis sunt perfrigerati, plurimus acervatur, quem quidam phlegma vocāt, 2. de natural. fac. cap. 6. vide *Coryza*.

Graecolentia, vide *Beneolentia*.

Grauis, seu *gravius dolor*, vide *Dolor tristis*.

Gressuram γλίσχρα, vocat Hippo. totum id, quod inter inguina utriusque cruris est, cuius mediam partem παρβάιον nuncupat, hoc est interfemineum, eò quod duobus feminibus interiacet, quæ est intercapedo quæ ab exortu pudendi, usque ad anum pertinet, ubi etiam vesicæ collum, collocatum est, 4. de art. 45.

Grumus Græce θρῦμβος, est concretus sanguis, lib. de atrabile, cap. 2. estq. aggregata concretio sensibilis sanguinis, lib. de tumor. cap. 2.

Guidex venæ, vide *Apopleticæ*.

Gula, vide *Oesophagus*.

Gurgulion, vide *Staphyle*, & *Gargareon*.

Guttur, vide *Larynx*.

Gutturosos, i. γλίσχιδες, quasi guttureminulos vocat.

eat Hippoc. eos, qui prominentia in anteriorem partem, guttura habent: guttur enim, id est, *βρόγχον*, vel totam asperam arteriam nominat, vel fauces tantum, 3. de art. 8.

Gynæciæ, i. mulierum passiones, lib. de Gynæcijs.

Gynæcomaston, id est muliebris mammae; & subiecta mammis pinguedinis auctio est, præter naturam, lib. finit. *γυναικμαστόν*, muliebrium mammarum summum incrementum; unde τὰ *γυναικῆα*, id est muliebria, seu menstrua purgationes.

H

HABITVS est partium nostri corporis structura, & compositio, qua ratione dicimus huius corpus esse raram texturem, quapropter facile euaporatur, & syncopem incurrit, huius verò densioris, atque ob id in morbis cunctari, diutiusq. trahere, 2. de ratione vict. 43. habitus nomine in omni re uti solemus, quæ constans est, egeq; amouetur, unde & sanitatem bonam habitudinem dicimus, li. de bona habitudine, & 4. de rat. vict. 25.

Hederarius flexus, vide Glandulosi assistentes.

Hæmalopa, est oboriens cruenta suffusio ad plagas oculi illatas, 4. de comp. med. loc. cap. 8. estq. jugillatim in oculis, ex plaga, aut ictu, effusio, sub contusum locum, sanguine. Unde Archygenes dicebat idẽ malum esse cū Hyposphagmate, atque etiam in omni alia corporis parte posse contingere, præterquam in oculo.

Hæmatosis, id est, sanguificatio, vide Hepar, & Sanguificatio.

Hæmodia est affectus quidam, qui dentes, gingiuasq. infestare solet, cum quispiam & austeros, & acidos cibos ingesserit, quo dentes stupent, 2. de loc. aff. 6.

Hæ-

Hæmophonus, id est, sanguinis mittendi timidus, *Smetib. 5. vide Pſychrophonus.*

Hæmoptoicus is est, qui sanguinem sputo eijcit, *lib. 7. de comp. med. loc. cap. 4. siue uomēdo, siue tussiendo siue screādo, siue simpliciter exspuendo reijciatur, 4. de loc. aff. 5.*

Hæmorrhagia, id est sanguinis eruptio, & abundans effusio, quæ si per magnum vulnus fiat, per largum obitur fluxum, sin' angustum per iaculationem, ut in venis secandis. Differt autem hæmorrhagia, ab hæmori hoide, quod illa sit abundans effusio sanguinis, hic verò delatio sanguinis per dissultationem, ac paulatim facta, ut quæ ut plurimū per uasorum erosionem fiat, *lib. de finit. Vnde hæmorrhoidas, sanguifluas venas, in ano existentes appellant, 4. de artic. 40.*

Hæmorrhoides, vide hæmorrhagia.

Halituosa sūt quæcumque per cutem foras effluere apta sunt, humida quæ per vesicam; sicca quæ per aluum, quippe à vincenti in singulis eorum substantia, nomina ipsis imponuntur; *Contraria halituosis, & diureticis dicuntur, Emplattomena quæ exiguis meatibus cutis, & vesicæ inbærentia, ea detinent, quæ per cutim, & urinas expurgantur; quæ verò opponuntur solutiuis, dicuntur stryphna, quod ualenter adstringant, 8. meth. 2.*

Halituosus spiritus est alicuius corporis partis humiditas, quæ ad summum concocta, in tenuem halitum, uirtute insiti & ualidi caloris soluta, insensibili transpiratione in ambientem effluit qui halituosus spiritus in animalis corpore ex succis, qui lente sensimq. excalescunt, nascitur; ubi uero calor imbecillior est, uel naturalis humor, tum semicoctus, tum crassus tum glutinosus atque particula densior, ibi crassior excitatur halitus, quàm ut transpirare possit, *14. meth. cap. 7.*

Harmonia in ossibus, species Diarthroseos est, in qua ossium structura, per simplicem lineam fit. sunt autem nō nulla maxillę superioris, & quadam etiā Capitis ossa, ad hūc modum inter se iuncta, lib. de ossib. in præmio.

Hebetudo visus, quę & offuscatio visus nominatur, est summa offensio visionis, sine causa manifesta, lib. 7. introd. c. 15. Greci vocant ἀμασπασiv Arabes guttam serenam, differtq. ab Ambliopia ἀμβλιώπια, in eo quod magis, vel minus, in hac enim minus lęditur visio, quā in Ambliopia.

Hectica febris, duplicem habet significationem, una quidem dicitur, omnis febris soluta difficultis, siue sit pituitosa, siue melancholica, opposita est τίσκητικῇ, hoc est febris soluta facili. Altera verò significatione, speciatim magis dicitur, quę & putridę, & diarię opposita sit, diciturq. hectica, quod in habitu corporis ἱξiv appellant, tamquam in subiecto consistat; est enim hectica febris, calor præter naturam in solidis partibus accensus, vide Febris hectica.

Hecticus pulsus, ita ut febris vocatur, qui non magne preter illo modo variat, ceterum manet in perpetuum similis, coheretq. nec soluitur unquam, quod totus habitus morbum induit, in eiusmodi febribus, & pulsibus, lib. de pulsib. ad Tyrōnes cap. 8.

Hecticus spiritus, qui opponitur naturali, & animali, lapidesq. continet, & in uniuerso corpore versatur, quiq. solidis corporis partibus, ex quibus compos. tus est, nec diuisis, nec condensatis nec è loco suo motis conseruatur, resoluitur autem spiritibus intensis, ut in phreniticis, vel dissolutis, ut in lethargicis, vel ijs, qui cardiaco affectu laborant. lib. Introd. cap. 13.

Hedra, sedes, anus, podex, dicitur & Græcis alio nomine δακτυλῖς, & πρῶκτις, est autem meatus ventris inferior, continendis, transmittendisq. excrementis destinatus.

tus. Adhuc Hedra apud Hipp. l. b. de vulneribus Capitis, est ossis fractura species talis, ut in eo teli vestigium remaneat, atque appareat, qua telum infederit, Hipp. lib. de vulneribus Capitis.

Hedysma, id est unguentum edoratum, 1. de comp. med. loc. cap. 2.

Hegemonica virtutes sunt reſtrices, & animales, quæ in Capite collocantur, quæq. sunt imaginatrix, ratiocinatrix, & recordatrix, lib. de sympt. diff. cap. 3.

Helcydria, id est pustula ulcerose in capite genita, 1. de comp. med. loc. cap. 9.

Heliosis, Ηλιωσις, insolatio, est corporis in sole apricatio, Remedii genus est veteribus medicis usurpatum variis modis, quo alij ad solem eiusq. radios exponebantur, siue stantes, siue ambulantes. siue iacentes, quo remedio promissa per alium evacuatione iuvabantur Hydropici, Ischiadici, Nephritici, Paralytici, Elephantici, Caliaci, Hysterica mulieres, & alba uteri fluxione laborantes, & Cephalalgici, ubi ex eo auxilio, corporis perspiratione uberiolem, sudores, alui adstrictionem, adipis consumptionem, tumorum laxorum, tum maxime hydropicorum detumescentiam facilem respirationem, omnisq. superflui humoris absorptionem fuissent consequuti.

Helos, siue Clavus, est callosum tuberculum, album, rotundum, capiti clavorum simile. toto corpore proveniens, sed pedum plantis, digitisq. potissimum, & calcaneis, accidit, & oculis. sed vide Clavus.

Helodes febris, vide Febris helodes.

Helosis, est curva ac reflexa palpebræ eversio, utroq. oculi muscutorum convulso, part. mq. Tarsi sibi continuâ, ad se ipsum trahente, quod in magnis morbis magnum malum significat, quam palpebrarum contorsionem Hipp. vo-

cat Campylon, 10. de usu par. cap. 9.

Helminthes, uide Elminthes.

Hemitriticos febris, ἡμιτρίταις, πυρετός, semitertiana febris, uide Febris semitertiana.

Hemicrania affectio est dolorosa, circa dimidiam capitis partem, aliquando dexteram, aliquando sinistram, quae iuxta suturam sagittalem terminatur, & ut plurimum per circuitum exacerbatur, plerisque circa temporum musculos dolentibus, quibusdam in uertice capitis, quidam uero adeo uehementer dolent, ut ne manuum contactum facile ferant, in quibus pellicula Caluam ambiens, laesa est, diciturq. aliquando heteropcrania, Græc. ἡμικράνια. ἑτεροκράνια, 2. de comp. med. loc. cap. 3. Estq. & aliud hemicrania genus, quod Sphacelodes nominant, estq. conuulsorius dimidiæ partis capitis dolor, 2. de loc. aff. 7.

Hemiplexia, ἡμιπλῆξια, Paraplegiam significat, uide Paraplegia.

Hepar, quod & Iecur, est membrum princeps in dextro thoracis latere collocatum, uenarum omnium principium, & primum sanguificationis, quam hēmatosim uocant, officina, & instrumentum uenarum omnium, & nutrientis uirtutis principium, 4. de usu par. cap. 12.

Hepatica uena, uide Axillaris.

Hepaticus affectus, (q. & hepatitis nominatur, de symp. diff. 5.) est Iecoris imbecillitas citra phlegmonem, cū nutrimentum per uasa quæ in mesenterio sunt, ueluti per ora quedam semicoctum attraxit, rursusq. per eadem semicoctum ablegat in intestina; estq. hæc excretionis species, maxime similis loturæ carniū cruentarum, ac recenter excretarum, siue id quod excretum est, aquosum sanguinem dicat; Atque hoc quidem symptoma semicoctorum ciborum, dispositioni in uētriculo ad portionē se habet, 3. de sym. caus. cap. 2.

cap. 2. Eos igitur qui sic affecti sunt, quibus uisceris ipsius uires fuerint imbecillę, hepaticos uocat, affectumq. hunc, hepaticum fluxum, aliū à Dysenteria facit, 5. de loc. aff. 7. Affectio igitur hepatica appellata, ueluti etiam & Celiacā, & Stomachicā, citra tumores præter naturā, circa ipsas partes cōtingit; inflammatum enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut induratum esse medici dicunt, aut aliud quippiam tale, non tamen hepaticum uocant hominem ipsū, cui tale quid accidit, 8. de compositio. med. loc. capite 6.

Hepiala febris, ἡπιαλὰ & πυρετὸς, uide Febris hepiala.

Hepsema, id est Sapa, uide Apothermon.

Herculeus morbus, uide Comitialis.

Hermaphroditus, cōplexus est masculini sexus; et femini, simul ēt utroque genitali proprium obtinente, lib. finit.

Hernias, uide Ramex, & Celas.

Herpes, qui & Serpigo nominatur, id est repens, inflammatio est ex syncera flaua bile, sui seruante naturam; quę si cum sanguine per totum corpus deferatur, morbum facit, qui Icteros, id est Regius appellatur; sola uerò quando secreta est, & in aliquo membro consistit, Herpes uocatur, quę si crassa sit, totam exulcerans cutem, usque ad suppositam carnem; Herpes exedens, siue Esthiomenon, siue Phagedanā; si uerò tenuior fuerit, id quod in superfisie est tātum ueluti deurens, generis sortitur appellationem, cum simpliciter, & sine adiectione Herpes uocetur; Reliqua uerò altera miliaris, quoniam parua pustula ac multę per summā cutē, similes milijs in ea excitantur; (atque hanc postremam Genchriam Græci uocant,) quę non protinus uleus faciūt, quemadmodū alter, sed interposito tempore in uleus abeūt. 2. de Glau. 1. & 6. aphor. 45. Estq. eiusdem generis cum Erysipelate, atque huius quoque magis cum eo, quod exulceratum

ratum est differunt autem humoris tenuitate; est enim ad modum tenuis qui Herpetem excitat, unde ut non solum in teriores partes, quæ ut. que carnosæ substantia sunt transeat, sed etiam cutem ipsam, ad summam usque cuticulam tum erodit, tum exedit; quando si hanc quoque sudoris vice transires haud quaquā ulcus excitaret, 14. meth. 17. & 2. met. 2

Heterocrania, vide Hemicrania.

Heterogeneum, vide Dissimulare.

Heterorhythmus pulsus vocamus, qui alterius ætatis habet rhythmum, l. b. finit. vide Pararhythmus.

Hexis, vide Affectus, qui & schesis.

Hiatuli, qui & Hiatuli dicuntur, & Synodontes Græci vocantur, hi sunt quorum venter interim in ore inuenitur, quod accidit in vehementiore appetentia, in qua venter omnibus animalibus sursum procurrit; adeo ut nonnulli cum primum incipere eum affectum sentiunt, foras reperere sibi venter dicant, alijs vero cibos, quod adhuc mandunt, nec aũ satis eos ore cõfecerunt, eripit planè inuitis, 3. de nat. fac. 8.

Hidra, pustula quedam genitalium partium sunt summam cutem occupantes & ex alce. ætes, 3. aph. 21. oriuntur, ut ipsum nomen ostendit, ab earum partium sudore bilioso, & mordaci (ex mutuo attritu) qui per facile his in partibus putrescens pruriginem mouet, cutemq. velut ulceribus exasperat. Dicuntur, & Intertrigines, 6. de simpl. cap. de balneatio, Græci vocant ἰδρώα, & πατρίμματα. Plinius vocat Attrita, vide Sudamina.

Hidros sudor ἰδρὸς, est humidum tertie cõcoctionis excrementum, per cutem in aquæ speciem erupens, vide Sudor.

Himæ affectus est Gurgulionis, cum longior, gracilior, siccioreq. euaserit: talis. n. Lora non ineptè comparari pōt; differt à Gionide, quod in hac Gurgulio, non extenuatus est, sed crassitiem ex fluxione maiorem ut plurimum adeptus.

Hippo-

Hippocratica facies, vide facies Hippocratica.

Hippocraticum scamnum est machina quadam, quam Hippocr. consulit preparandam ijs, qui in aliqua magna urbe curaturi sunt, l. de artic. 4.

Hippos, vide Equus.

Hirqua, vide Anguli.

Homiomeres. & homaomeres $\mu\omicron\upsilon\gamma\epsilon\upsilon\varsigma$ *homogenea, i. similes, elementares, & prima corporis nostri particule, 6. de sanit. tuen. cap. 2. quas etiam prima corpora vocat, 8. de placit. 8.*

Homonyma duplicia sunt, aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia, ut cum Canem dicimus terrestrem, & marinum, atque hac æquiuoca dicimus: alia verò quæ cū synonymis, id est uniuocis aliquatenus communia existunt, cum ab vno factam appellationem habuerint, li. 4. de viſt. rat. 13.

Homoplata, quæ & Omoplata, quas opertas scopulæ vocant, partes sunt, quas ij, qui toto thorace respirant at- tollentes sensibilibus, & notabiliter ex difficultate respira- tionis, præcordia sursum trahunt variè, & inæqualiter, 10. meth. cap. 8. vide Omoplata.

Homotena, vide Continua, & Epacmaſtica.

Horam vocat Galenus, id tempus anni, in cuius medio caniculam exoriri contingit, 2. de aliment. facult. ca. 2. vi- de Fugaces.

Horarj fructus, vide Fugaces.

Horeſtica medicamenta, quæ faſtidiū auferunt, de Dy- namid. in proem.

Hordeolus, est apostema nascens in extremitate palpe- rarum, lib. de ocul. cap. 9. appellanturq. Cribæ, Hordeū, siue oculorum tuberculum, lib. de remed. par. fac. ca. 10. vi- de Cribæ.

Horrida febris *σπινδὸς πυρετός*, dicitur apud Hippocratem, 1. de morb. vulg non simpliciter ea febris, quæ cum horrore inaudit, id enim innumerabilibus accidit febribus; sed exquisitus hemitriticus, in quo videlicet magnam accessionis partem horrores occupant, eo maxime die in quo tertiana, & quotidiana continua simul concurrunt, 2. de diff. febr. vide Febris horrida.

Horror est inequalis cōcussio totius corporis, & punctio, seu vulneratio summæ cutis, & aliquando ipsius carnis ab humore tenui, & acri, 3. de sanit. tuen. cap. 5. & 10. meth. cap. 4. vide Frigus.

Humeraria vena est, quæ in superficie brachij exteriori collocata iuxta interiorem costam musculi Deltoidis ad extremum ipsius proficiscitur, 3. de anat. adm. cap. 5. quæ *Omīgā* Græci vocant, 1. de anat. adm. c. 11. dicitur autē *humeraria*, vel *humeralis*, quod obliquior a Clavicula sensim recedens se porrigat ad humerum, lib. de venat. & arter. dissect. c. 6. eadem vena capitis, *Cephalica*, & vena cubiti externa dicitur, vide *Cephalica*.

Humerus totum illud est, quod apparet in ea de articulatione qua superior humeri pars, quæ *Epomis*, & *superhumeralis* dicitur ad Collum vergit, & à posteriori parte ossi scapulae, ab inferiori ei quod dum totum Brachium attollitur manifestum fit, & ala nuncupatur, articulatur, 1. de artic. 4. & 62.

Humilis pulsus, vide *Latus*.

Humor, & *succus* non idem est; humor enim est humiditas quædam, quæ in corpore animantis est, succus humiditas est, quæ in ijs fructibus, quibus uestimur, aut quos exprimimus, inuenitur, lib. de humor. comm. 1.

Humor urinae, est id quod re ipsa urina est; sub quo nomine, & substantia, & color urinae continetur; præter hæc quod

q̄ in urina reliquum est, inherens dicitur lib. de urina, c. 1.

Humorem mucosum, cum appellare consuevit Hippocr. qui lentore quodam & albedine pręditus est, qui ad exangues partes, id est ossa, & chārtilagines cogi consuevit; cum imbecilla ita natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicottum relinquat, 3. de artic. 65.

Hyaloides humor Υαλοειδής ὕγρον, est humor oculi medius in ordine reliquorum duorum collocatus, qui & Vitreus dicitur, & Hyclinos; qui quanto crassior & albidior est sanguine, tanto à crystallino humore, humiditate relinquitur atque albedine, 10. de usu par. cap. 1. uide Crystallinus.

Hyatuli, uide Hiatuli.

Hyboma curuamen, gibbositas, Υἱώμα, idem est ac Κυνώμα, nox generalis est apud Hipp. significans omnem Vertebrearum caersionem pręter naturam, 3. de art.

Hydati, Aquula, substratę superiori genę pinguedinis augmentum est, qua fluunt pręter naturam oculi, lib. finit. sunt autem Hydatidę, humiditates illę, quę circa unctiofa, & uiscosa corpora per medium spatium, inter duas portiones tunicę Periostrij adnascuntur, quę corpora molliendarum sua pinguedine palpebrarum gratia, à natura fuerunt creata, 10. de usu par. cap. 7.

Hydatodes vinum, Υδατώδες βίον, est quod multa aqua dilui potest 5. de san. tuen. c. 12. quodd uinum etiam Oenodes uocant, quod multam sustineat aquę missionem, & imbecilles uires feriat, cui opponitur, βρυχίονον. i. aquosum vinum, quod paucam sustineat aquę missionem, 7. meth. 6.

Hydatoide, uide Crystallinus.

Hyderiei, qui & Hydropici, & Vtricularij dicuntur, lib.

lib. de atra bile, cap. 9. estq. aqua inter cutem, 5. de loc. affect. 7.

Hyderos Phlegmatias, vide Leucophlegmatias.

Hyderos, id est species Hydropis quæ Anasarca dicitur, 3. de sympt. caus. c. 2.

Hydragoga medicamenta sunt, quæ aquam utricularijs Hydropibusq. educunt, lib. de atrabil. ca. 6. Inde Hydragogia, id est aquæ ductus, sanguinis lationem per uenas, nō minc à similitudine fluminis ad riuos translato, significat; qui fit spiritu, vñd cum caliditate per uentrem exeunte, ac deinde secum confractas nutrimenti particulas, deferente, Gal. in Timæum Platonis, fol. 578.

Hydrelæum, est compositio ex aqua & oleo, Ὑδρίλαιον, incerta autem & multiplex mixturæ ratio, ad dolores capitis ex febre, & vomitiones conueniens, 2 simpl. 25.

Hydrenterocele, Herniæ species est composita, quando uidelicet, unā cum intestino, aquosus humor in Scrotum descenderit, lib. finit.

Hydrocele, vide Enterottle Celas, & Sarcocele.

Hydrocephalon, est humoris aquosi, uel feculentis sanguinis collectus tumör, in parte aliqua corporum eorum, quæ caput constringunt, lib. finit. Est autem is humor piger & deses, tribusq. in locis colligitur, aut inter Cutem & Pericranium, aut inter Cranium, & Pericranium, aut inter Cranium, & Cerebri membranas, aliqui addunt ex Aetio quartam locum, inter Cerebrum, & eius membranas, sed tunc nullam recipit citationem, puerulis maxime familiaris morbus est.

Hydromphalon, coitio in umbilico est lenti humoris, qui sub tunica quoque interdum continetur, lib. finit. Grece Ὑδρόμφαλον.

Hydrophobus, i. aquæ timidus, Ὑδροφῶβος, est is qui ex morsu

morsu canis rabidi, aquam reformidat, 9. meth. 5. inde Hydropobia, i. aque timor, vide Psycrophobus.

Hydropici, vide Hyderici.

Hydrops, Ὑδρῶς, est aqua inter cutem, in quo per cutem extentam, siue aer, siue humor, aliquis in profundo locatur; si igitur in membrana abdominis interiore, Peritoneo Græcè dicta, aer recludatur, fit Hydropis species, quæ sicca ab Hippocr. vocatur; si vero humor, fit Ascites, qui & hydrops aquosus ab eodem dicitur, 4. aphor. 11. Eius tres sunt species, prima Ascites ἀσцитς, quæ fit cū inter membranam Peritoneum, & intestina, plurimus aquosus humor coaceruatur, qui locus, aquoso humore, utri modo impiet is videatur, unde & vetricularem appellant, Barbari corrupta voce Ascitum. Altera Tympania, Τυμπανία καὶ Τυμπανίτις, dicitur, qui fit ubi flatūs, ac spiritus copiosus, in iisdem ventris locis, congregatur; Hoc nomine à Tympano omnibus notissimo instrumento, appellata est, si enim pulsetur uenter inferior, instar Tympani sonum edit. Tertia Anasarca, Ἀνασάρκη ὁ πᾶσαρξ, καὶ Ἀδυνάμεια, dicitur, fitq. quoties per totum corpus humor pituitosus disseminatur, ut instar spongiarum, aut papyri, vniuersa caro permadida appareat, ideoq. in ea totū corpus intumescit, ac mortuo simile euadit.

Hydrops aquosus & siccus, vide Hydrops.

Hydrops matella, vide Diabete.

Hydrops, in vas vrinale, vide Diabete.

Hyelinos, vide Crystallinus.

Hygia, id est sanitas, quæ est affectio, constitutioq. partium, cuius ope, functiones secundum naturam edimus, 1. meth. 9. Inde Hygine salubris medicina pars est, quæ sanitatem tuetur, & imminentes morbos præcauet. lib. Introd. cap. 7.

Hygro-

Hygrocystocoele, id est aquosus simul, & varicosus ramex, est dilatatio vasorum testem nutrientium, & lenti humoris in Scroti aliqua parte collectio, lib. finit.

Hymen, Hymenæon, vide Colliculum.

Hyoides siue Hypsiloides, siue Lambdoides à similitudine, quam cum Υ, & Λ, Græcis litteris obtinet, dictum est os capiti gutturis incumbens, rectum secundum colli longitudinem, & leniter curvum lib. de muscul. diss. cap. 13. quod & Pharyngætron vocant, lib. de vocat. instr. diss. c. 6.

Hypelata, Catoterica, siue Deiectoria medicamenta sunt, quæ renes, vesicam & gibbam iocinoris, cum multo vitioso succo sunt referta, expurgant, 7. meth. 13.

Hyperbolica figura corporis est, quoties quattuor membra Græcè Κῶλα. i. crura, ac manus, aut summæ extenduntur, aut immodicè inflectuntur, aut spina, cuius partes vertebra quoque in cervicæ existunt, 1. progn. 13.

Hypercatharsis, Υπερχαρσις, super purgatio, immodica est ex medicamentò purgatio, in causa est vis nimia medicamenti, quod vasa ad ventrem attinentia mordens, & aperiens, & continenter irritans atque conuellens corpora, vasorum vires dissolvit. In qua primum flava bilis, deinde pituita, deum atrabilis, postremo sanguis, quem natura habet familiarissimum excernitur, initio tenuissimus demum crassissimus, vide super purgatio. Si verò humoris vel sanguinis euacuatio spontè fiat, quam natura gravata, vel sanguinis, vel humorum multitudine, ad ipsius & ipsorum euacuationem excitata, modum obtinere non valet, facit, Hypercrisis dicitur, scilicet supernacuatio, 3. proorhet. 53.

Hypercrisis, vide Hypercatharsis.

Hyperoa, Υπερωα, est pars oris superior, modicè congesta, foraminulis pertusa, quibus à Cerebro pituita ad os

de-

descendit Latine palatum, & Basis Cerebri, osse sphenoidale firmata.

Hypersarcon vlcus est, cui caro supercrescit, veluti Hypersarcosis, carnis excrescentia, Υπερσάρκωσις Græcè, 2. meth. 2. & 3. meth. 6.

Hypexochotes membranæ, siue subcingentes sunt, quæ telæ araneorum similes, natura simplices, inter nam utramque thoracis regionem subcingunt, quæ verò rectæ ad ingulum usque perferuntur, Diaphragmattondes, id est intercipientes, siue intersepientes, ubi pulmonibus coherescunt, huius operimentum dicuntur, 5. de anat. adm. cap. 8. quæ etiam tunicas omnium spirationis instrumentorum, vocat, 7. de anat. adm. c. 2. vide Cingentes.

Hypnoticum medicamentum est, quod somnū cōciliat, Υπνωτικόν, soporemq. siue Cataphoram epotum, molitur, refrigerat enim corpus, & sensum eò usque stupefacit, ut si paulò liberalius ebibatur, mortem afferat, 5. simpl. cap. 19. vide Narcoticum.

Hypocaumata, i. fomites, alimenta nominās, iuxta omnium philosophorum dogma, qui eorum, quæ animalia constituunt elementorum, ignē maximè, vitæ esse causam existimarunt, qui suis pabulis, tanquam alimentis alitur, ut lucernæ flamma oleo, 1. aph. 14.

Hypocheomenes, i. suffusi, 6. de sanit. tuen. c. 9.

Hypochondria, id est subchartilaginea, sunt partes illæ, quæ sub ventriculi ore, ad partem exteriorem apparent, quoniam secundum rectitudinem sub Chartilagine, id est, post chartilaginem habentur, sunt autem muscoli, qui expansi membranæ pratenui veluti Araneæ, quam Peritonæon vocant, subiacent, extrinsecus verò cute conteguntur; Aequiuoco autem cum his vocabulo etiam interiora viscera vocamus hypochondria, quoniam & ipsa sub chartila-

tila.

tilaginibus notharum costarum ab interiori parte existēte, sed exteriora proprio, lib. Introd. cap. 10. in priori significato dictum. febres ab Hypochondrijs moderate, id est omnium febrium acutarum, quę ab Hypochondrijs proficiscuntur sunt mitissima, in posteriori significato, quando sub hac voce Hypochondria, complectimur, ventrem iecur, lienem & septum transversum, quedam maligna, quadam mites sunt, com. 2. in 3. de morb. vulg. Atque in hoc secundo significato, hypochondrion, ὑποχόνδριον, ab Epigastrio non distinguitur.

Hypochondriacus, siue flatuosus affectus, qui & simpliciter Melancholia dicitur; morbus est ex tertio melancholice genere, à ventriculo ortum ducens, pravis symptomatibus infestatus, quem sequuntur metus, & mesistia. qui alui detractione, vomitione, proba concessionem, & ruellib. leuatur, de loc. aff. c. 7. Gręce Ὑποχονδριακὴ μελαγχολία dicitur.

Hypophyma, (quę & Hypophysis,) est crassi humoris in cornea membrana, vel inter corneam tunicam, & crystallinum humorem, iuxta pupillam concretio; quę in re, Hypophymato, & Glaucomatos differentiam recentiores posuere, dicentes τὸ ὑπίχυμα, non aliud esse, quàm humorem illic concretum; Γλαυκόμα autem alterationem esse humoris crystallini, in glaucum colorem ab humiditate quadam intra ipsum contenta, aliunde adueniente, cum tamen veteribus medicis, idem esset uterq. affectus, nec tamen hoc solo differunt. sed etiam quod omnes suffusione laborantes, lucem uideant aut multam, aut paucā, qui verò Γλαυκόμα, quiq. ὁμαύρωσι, patiuntur, lucem omnino nullam cernant. Est autem suffusio duplex, una propriè dicta, quę est oculi, rum per se suffusorū morbus ab humore crasso pupillam obscurante; altera verò improprie, in qua oculi

non primò, & per se patiuntur, sed uisa quadam uisis propriè suffusorū similia representant, quæ est per consensum suffusio, (ut illa per essentiam) sine a ventriculo sursum ad oculos ascendendo, siue a Cerebro deorsum, siue a toto corpore, ut in febribus, vide Glaucofis.

Hypogastrion, vide Abdomen.

Hypoglossis, medicamentum est, leniens, leuigans & remittens asperitates asperæ arteriæ, in quibus si quid inflammationis reliquū est, id concoquit, & persanat, quod medicamentum, quia lingua subditur, coq. paulatim liquefcente, asperæ arteriæ summum madescit, & irrigatur, ibi id Υπογλωσσις dicitur, de quibus Gal. fusè, 7 de composit. me. loc. uide Arteriaca. Hypoglossis etiam dicitur inferior linguae pars, quæ subiectam attingit maxillam.

Hypophora sunt fistulae & uitia profunda, & quæ dehiscent, ut sinus ulcera, aliaque huiusmodi omnia, quæ ex defectu repletionem desiderant, atque indicant, lib. Introd. c. 3.

Hypophysis seu Hypochysis, i. suffusio, 3. meth. 2.

Hypopyus uocamus, quibus pus in oculis congregatum est, quod uacuari solet, diuisa ea tunica, quæ cornu est similis paulò supra locum quo committuntur inter se tunicae uniuersæ, quem Græcè alij Irim, alij Stephanon, alij Coronam uocant, differtq. ab Hypochymate, in qua non pus, sed leuis quadam nebula tunicis oculi interponitur, 14. meth. c. 19. Quod autem Hypopyon, sub oculis fiat, nomen ipsum indicat, idem enim est, ueluti si quis Hypophthalmium dicat, quod ipsum sub oculis sonat; Est autem ex genere effusionum, Ecchymomatum appellatarum; Appellant ita Hippocr. & alij multi Medici, circa cutem affectionem, cum tenuibus in ipsa uenis contusis, sanguis per fissuras effunditur, non uno loco accruatim, ac statim ita excretus in grumos coiens; sed postquam per persulta-

tionem,

tionem, hoc est, Diapedesim, effusio ista est facta, tunc enim temporis progressu, contingit luescere, & denigrari, paruis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis, 5. de compos. medic. loc. cap. 1. & lib. de Virtute Centauræ cap. 4. Υπερπυον καὶ Υποπυον Græci uocant.

Hypophthalmia, & Hypophthalmiū, vide Hypopyus.

Hyposarca, quæ & Hyposarcidium, & Episarcidium dicitur, species hydropis est, in qua habitus totius corporis pituita plenus redditur, 4. de rat, viſt 11. vide Anasarca.

Hyposphagmata plagas oculi illatas, & oborientes ex eis cruentas suffusiones, appellant, 4. de comp. med. loc. c. 8. species τῆς ἐκχυμώσεως.

Hypospadiæi, Υποσπιδιάει, ii sunt, qui quod ob id uinculū, quod ad finem uirgæ habent, eis meatus seminalis est contortus, generare non possunt, non quod semen fecundum non habeant, sed quod in virge flexibus hærens ferri prorsus nequeat, quam rem curatio ipsa comprobat, uinculo. n. abscisso generant, 15. de usu par. cap. 2.

Hypostasis, siue sedimentum est id, quod in urina residet, tanquam crassior uring portio, secreta & subsidens, lib. de urinis, cap. 16. licet generaliter quidquid subsidet, atque in imo cuiusque liquidioris excrementi subsistit, hypostasis est; quæ crassior urina pars, si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nebecula. si ad mediam regionem, Suspensum, si profundiore parte inferiorem locum occupet, dicitur Hypostasis, ibidem cap. 21. Quæ si diuulsa non sit, sed non continua apud Hippocratem dicitur plana, quod si per omne tempus sui similis est, ita ut si uno die sit cocta, sit etiam postero die, & quæ si dimentum, & humorem urinarium habet non distantem a se, sed totum sibi æqualem, quæq.

quaque continuo sibi similis perseverat, equalis apud Hippocratem dicitur, ibidem cap. 38.

Hypsiloides, vide *Hyoides os*.

Hypothenar. i. subnola, pars ea manus est, quae opponitur nola manus, quae *Thenar* dicitur, lib. *Introd. cap. 10*.

Hystera, id est uterus, vulva, matrix, vas fetus gestandi; foris nervosum, intus carnosus diciturq. à Græcis *Υστὴρ*, quod prostrema sit partium omnium, lib. *finis*. Unde *Hystérica* mulier, id est ab utero suffocata, siue hunc affectum uteri suffocationem, siue spirationis ob uterum ablationem vocites, quo interdum mulieres, sine sensu immobiles iacent, cum nullo aut parvo, aut obscurissimo pulsu, interdum sentientes, & moveri potentes, atque integræ ratione; tamen animi defectu, et difficili spiratione laborantes, alias etiam crura, & brachia contrahunt, 5. de loc. aff. 5. quas etiam uterarias vocant, id est utero laborantes, com. 1. in 6. de mor. vulg. 2. unde *Hysteralgia*, uteri dolor: *Hystericus Typus*, & morbus, accessionis est retardatio cum posterior accessio serius inuadat, quam præcedens.

I

I A N I T O R, vide *Pyloros*.

*I*anitrîx vena, id est vena Porta, 6. de plac. cap. 5.

Ichor est tenue excrementum ulceris, ut sordes crassum, 3. meth. 3. vocat etiam *Ichores Hipp.* tenues acres, & mordaces sanguinis humiditates, 4. de rat. vi. 2. Appellat adhuc *Ichores* superfluas sanies, quas corpus acernat, ex quarum uapore non solum capitis dolores nonnullis oboriuntur, sed etiam suffusorum, quos *Hypocheimena* vocant symptomata, aliquibus verò & *Comitialis convulsio*, 6. de sanit. tuen. c. 9. Dicuntur adhuc *Ichores* fluentes humiditate

Coryza, & **Catarrho**, 2. de rat. viſſ. 44. Græcè igitur ἰχθὺς dicitur, ex Latinis quidam vertunt, ſerofum humorem, quidam aquoſū, quidam tenuem, alii verò ſanientem interpretantur. **Ichoroides** autem ſanguis non ſimpliciter tenuis, & aquoſus ab Hippoc. vocatur, ſed qui venenofa aliqua, & maligna facultate præditus ſit, unde Galenus ex Platone, **Ichor** autem ſanguinis quidem ſerum, mitis: nigra verò bilis, læcis, & ſerus. **Ichoroides** itaque ſanguis vocatur, in ſeipſo prauam ac tenuem humiditatem continens, mordacem, & erodentem, non aqueam, & morſu carentem, commen. 2. in 6. de morb. vulg. 38. Vide **Sordes**.

Icteros eſt inflammatio ex flaua bile, ſuiſervante naturam, vnde cum ſanguine per totū corpus delata, 2. ad Glauco. 1. ſic dictū hoc malum, vel ab aue, quæ Græcis ἰκτερος, Latinis verò **Galbula** dicitur; hæc enim ſi ſpectetur, ſanari malum dicunt, & auem mori, vel ab aue, quæ ἰκτερος Latinis Græcis, **Milvus** Latinis appellatur, oculi ſiquidem hoc vitio laborantiū, miluini oculis ſimiles, hoc eſt auti colores videntur; vel à muſtella ſylveſtri, quæ auricolores oculos habet, & Græcis ἰκτερίς, Latinis **Vierra** nominatur, qui & Regius morbus dicitur, quoniam mulſo, quod genus potio- nis in Regum delitiis erat, curabatur, & ebuſq. omnibus hominis mentem exhilarantibus. **Aurigo** quoque nominatur à Celſo, ab auri colore, quem bilis per vniuerſū diſfuſa corpus, refert. **Arquatus** denique nuncupatur, quod celeſtis arcus ſimilitudinem colore agat.

Ictus, eſt arteriæ motus tactui occurrens, intervallū autem eſt tps interpoſitum inter duos ictus, quo diſtenditur, contrahiturq. arteria, de Pulſi. ad Tyroneſ, cap. 4.

Idea morbi, id eſt morbi eſſentia 3. de criſ. 4.

Idiopathia ἰδιοπάθεια, proprius affectus eſt, qui & πατοπάθεια, id eſt primariuſ affectus dicitur, ex aduerſo di-
ſus

fit ab affectu per consensum, seu per viciniam, & secundarium, seu posteriorem; Ei vero qui per consensum infestat, qui *συμπάθεια*, quod *ἰδωροπάθεια* dicitur proprium opponimus, 1. de loc. aff. 3. Per consensum autem affici tribus modis membrum aliquod dicitur, vel propter viciniam, vel propter familiaritatem generis vel operis, generis ubi nervosum nervoso, venosum venoso consentiat; operis cum mamma, & thorax, partibus genitalibus, com. 3. in 3. de morb. vulg. 4. vide Sympathia.

Idiosyncrasia, id est corporum proprietas, & conuenientia, 3. metb. 2. & 7.

Iecur, vide Hepar.

Iecoraria vena, vide Cava vena.

Iecoris vena, vide Choledochos.

Ieiunum, secundum est intestinum in ordine, quod à Duodeno intestino quod vocant, multifariam in orbes conuoluitur, vasorum complurium serie contextos, dicitur autem ieiunum, quod semper cibo vacuū reperiatur, 6. de ana. adm. c. 9. quapropter Nōis hoc est ieiunum appellatur, quod semper inane permaneat, nec tantillum quidem, in se ipso alimenti contineat, 5. de vsu par. ca. 3.

Ignem suo more Hippoc. febrem vehementissimam appellat, com. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Ignis sacer, id est erysipelas, 8. de plac. 4. & lib. de purg. med. fac. cap. 5. vide Sacer ignis.

Ile, id est *Κενεὸν* locus appellatur, qui est inter thoracē, & os coxa, propterea quod *Κενεὸν* id est, caelum, & vacuū, id est depressum est, 2. de his quæ in medic. 16. quem locum etiam Græci *Λαγῆλον*, appellant, qui inter thoracis, & iliolum ossa subsidet, propterea quod eo loco cingulum circumdatur, unde & *Λαγῆλον* & *ἰλεον* etiam nominant, secundo de fract. 70.

Ileon ἰλεόν, intestinum est ordine à uentriculo tertium, quod incipit ubi ieiunum desinit, diciturq. εἰλεόν, à multis anfractibus, & circumuolutionibus; idem uerò & λεπτόν, hoc est tenue, simpliciter dicitur, nomine duobus etiam superioribus communi. A qua parte affecta obstrueta, & inflammata, nomen desumpsit is morbus peracutus, qui Ileos, Græce εἰτλός appellatur, sed nihili uetat in crassiori subsequē de intestino, eundem affectum, pro gigni, sed mitiorē, & minus mortiferum, com. 2. in 3. de morb. uulg. licet aliqui eundem in pleniore intestino factum uocent εἰλεόν, in tenuiori αἰλεός, (cum prius χορδαῖος, diceretur) quod per eum intestina conuolui uideantur: unde quidam Latine Voluulum dixere, Chordapsum autem, quod qui manum loco dolenti admouerit extensione, chordam attingere uideatur, 3. aph. 22. & 6. apho. 44.

Ilingus, est tenebricosa uertigo, quæ sit cum humor, cum crasso spiritu, in capite mouetur, & idcirco præcedit Epilepsiam & Apoplexiam, 3. aph. 17.

Illegitimæ costæ, quæ Νοθή, spuria, & mendosa dicuntur, 5. de anatom. adm. cap. 1. cartilagineæ admodum existentes, sunt quattuor ultima costæ, quæ ad pectoris os non pertingunt, 8. de anat. adm. cap. 1.

Illisio, uide Collisio.

Illosis, & **Strabismus**, sen **Strabilismus**, sunt inuita musculorum palpebras mouentium concussionēs, 2. de sympt. caus. cap. 1.

Ilium, λαγύραν ἐσοῦν, est apophysis ossis sacri superna, & ampla continens intus ventris imi partem plurimā, tangensq. alia. Os enim sacrum tres habet apophyses rectas, nec deorsum, nec sursum repentes, ilium, coxæ & pubis, tamen os totum, sæpe os filium uocamus, quod id inter cætera magnitudine, & crassitie præpolleat.

Imas

Imds, uide Gargareon.

Imbecilla corporis pars est, uel quæ natura est intemperantior, uel quæ ex præcedente aliquo morbo, intemperientia contraxit, uel quæ in præfenti tempore, in hanc sit perducta, promptius uero in ijs supernuacaneum, qualecumq. id sit, in egram partem fertur, 1. 1. meth. 20.

Immutatus morbus est, cuius longior est accessio, & minor satis remissio, quo genere antiqui Typum quotidiana-rum, & semitercianarum, reponebant, lib. de Typis, cap. 3.

Impetigo Διχῆρ, est summæ cutis asperitas cum multa prurigine, lib. finit. Agrestes uero impetigines nominant, cū à medicamentis imbecilliter siccantibus, nihil iuuantur, & validis irritantur, 6. de comp. med. per gen. cap. 2. Ea autē impetigo, quæ cum pruritu sit, & si non aspera, lenior quàm uel Psora, uel lepra est, adeò ut si sola salina quotidie defructetur sanescat sed ubi increuerit, extremam cutem in fures resoluens, in psoram transit, atque deinde in lepram, ubi pro fursuribus, piscium quasi squamula concrescunt, 5. de comp. med. loc. cap. 5. & cap. 7. (Nec est is morbus, quæ Gallicum, seu Neapolitanum, seu Hispanâ scabiem uocant, ut alibi mihi forte ostendendum erit.) Caterum Διχῆρος, Lichenis nōmine illum etiam Impetiginosum morbum Μεταγραμ Romanis appellatum multo magis ferum, & agrestem, Plinius comprehendit, non squamis ut lepra, sed fado cutis fure, totos primum uultus, deinde uerò, & Collū petusque, & manus occupante oculis tantum immanibus. Celsus lichenem non impetiginem interpretatur, sed Papulam, cuius duas, quas habet, & Lichen, differentias statuit, feram & mitiorem, Nam quæ ab eo describitur Impetigo, Lepra est.

Impetum facientia, uide Continentia.

Implicatus affectus est, in quo multa sunt affectæ par-

tes, nam potest idem homo, non solum laborare ex Thorace, sed etiam ex pulmone, capite, ventre, iocinore, com. 2. in 3. de morb. vulg.

Imum ventrem vocat Hipp. regionem ventris imā, quę umbilicum ac pudēda interiacet, ita ut in hac tria totum abdomen diuidatur, in Hypochondrium, & loca ad umbilicum attinentia, & imum ventrem, 2. aph. 35.

Inaqualis, & inordinatus pulsus est, cuius circuitus nullus prorsus seruetur; Est verò inequalis, & ordinatus, quando ictus pari semper numero, paribus pulsibus procedentes, intercurret unus impar, qui aequalitatem corrumpit, proportionem circuituum quandam ordinem seruante de pul. ad Tyron. cap. 6. Inequalis autem deficiens pulsus est, in quo nulla seruetur aequalitas, motuq. ipso, semper deficit, 1. de differ. puls. cap. 12.

Inanes illas corporis partes vocari in more est, quęcūq. inter extremam Thoracis costam, & femoris Adu. & ossa habentur; atqui inanis videtur omnis talis sedes, si eam cum supernis, infernisq. partibus, vtriusq. offeīs conferas, 2. progn. 1.

Inconsiones, Hippocrates vocat, inflammationes; unde etiam nomen calidis tumoribus impositum est, 3. de bis quę in medic. 30.

Incidentes dies, vide Decretorius,

Incisio, vide Vnionis solutio.

Incisorij dentes, vide Dentes, & Tomi dentes.

Incoctionem vocat Galenus, non coctionis tantum in ventriculo frustrationem, sed in vasis quoque & Iecore, et mole vniuersa, lib. de med. art. const. cap. 15.

Incrementum morbi, vide Ascensus morbi.

Increscens, vide Continua.

Incubus, vide Ephialtes.

INCUR-

Incuruatio, qua & Gibbositas dicitur, est distortio spinæ in posteriorē partem, ex Panis & Tuberculis immaturis in spinæ exortis magnis & duris, & diuturnis existens, ut nonnulli arbitrantur. 3. de art. 2.

Index digitus est, qui prior à Pollice est, qui nomē ab usu sortitus est, lib. Introduct. cap. 10. Dicitur, & index is dies, quæ eam habet naturam, ut qualis nam dies, cuius est index sit futurus, indicat, 1. præverb. 1. & 2. aphor. 24.

Indicatio, est inuantis comprehensio, simul cum comprehensione nocentis adueniens, sine obseruatione, & ratiocinio; ad Thrasib. cap. 11. Quippe ipsam sequentis, siue agendi insinuationem, indicationem dicimus. Ergo ex ipsa rei natura exordiri, atque ipsa quod sequens sit, citra experientiam inuenire, id est indicatione inuenire; Vt si queratur de sanitate, quid sentiendum sit, primum perpendere oportet sanitatis naturam, quæ quia bona omnibus mortalibus videtur, facit, ut iudicemus eam à nobis seruandam esse, quamobrem sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem vero & in morbo agendum, qui quoniam totus præter naturam est, & toto genere malus, indicat & ostendit, se tollendū esse.

Indicatoria, vide Prognostica.

Indices, & spectabiles dies consueto more appellat Hippoc. in quibus signum aliquod indicationis apparet, alio quopiam ex diebus decretorijs futura, quos ipse, 3. progn. 4. per quaterniones digessit, singulis septimanis bipartito sectis, 2. aphor. 24. qui Græce ἐνιδικοί, & δεικνύτικοι, hoc est indices, & contemplabiles nuncupantur, quod maiorem vim & potestatem habeant, ad præsagiendam, contemplandāque futuram crīsim, quam ad iudicandam; licet in eis aliquando perfecta crisis possit accidere, ut dies quarta, undecima, decima septima.

Indicia, & signa certa illā sola nominantur, ex quibus

licet certo colligere aliquid de salute, & interfectione infir-
mi, quæ comprehendens uno capite dicit aliquis esse signifi-
cationes virium gubernantium corpus, quo pacto robore uæ-
leant, aut deficient, in quibus scilicet crudicatis etiam, aut
coctionis signa continentur, 3. progn. 39.

Inflammationis nomine solent Græci, uti ad partes quæ
in maiori tumore sunt, carnosas, intensas, renitentes, pul-
santi, & calido dolore dolentes, & rubentes, lib. de tumore.
cap. 2. quasit uel propter coincidentiam, uel propter im-
passionem, obstructionemq. omnium uasorum, siue ob cir-
cūstantiam quandam molium quæ meatus occupant, siue
abundantia quædam sanguinis oborta inflāmatione, in par-
ticula constitutatur, lib. de totius morbi temp. cap. 3. Dicitur
adhuc inflammatio Phlegmone, et Phlogosis, i. inflā-
men. Eligitur inflammatio nomine generis: immoderata
caliditas; nomine aut species, idem nomen cum genere ob-
tinent, est cum sanguine optimo, ac mediocrem crassitudi-
nem obtinente ad particulam aliquam uniuersim fluente,
atque ob multitudinem concussato, uehemens dolor arripit
hoīem, nisi mēbrum sensum omnino hebetem habuerit, pul-
susq. in profundo molestus accidit, tenditq. omnino ac contū-
di mēbrū apparet, et uehementem calorem per sentit, adeo
ut comburi uideatur, & refrigerari desideret; talisq. rubor
per summa uiget, qualis ex balneis accidit, aut ex igne, aut
quouis alio modo calefactis. Multæque sunt huius species,
nam fluente sanguine, altera, flaua bile, altera, ambobusq.
simul humoribus, alia tertia, 2. ad Glau. 1.

Inflammen, vide Inflammatio.

Inflammati lassitudo musculorum est affectio, quæ ma-
nibus, cruoribus, lumbis, spine, & musculis ubi plurimum
laborem pertulerint, accidit, ijsque qui ex uehementi
clamore, organa uocis, id est arteriam, eius summum, &
fances

facces oblesas habent, uocemq. rancam effecerunt, 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Inflatio, vide Phisic, 14. meth. 7.

Infundibulum, vide Choana.

Infractioes oculorum, 1. cum palpebra innertuntur, com. 5. in 6. de morb. vulg. 2.

Inion, est ea capitis pars, quæ occipat dicitur, principium medullæ spinalis, ad stipitis modum in multos ramos diuisa, in sexaginta ferè, iuxta numerum nervorū, 2. de compos. med. loc. cap. 1. Trōchilæ terminantur sutura Azygōdōda.

Initiatrice, vide Antogressa.

Innominatus morbus est, qui medio loco, inter Lethargū & Rbrexum collocatur, in quo egri conuient oculis somnolenti stertunt, oculis fixis intuentur, difficiles & tardi ad respondendū, stultè loquuntur, & temerè nugantur, lib. de Puls. ad Tyron. cap. 11. quem affectum cum longo tempore perdurauerit, Typhomaniā vocant, 1. prorrh. 1.

Innominata charitilago, vide Gricoides.

Innuans, circumnuens pulsus est, qui inæqualis est in una distentione, 1. de differ. puls. capit. 20. & 4. de caus. puls. cap. 10.

Inordinata febris est, quæ non certo quodam circuitu redit, 5. de placit. c. 2. quæ & Erratica dicitur, 8. de placit. cap. 6. vide Erratica.

Insanire, est desipere citra febrem.

Inspiratio est externi aeris intus attractio, 4. de loc. aff. 7. ad natiui caloris conseruationem, & spiritus animalis nutritionem, 7. de usu par. cap. 9. quæ duplex est, lenis, & coacta, lenem, & non coactam appellant, quæ in bene ualentibus, nullaq. uehementi agitatione motis cernitur Coactam uero quæ sum in morbis nonnullis, sum in exerci-

cita-

citationibus paulo vehementioribus accidit, in qua protinus omnes etiam scapularum partes simul attolli conspiciuntur, 2. de placit. cap. 4. *Inspiratio*, & *exspiratio*, *ἐνσπύριον* & *ἐκσπύριον*, oppositi motus sunt; ille est, quo distensus Thorax per asperam arteriam, necessario in os aerem exteriorem attrahit, tribus de causis, ut refrigeret, ut ventilet calorem nativum, & ut spiritum animalem gignat; Illic quo thorax contractus eundem aerem exprimit, ut quidquid in ipso fuliginosum, fumosumque ex humoribus excoctum fuerit, id exprimendo elidat: Verique nomen *Respiratio*, & *Respiratus* *ἀνασπύριον*, 4. de loc. aff. 7. Per inspirationem autem attrahit in se homo exteriorem aerem, per os in pulmonem, per varietatem autem cutis, & carnis in arterias: Horum motuum uterque, tam quo per os, quam quo per cutim fit aeris attractio, uno nomine *inspiratio* appellatur. Per exspirationem verò per eosdem meatus, per quos aerem recipit, adhuc remittit; qui cum per os remittitur, *exspiratio*; cum per cutis meatus *transpiratio*, *perspiratio*, *diffusio*, *transpiratus*, *perspiratus*, *diffusus*, *διασπύριον* dicitur, 8. de placit. cap. 8.

Instrumenta prima censentur, quæcumque ex similaribus partibus coalescentibus, unius operationis gratia sunt constituta, quocumque verò rursus ex his componantur, etsi unitotius instrumenti affectui quàm maximè obsecruiant, tamen inter secunda cõnumerantur; musculus. n. & vena, et arteria; inter prima instrumenta numerantur, digitus verò inter secundã, atque hoc magis pes, & pede magis crus. li. de morb. temp. cap. 4. Vnde instrumentales corporis partes sunt, Cerebrum, Cor, Pulmo, Hepar, Vēter, Splen, Oculi, Renes, ibid. cap. 3. Instrumentales autem morbi fiunt, vel naturali harum partium formatione permutata, vel nō servato numero partium opportuno, aut unicuique parti convenienti

magnitudine, vel quod non ut naturalis positus expetebat, ipsa cohercant, ibid. c. 6. vide Similare.

Insultus accessionis, est indiuisibile illud tempus quo accessio primum inuadit, quod alij febris significationem, annotationem, & Episemiasiam uocant, lib. de morb. temp. 6.

Intemperies morboſa, Græcis *νοσῶδες, δυσκρασία*, partium similarium morbus est sitq. ubi qualitates primæ, seu elementa ipsa a naturali symmetria, & commodatione defleſcunt. Non autem, cura rationem adiectum est, morboſa; duplex enim exiſtit intemperies, ex Galen. 2. de temperam. alia enim est naturalis, seu sanitatis, & alia morbi (ut nos tetigimus in nostra Synopsi medicina quam anno superiori typis dedimus, tab. 5.) Sanitatis siue naturalis est, quæ a media temperie paululum abest, vel in qua nulla functio animalis adhuc manifestè læditur, licet imbecillior reddatur, intemperatio sanè erit, sed non agrotabit homo. Quod si quis hoc denegauerit, horum alterum fateatur necesse est, vel omnes homines agrotare semper, vel vnam esse omnium intemperiem, utrumque verò absurdum est. Morboſa verò intemperies est, cum animal intemperamenti vitio egrotat, quæ si omnibus corporis partibus equaliter insit, ut in fletifica febre, æqualis intemperies appellatur, & dolorem non efficit, secus doloris sensum efficit, & inæqualis dicitur, ut docet Gal. de inæquali intemp. 1. de sanit. tu. lib. de consti. art. & c. 8. artis parua.

Interceptiones uenarum, quæ Apopleſis Græcè dicuntur, sunt oppletiones, quæ a copia exoriuntur, quæ cum supra modum oppletæ fuerint, premi uirtutem, grauatiq. est necesse, atque in extinctionis agi periculum natam caliditatem, quæ ob multitudinem, copiamq. suffocationi quippe simile patitur, 4. aph. 23. Vbi verò intercipiuntur, quæ sunt in animali arteriis, hoc est vitæ oppletæ sanguine fue-

fuerint, ut nullus in ipsis vacuus relinquatur locus, in quem dum attolluntur, aerem externum attrahere possent, tunc strangulatur, atque extinguitur calor innatus: at qui ita affecti sunt, subito sensum & motum totius corporis amittunt, lib. de caus. morb. c. 3. nequeuntibus spiritibus naturales pertransire meatus, atque ob id ab Hippoc. interceptiones spirituum nuncupantur, 4. de rat. viſt. 27.

Intercidentia, vide Coincidentia, & Parempiosis.

Intercidentes, vide Decretorius. Intercidens autem pulsus est, cum inter duo ictus, qui ordine proprio inferantur, ictus medius intercurrit, lib. finii.

Intercipientes membrana, vide Cingentes, & Hypozochota.

Intercostales muscoli, μεσοπλευριοι μυες, sunt muscoli inter medias costas siti, quorum bini sunt in singulis costarum interuallis, alter externam partem spectans, alter internam; externi thoracem dilatant, ad inspirationem, interni contrahunt ad expirationem, 5. de caus. respir. 8. de anat. adm. & 7. de usu par.

Intercurrens pulsus est, qui inaequalis est, inaequalitate crebritatis, 1. de diff. puls. cap. 12.

Interfemineum, quod Perineon Græci uocant, est media illa pars corporis, quæ inter totum id, quod inter inguina utriusque cruris est, (quod gressuram solet Hipp. appellare) interiacet, quod duobus feminibus sit interpositum, quæ est intercapedo, quæ ab exortu pudendi usque ad anum pertinet, ubi etiam uestica collum collocatum est, 4. de artic. 45. 2. de fract. 43.

Intermissionem febris, uocat Gal. cum febris in quietem desierit. 1. de cris. cap. 3. & ad infecbricitationem deuenit. 3. de cris. c. 4.

Intermittens pulsus est, qui inaequalitate constat, raritatis,

eatis, & paruitatis, alio atque alio utrobique modo, in raritatis inequalitate, quod quies sit longissime producta, in paruitatis, quod distentio minimum dilatata, 1. de differ. puls. 12.

Internodia, vide Phalanx, & Digiti.

Intersepientes, vide Hyperochotes.

Interseptum, ea est pars narium, quæ alas, seu pinnulas narium nominatas, discriminat, lib. Introd. cap. 10.

Interstitium est duodecim horarum spatium, in quo febris terminatur, 2. cris. 9.

Intertrigines, vide Hidroa.

Interuallum, vide Ictus, Ablatio.

Intestinum, vide Entera.

Intestinum cæcum τυφλόν, est intestinum à Ventriculo, ordine quartum, quod quidem uelut uenter est, unde figura a reliquis differt, nec enim ut reliqua oblongum est, sed in modum ventriculi rotundius, ex qua figura efficitur, ut una tantum parte pertusum uideatur, & uno foramine tanquã oculo pradiatum esse; peruium tamen est, quodq; ad ipsum ex tenui intestino descendit facile in Colon delabatur.

Intestinatorum difficultas, est uelox exitus eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deijciuntur, qualia fuerunt deuorata, 4. aph. 12. quæ & lientheria dicitur, 6. de loc. aff. 2. quæ duabus potissimum notis à Coliaca dispositione discernitur, si quidem lienthericis alimenta prorsus cruda, protinus ut sumpta sunt infernè prodeunt, tanta, tamq. manifesta cruditate, ut alimenti assumpti genus aperte dignoscatur; uerum in Coliacis iam adepta sunt aliquam coctionem, & diutius in ventriculo morantur, neque tam cito per aluum descendunt. Cruda tamen sunt, & aliquando fatida, non mordacia, sed sepe animi deliquium in ducunt.

Intumescencias, quas *ἰσχυρά* Græci uocant, Hippocr., omnes tumores præter naturam hoc nomine vocare consuevit; cum cæteri posteriores, in inflammationes, & durities, & intumescencias, eos distinguant, 3. de his quæ in med. 30.

Inuiolata membrana, vide *Membrana dura*.

Inniscatio oculi est quadam viscositas, palpebram cum pupilla iungens, siue in eius albedine, siue in eius nigredine, vel utrasque palpebras simul iungens, qualis fit propter vulnera in oculis, lib. de ocul. cap. 9.

Inuolucrū Cordis, vide *Membrana Pericardias*, lib. de ven. & art. diss. cap. 2.

Inuolutum intestinum, quod & *Ileon* & *tenue* dicitur, vide *Ileon*, & *Tenue*.

Inustio in uentre oritur, propter acrem eorum quæ ingestæ sunt caliditatem, ob quam & febris contingit, colloquatio uerò fit, absumpta, contabescitq. propter febrem morosam, vel pinguedine, vel molli carne, 4. acut. 112.

Ionthos Græce, Latine *Varus*, tumor parvus & durus, in faciei cute ortus, a crasso uidelicet succo congregatus, 5. de comp. med. loc. c. 3.

Iris oculi quem alij *Stephanon*, alij *Coronam* uocant, est medius ille oculi locus, quo committuntur inter se tunica uniuersæ 14. met. 19. siue iris est oculi tunica mollissima, alba, desinens in circulo, ubi & alia omnes subiectæ sunt, ubi album nigro coniungitur, 10. de usu par. c. 2. inditum nomen, ab arcus cælestis similitudine.

Isatodes bilis, uide *Bilis pallida*.

Ischias, & *Ischion*, vide *Coxa*, & *Arthritis*, 2. meth. 2. & 19. de usu par. 8.

Ischiadica vena est, quæ superne descendens, ad partem cruris syluestrem tendit, quæ occultatur, quousque ad mal-
leolum

leolūueniat exteriorē, lib. de anat. vii. quæ uena, exterior Malleoli dicitur, & Ischiadica, quod secta Ischiadicis conferat.

Ischama medicamentum est ad sanguinem continendū, 5. de comp. med. loc. c. 14. Græce ἰσχάμων, paulò diuersum ἀπὸ τοῦ ἰσχύμω, hoc enim non sanguinem modo suppressit, sed & inflammationem arceat, illud uerò rationem habet tantum sistendi sanguinem.

Ischuria ἰσχρία, est urina suppressio & retentio, Dysuria, in qua urina fertur cum difficultate, Stranguria cum guttatim distillat, quam & urina stillicidium appellant, de const. art. 6. & 8. de placit. 6. Fit autem urinae suppressio, vesica, uel excernere non valente, uel eius collo occulto; vocat autem vulgus medicorū, non secus Ischuriā, quamquam Ischuria non sit, illud quoque symptoma, cum urina in vesicam omnino non uenit, perdita scilicet renum actione, & permittendi profecto sunt ita nominare, cum propriam appellationem non habent; Cellum siquidem vesicæ clauditur, uel propter obstructionem à sanguine concreto, tum crasso pure, tum calculo, tum topho, tum aliquo germine ibidem enato, uel propter conniuentiam, ab aliquo tumore præter naturam, aut cum immodicè est repleta 3. de sympt. caus. c. 2.

Isis emplastrum, est Cephalicum emplastrum, 2. de cõp. med. per gen. cap. 18.

Isthmus est regio communis gula, & gutturi, in qua utrinque osculum ascendit, angusta & longa, corpus uerò hunc locum ambiens, Pharynga. i. fauces vocant, lib. de musc. diff. cap. 15. Isthmus ea pars corporis est, quæ os, & gulam interiacet, quæ per metaphoram quandam ita nominatur ab ijs, qui propriè dicuntur Isthmi; sunt autem angusti quidam terræ processus, inter duos maria sitī: Unde

Pari-

Paristhymia, i. Tonsilla sunt inflammationes locorum, ad hunc Isthmum persinentium, 2. aph. 26. qua ratione ἰσθμὸς καὶ παρυς, idem erunt, hoc est, qua inter Stomachum, & laryngem, i. guttur, interiaces latitudo.

Isthmoidea ossa, vide Cauernosa.

Iudicium, siue indicatio, vide Crisis.

Iudicatoria signa ab Hippoc. vocata sunt, sudores, rigores, sanguinis fluxus, multum alui profluvium. similis uomitus, dolor capitis repente inuadens, uehemens spirandi difficultas prater rationem, cordis morsus, quadam in Hypochondrijs citra dolorem tensio; vigilię uehementēs, delirium, nox absque ratione molesta, accessio anticipans, lacrymę inuoluntaria nihil patientibus oculis; neque ex tristitia prouenientes, rubor faciei, labrum inferius agitatū, liuida, uel obscura, & tenebrosa quędam ante osnlos obseruantia, hallucinationes quędam male, uel nasus repente rubescens, parotides, aut omnino, alicuius in articulum decubitus generatio, & similia. quę secundum eorum substantiam Casus nominata, quatenus subitam mutationem ostendunt, Iudicatoria signa appellantur; ita enim morbum iudicant, ut cōfēto morbo futuram sanitatem; crudo autem uel perniciem, uel morbi longitudinem decernant, 1. aph. 12. vide Decretorius.

Iugale os, vide Zygoia.

Iugulares venę, Σφῆγίτις φλέξ, sunt duorū magnę Venę caua a gibbis hepatis exarte postq̃ ad dextrā Cordis aurē sanguinē tulerint, ab eo tamq̃ ab initio progressę, ad collū recto tramite festinantes. In quo sunt duę magnę, & insignes venę, q̃ ob id Iugulares vocantur, 2. acut. 10 & li. de ven. & art. diff. c. 7. quę dicuntur externę, superficiarię Apoplectics, Guidex, manifestę, a quibus superficiaria fere omnes collū, & capitis partes nutriuntur, 2. acut. 19.

I n g u a

Iugulum, vide Claves.

Iuleb, vide Zulapium.

Iuxtangina, id est Cynanche, 1. aph. 12.

Ixia, Varices, sic dicuntur ab Aristotele, ἰξίαι; sunt tamen qui differre putent, vocantes κιρῶδες, venas omnes dilatatas, in quacumque corporis parte, ἰξίαι; Verò, eas modo quæ in cruribus habentur, sed discrimen nullū censendū est.

L

L A B O R ab Hipp. sæpius consuevit sumi pro exercitatione, interdum pro dolore, aut absolute pro qualibet noxa, com. 5. in 6. de morb. vulg. 10.

*Labrum, siue labium χεῖλος, est oris extremitas muscu-
losa, ipsum vicissim claudens, & aperiens, quod in labijs
prominet πρὸ χειλὸν dicitur, 11. de usu par.*

Labyrinthus, vide Cecum foramen.

*Lactes, apud Hermolaum Barbatum, & Plinium, signi-
ficant molliora intestina, quæ primum in homine, & oue
occurrunt, per quæ cibis labitur; sed apud Aristotelem, Gazæ,
Budeum, & Galenum. 5. de loc. aff. cap. 7. significat Mesen-
terium, id est pingue illud quod intestina superiora ambit;
quod nostrates in piscibus lactantias, & lactumas vocant,*

Lacuna, vide Choana,

*Læues arteriæ sunt, quas omnes natura per anastomosis,
ad vnum principium applicuit, sinistrum Cordis ventricu-
lum, in quo natiui caloris est principium, ut per eas refrigera-
tio cōtinua Cordi cōparetur, 7. de usu pa. c. 6. vide Arteria.*

*Lauitas intestinorum, quæ Λαγντέρια dicitur, est velox,
& sine vlla omnino transmutatione, ciborum deiectio,
aut propter exulcerationem, in superficie ventriculi, aut
intestinorum, aut propter potentiæ retentricis imbecilli-*

tatem; quorum primum ex mordacibus substantiam tenuē habentibus humoribus fit, quæ in pueris, Græco uocabulo *Aphta*, i. oris ulcera nominantur; alterum verò ex magna ventriculi, atque intestinorum prouenit intemperie, 3. *aph.* 22. vide Intestinorum difficultas.

Lagochilos, vide *Lagophthalmos*.

Lagonas, vide *Ile*.

Lagophthalmos, i. *Leporinus oculus*, estq; cum superior gena adeò retrahitur, ut oculum, dum clauditur, totum non contegat, estq. affectus in partibus instrumentalis, non magnitudine, sed defectu alienus, non ut superuacaneū, sed ueluti deficiens, cuiusmodi mutila, & curta omnia, sicut in labris & oculis cernitur; sic etiam *lagochilos* dicitur, qui *leporina* habet labia, lib. *Introd.* c. 3. & lib. *finit*.

Lambdoides sutura capitis posterior est, & transuersa, qua occiput incipit, quæ à *lambda* literæ Græcæ similitudine nominatur, lib. *de ossib.* cap. 1.

Lambdoides os, vide *Hyoides*.

Laminas communi uocabulo *Anatomici* appellare consueverunt, instrumenta secandi corpora, *scalpella*, *spatula*, *amphismelas*, *spicilla*, *oricularia*, *melotidas*, quæ, et ex ligno densiori, & aliquando ex buxo, confici solent, 9. *de anat. adm.* cap. 10.

Lana succida, id est non lota, quæ & *æsyperon* dicitur, 14. *meth.* cap. 7.

Laparon, Græcis molle & vacuum. *Hypolaparon* autem subuacuum & submolle significat, 3. *de diffi respir.* c. 12. aliquando verò *lapara* ventris dolorem significant, 10. 3. in 6. *de morb.* 3 2 vide *Ile*.

Lapideum os, vide *Lithoides*.

Lapis specularis, vide *Diaphanes*.

Lapis in vesica propria passio eorum est, qui ob edacitatem

tatem non paucos crudos humores coacervant ; ex quibus pars crassior unda cum urinis ad vesicam perveniens, fit lapidū generationis materia; acervatur verò hic crudus humor, sepe ob edacitatē & ingluviem, ut in pueris. saepe ob potentiae concoquentis imbecillitatem, ut in senib. 3. aph. 26.

Larynx, siue guttur est superior bronchi terminus seu bronchi caput, prima aspera arteriae pars, primum vocis instrumentum, summo ori continua, lib. de vocal. instr. diff. c. 2. ex cartilaginibus, musculis, nervis, & substrata membrana constans, c. 4. quae collo extare apparet, tangētibusque dura sentitur, sursumq. nobis transglutientibus fertur, 7. de usu par. c. 5. Λάρυγξ Græcè.

Lassitudines Κόπης, Græci homines vocāt affectus ex multo, vehementiue motu corporibus vel totis, vel particulis, quæ amplius laborarunt, oborientes, unde Acopa medicamenta, quæ talem lassitudinem tollunt, appellantur, 7. de comp. med. per gen. cap. 11 Cuius lassitudinis species tres sunt, ἡ λυαδὴς, τὸν ἀδὴς, φλεγμονώδης, ulcerosa, tensiva, inflammatoria; quæ notis distinguuntur; in ulcerosa lassitudine, ulceris sensus cum moventur, se exhibet, intensiva, incendi, tendiq. sibi videntur, qui laborant, in inflammatoria, accendi, & inflammari.

Lateralis morbus, vide Pleuritis.

Latum os, vide Dorsum.

Latus musculus, siue musculosa natura, vel substantia, ἢ μυοειδὲς πλάτυσμα, apud Gal. lib. de muscul. diff. cap. 1. est latus ille musculus, qui sub cute in collo habetur, qui incipit in priori quidem parte ex labrorum, ac buccarum, in posteriori verò ex spinæ regionibus toti cuti, quæ circa cololum est, in orbem subtensus, memerosusq. existens, ut interdum membrana potius, quàm musculus videatur. Sed apud eundem, 5. de anat. adm. cap. 6. latus musculus est,

N 2 qui

qui totius frontis cutis, connatus subijcitur.

Latus pulsus est, qui pulsu naturali, in latitudine maior est, longus qui in longitudine, altus qui in profunditate; è cōtra, angustus, brevis, humilis, de puls. ad Tyron. cap. 2.

Laxius intestinum, id est Colon, 2. aph. 40.

Lea, seu lenia medicamenta sunt, quæ partes asperas leniunt, de Dynam. in proœmio.

Lemmata sunt propositiones per se credibiles, quas vocare consuevit Aristoteles, dignitates, vel proloquia, vel postulata, 2. acut. 20.

Leno, siue Linon, Græcè Λινὸν est regio quadam in summo vertice Cerebri, ubi duæ venæ inuicem congregiuntur, à torcularis similitudine propter tenuem membranam. Est & alius leno, id est exilium in superficie venarum sibi incumbentium congressus. propter crassam membranam, similiter factus, 9. de anat. adm. cap. 1. vide Torcular.

Leporinus, vide Lagophthalmos.

Lepidoides sutura Λεπιδόειδης, vel conglutinationes (quas Galenus suturas iuxta aures vocat) sunt duæ lineæ à media sagittali. quæ recta in longitudinem fertur, aequè distantes, per capitis longitudinem à posteriore in priorē partem, super aures feruntur, quæ in ossibus ad squamæ similitudinem structis, habentur, quæ fiunt duobus inter se ossibus coherentibus, non per suturam quidem, sicuti Coronalis, & Lambdoides, sed paulatim syncipitis os, instar squamæ attenuatum descendit, atque in id os, quod infra ab auribus ascendit, subintrat, lib. de ossib. c. 1. quæ & squamosa agglutinationes nūcupantur, 9. de usupart. c. 18. mendosa adhuc, & temporales dicuntur.

Lepra λέπρα, est cutis mutatio, in habitum qui præter naturam sit, cum asperitate, & pruritibus, & doloribus, nonnunquam & squamis. decidentibus, interim secus, pluresq.

resq. corporis partes depascitur, lib. finit. lepra & Psora, seu scabies, affectus sunt valde affines & congeneres, ut nō aliud Psora sit, quā mitior lepra, est enim psora ad leprā praviā, ut lepra ad Elephātiāsim, si magis humor uratur, malignior euadat, & morbus diutius protrahatur. Vterque affectus pruritus habet inseparabilem, sed in lepra tantus est, ut ager etiam vehementissimē scalpendo, nullo modo inuenitur, sed omnis potius generis ulcera, & phlegmonas accersat, quod cutem exasperet, & subiectam illi carnē, multo quā in psora profundius; Vnde & squamulas procreat, quales in psora non generantur, quę furfuracea tantum corpora ex se remittit, ut quę à minori gignatur intēperie, & humore minus crasso, terrefieri & maligno. Dicitur Δεπρά, ab his squamulis, quasi Δεπρά, i. squamosa; Ab Anicenna dicitur albaras nigra, & Impetigo excorticatiua, quod cutis per cortices squamasq. resoluatur. Leprā hāc Celsus vocat Impetiginem, non eam quidē quā superius nos Λείχλω appellauimus, sed quam ipse declarat lib. 5. quam in quatuor species distinguit, quę à superiori Impetigine plurimū distat.

Lethargus Græcè Λήθαργος καὶ ληθάργια, passio est Phrenitidi cōtraria, si quidem in ea marcor, & inexpugnabilis dormiendi necessitas adest, sic dicta, quod ea correptis omnium rerum obliuio accidat. Somnus, si quidem, si longius producat, difficilemque habuerit expergesactionem Coma dicitur; si verò solo tempore naturæ modum conuenientem excesserit, & non habuerit difficilem expergesactionē, somnus longus rectē nominatur, qui sit refrigerata prima parte sensitiua, hoc est Cerebro ipso; quę refrigeratio cum fortis fuerit, mista quidē humiditati facit lethargicas passiones, cum siccitate verò eas quę Græco vocabulo Catalepsis, id est Deprehensiones vocantur, 2. aphor. 3.

Leuce Ἀλβὴ, i. alba *Vitiligo*, 2. met b. 2. seu corporis, & pilorum in album colorem mutatio, prater naturam, li. finit. & 1. de comp. loc. 1. neque verò ad solam cutem, sed ad subditam eius carnē vitium hoc pertinet. fitq. cutis, & caro alba, & pituitosa, qualem *Polypodes* & *locustæ*, ceteraque crustacea, ex angui, & alba carne prædita obtinēt. Idq. malum videtur esse, quod nostrates lepram albam, *Anicenna*, albaras album nuncupavit; Differt à lepra, & *Elephantiasi*, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis: leuce verò cutem habeat lenem sine ulla aspredine & rosione.

Leucoma, Λευκίμα, i. oculorum albugo, de remed. par. fac Estq. cicatrix oculorum altior, magisq. profunda; nam quæ superficialis est resipior dicitur.

Leucoplegmatia, i. alba pituita quadam aqua inter cutem, species est, vel quod sit etiam aliqua pituita liuida, vel quod sui quidem ratione semper sit alba, sed propter mistionem quorundam aliorum humorum, verum mutet colorē, 7. apher. 29. quam eandem dicit esse cum ea *Hydropis* specie, quæ *Hypofarcidiū*, sine *Anasarca* dicitur, Ὑδρῶς φάρκιδις, lib. 7. introd. cap. 13.

Lichene affectio, vide *Impetigo*.

Lien, vide *Splen*.

Lienteria, vide *Intestinorum difficultas*.

Ligamentum, quod Græci Σύνδεσμος vocant, est corpus nervosum, ex osse quidem omnino ortum habens, insertum in os, aut in musculum, cui nomen ab usu est inditum, 1. de motu musc. c. 1. quod & *Copula* dicitur, lib. Tegni, cap. 9.

Ligatio, i. obstructi articuli, & difficiles artuum motus, quos Græci *Ancylas* vocant, 7. de comp. med. per gen. c. 6. Est & affectus qui interdum naturaliter accidit, membranæ linguam continentibus durioribus & brevioribus statim

tim à primo ortu factis, Interdum ex acquisitio, ob cicatricem quampiam duriorē, sub ipsa ex ulcere contracta; Quam Græci ἀγκυλώτισσιν vocant, qui hoc malo laborāt, tarde sermonem explicare incipiunt; Atque ob id hoc vitij genus, Latinis ligatio lingua dici potest.

Lingula, vide Epiglottis.

Linon, vide Leno, & Torcular.

Linospermon, i. semen lini, 1. de alimen. fac. 32.

Lipodermus, id est (translatō ad morbum nomine) appellā, defectus est pellicula tegentis glandem Colis, adeo, ut distrahi amplius non possit, lib. finit.

Lipopsychia, i. animi deliquium, idem quod Lipothymia, Λιποψυχία καὶ λιποθύμια, solo differunt, quod & si ex ipso nominis Etymo Lipothymia, vitalis facultatis defectum, Lipopsychia animalis facultatis exolutionem significet, at tamē utriusq; facultatis defectu, omnium uirtutum exolutio contingit, ut sensu, motuq; destituantur egri, non minus q̄ animo, quale aduenit ijs qui nisi frequentius nutriantur, resoluuntur; unde aliud est a syncope, 12. meth. ca. 5.

Lipothymia, vide Lipopsychia.

Lippitudo oculi est, cum album rubescit, & palpebra attolluntur cum dolore conniunt, & egrē manus admotas ferunt, lib. Introd. c. 15. vide Ophthalmia.

Lippitudo dura, vide Sclerophthalmia.

Liquabilia medicamenta vocantur, tum quæ ignis commercio colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, vino; Igne liquefcit propolis, cera, resina, ladanum, senum, chalbanū; Aceto citra ignem, ammoniacum, sagapenum, oppoponacum, 3. de comp. med. per gen. c. 5.

Liquida aluus, in qua liquida deiciuntur, com. 2. in 2. prorrhet. 3.

Lithiasis, i. calculi morbus, renibus adueniens in quibus

bus generatur, lib. de renum aff. digno. cap. 2. Et si quidam $\lambda\iota\theta\iota\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ dicant esse calculi generationem in uesica, quāvis ille etiam in renibus generari possit; Dicitur & $\lambda\iota\theta\iota\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in qua alba quaedam & crassa callis, aut lapillis similia apparent, oculum pungentia.

Lithoides os, $\lambda\iota\theta\omicron\iota\epsilon\iota\delta\iota\varsigma$. i. lapideum, 9. de usu part. c. 10. est quod utrinque ad aures positum, petrę speciem referens, lambdoides sutura finibus terminatur, in quo inest processus columnę similis, ad acus, styliue similitudinem, unde Styloides, Belenoides, & Graphioides $\sigma\iota\lambda\omicron\iota\epsilon\iota\delta\iota\varsigma$, $\beta\epsilon\lambda\omicron\omicron\omicron\iota\epsilon\iota\delta\iota\varsigma$ & $\gamma\rho\alpha\phi\iota\omega\iota\epsilon\iota\delta\iota\varsigma$ appellatur, sub quo auditorius meatus continetur. lib. de offib. cap. 1.

Lobi, i. fibrę, quibus tamquam digitis Hepar ventriculorum, & Pulmo Cor ad unguem complectitur, 4. de usu part. c. 8. & lib. 7. c. 10. & 7. de anat. adm. c. 11. Dicitur & lobos, ima & carnosae aurium pars.

Localia medicamenta, quę Topica dñr, medicamenta sunt, quę extrinsecus applicantur corporis particulis, quib. non prius utendum, quā totum corpus purgaueris. si redundantia in toto corpore subest, alioquin, implebis potius corpus, quā uacuabis. 13. meth. 22.

Lochia, $\lambda\omicron\chi\epsilon\iota\alpha$ dicuntur omnia, quę à puerpera post factum & secundas exeunt, quę Arist. vocat purgamenta, sunt autem reuera $\tau\alpha\ \kappa\alpha\tau\alpha\mu\upsilon\upsilon\iota\alpha$, à quibus tamen sola ratione differunt, quod hæc ante partum, illa post partum, sic appellantur, lib. de atra bile, cap. 8.

Locus à recentioribus medicis, corporis particula qualibet appellatur, 1. de loc. aff. 1.

Longaon, siue longanon intestinum, vide Rectum.

Longitudinalis sutura est, quę à medio posterioris Calvaria per capitis longitudinem ad mediam usque anteriorem,

tem, extenditur, unde Græcis ὀβελαίας, i. recta, vulgò sagittalis, & longitudinalis appellatur à lambdoide ad Coronalem finiens, lib. de ossib. c. 1.

Longus pulsus, vide *Latus*.

Lopidoides satura, quæ & lepidoides, vide *Lepidoides*.

Lordosis, id est excavatio facta per uertebraum luxationem, ad internas corporis partes, 4. de loc. aff. vide *Cyphosis*.

Lotium est, cum renes serosum sanguinis extremētum attraxerint, utilem qui in eo est sanguinem retinent, & ex eo nutriuntur, excrementum verò ipsum serosum à facultate segregatrice, cœu inutile expellitur, sed quoad in uenis atque arterijs hoc cum sanguine currit, excrementum serosum, cum segregatum est lotium & urina dicitur, li. de ren. aff. dign. cap. 1.

Luctuosa respiratio est, interrupta inspiratio, stante interim thorace, deinde rursus id quod deest adijciente, qualis infantibus accidit, quo tempore plorant, quæ est duplex intus aeris reuocatio, uelati superinspirantibus, 6. aph. 54.

Lumbrici, vide *Elminthes*.

Lumbi, ὀσφύς, propriè pars est totius spinæ, quinque vertebris omnium crassissimis, maximisq. compacta, inter dorsum, & os sacrum medijs, estq. dorso ea pars qua cingimur, vide *Dorsum*.

Lupus, Græcè λύκοειδής, seu strangulator dicitur, affectus ijs eueniens, qui sperma diu præter naturam retinuerint, quod ueneni naturam sapiens crescensq. in uenis & arterijs, dum nequit descendere in sanguinis massam, nimiam generat passionem in fancibus, quasi suffocando, lib. de spermat. fol. 36.

Lusciosus dicitur, qui eo affectu qui Nyctalops dicitur, vexatur, 19. de simplic, Μύωψις dicitur, qui à pri-

mo ortu, oculis propius admota videt, eaq; propè oculis contingit, & limis semiclusisq; oculis aspiciit, etiam si parua sint; remota verò quamuis magna, videre non potest. Vitium oculorum est congenitum ab imbecillitate spiritus visui, eamq; ob causam incurabile, eo differt à Nyctalope, qui non natura, sed ex morbo talis euasit Μύπας Græci vocant, quos minus videntes, Latini Lusciosos, & Nuscitiosos, appellant, ipsa verò affectio μυώπια, & μυωπίας appellatur.

Lutea bilis, id est Vitellina, 8. de placit. 4. vide Bilis pallida.

Luxationes, quas excidentias, exarticulationes, & exarticulata interdum vocat Hippoc. sunt ossium à propria sede excessus, qui sine fractione fiunt, 1. de fract. 1.

Lycanthropia, Græcè Λυκανθρώπια, Λυκανθρώπιον, Κυνανθρώπια Κυνόθρωπον, Λύκων. Arabice Catrab, Cuntubut; Latine Lupina, vel Canina insania species est melancholiæ, ut testantur Aetius & Paulus, qua agri mense Februarij, quo præsertim humor melancholicus redundat, noctu domo egressi, urbem circumeunt, quadrupedum more incedentes, lupos imitantur, ululantes, donec dies illucescat, defunctorum monumenta queritant, adaperiunt, cadaverum frustra arripiunt, secumq; collo gestantes, fugiuntq; die viuos homines, nocte insequentes mortuos.

Lycoides, vide Lupus.

Lyparia febris, vide Febris lyparia.

Lysberia, id est solutoria signa, quæ magni, & vehementis morbi solutionem firmam solent præcedere, 1. de diebus decret. c. 1.

M

MADAROSIS, *Madapórtis* ñ *Madépórtis*, id est, Glabrities, Caluitium, capillorum defluuium est, à vitiosis humoribus proueniens, sicut quæ Ophiasin, & Alopeciam nominant; qua omnes passionēs sanabiles sunt, vitiosis humoribus, qui ad radices capillorum hærebant, vel resolutis, vel alio translatis; Vnde aliud sunt & Caluitie, 6. aph. 34.

Madorem & Pladorem, id est superfluentes humiditates, appellare consuevit Hippocr. siue ex tenuibus, siue ex crassioribus humoribus consistant, cuiusmodi & pus est, 3. de fract. 19.

Magma, mirabolanorum sæcem vocant, 7. de composit. med. per gen. cap. 7. aliqui verò omnem unguenti sæcem, quæ expressa reliqua liquidiori materia relinquitur μάγμα vocant; extenditur significatum, ad omne unguentum spissum, paucoliquore subactum.

Magna arteria, vide Arteria aorta.

Magna febris, vide Febris magna.

Magnus morbus, vide Affectus grauis.

Magnus pulsus est, qui naturalem omnibus tribus dimensionibus superat, qui verò iisdem dimensionibus à naturali superatur, parvus dicitur, de puls. ad Tyron. cap. 2.

Mala, carne a partes sunt, quæ inter nasum, & aures iacent, quæ priscis Genæ dicuntur, lib. Introd. c. 10. quæ ad mali similitudinem sub oculis leniter rotunda prominent, 1. de artic. 3.

Malaëtica medicamenta, induratorum corporum sunt, ea nimirum, quæ ipsorum solvunt duritiem, quemadmodum & relaxantia quæ tensioni medentur, 7. de comp. med. per gen.

gen. c. 9. *malacticum* autem emolliens dicitur, non omni indurato corpore, sed de eo tantum quod congelatione induruit, magisq. etiam si in eo contentus sit humor præter naturam, velut in Scirrhis, quod verò à siccitate induratum est, humectari postulat, quod à Congelatione calcesceri, Græcè *μαλακτικὰ φάρμακα*, 5. *simpl.*

Malagmata vocant quamplurimi medici omnia phar-maca, quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, quæ vox emolli-tionis significationem habet, verum nos permittemus ipsis etiam si non propriè appellèt, 8. de comp. med. loc. 5. Propriè autem *malagmata* vocantur, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exsiccantia, aut humectantia manifestò. Nam, cum exactè mollientia, medium quodammodo ordinem inter humectantia, siccantiaq. sortiantur, indurescentium substantia veluti fusionem quandam molliuntur, quod nimirum propter moderatum in eis calorem accidit; ubi verò diutius suffusa fuerit, digerentium medicamentorum usus veniat, 7. de comp. med. loc. cap. 1. Vnde quidam nullum discrimen constituunt inter *μαλάγματα*, *εμπλάστρα*, *τροχίσκος*. Verum & *malagmatum* in ijs admonendis differentia est, aut enim medijs corporis regionibus (quæ propriè *πιδίματα*, Paulus appellat) ut ventriculo, iecinori, lieni, cordi imponuntur, aut extremis partibus, aut capiti, & articulis.

Maligna, vide *Cacoethe*.

Malleoli. sunt imæ ab utroque latere tibiæ, suraq; partes gibbæ ex parte exteriori, intrinsecus cavæ carne carentes, extra alia prominentes, sub quibus utrinque talus continetur, tib. de ossib. cap. 22.

Malleoli vena duplex est, altera interna ad interiorem tibia

tibiꝑ partem (cream Latini vocant) procedens, ac inde ad malleolum, ad ipsum tibiæ extremum pervenit, quæ & Saphana corrupto vocabulo, pro Sappea, i. manifesta, dicitur; altera externa, & superficialia per exteriorem alterius ossis tibiæ, quod περόνικον vocant Græci, producitur, ad pedis pertingens articulum, unde externa malleoli, & Ischiadica aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, i. mollicinum, quo genere Hippoc. omne medicamen vocat, quod connatam humiditatē habet, qualis in pingui est, singulisq. oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera, 4. de compos. med. per gen. c. 9.

Malum granatum, & malum punicum, vide Chartilago ensiformis.

Mammæ, (Μασὲς καὶ τῖτθες Græcè) est carnosā in pectore eminentia, ad utrumque latus pectoris glandulosa, semicircularis sita, in cuius medio papilla Græcè Σηλή, extuberat, quam ambit circulus quidam subniger qui ὄμφη dicitur, gignendi lactis vim à natura habens, i. de sanit. tuen.

Mammillaris, Μασοειδής, est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, præsertim vaccinarum, similis; Extuberat, & cavus est, quo aer ampla, & anfractuosa eius cavitate conclusus, magis resonet auribus. Dicuntur, & à quibusdam uteri Cornua Κεραίας vocant μασοειδῆς ἀποφύσεις, propter similitudinem, quam habent cum mammis.

Mancum & Mancinitatem, hoc est Cyllon, & Cyllofin non nulli, de omni longorum membrorum distortionem intelligendum censent, generaleq. ei attribuunt significatum, alij eam tantummodo distortionem significare asserunt, in qua in interiorem partem membrum incli-

natur,

natur, quod cum accidit; necesse est, ut summum eius, i. per intro contortus, quasi mancus & mutilus appareat, 3. de artic. 87. vide Cyllum.

Mandibularij, Manducatorij, Mansorij, Masteteres musculi, Græcè *μαστωτήρες*, alij sunt à temporalibus, quos Crotaphitas vocant; nā posteriores disseñores, eos t'pales, seu temporinos nominant, qui ex ossibus t'pū capitis exoriuntur, quos cum intenduntur, committere, ac claudere os manifestē conspicimus; alios verò qui latis inferioris maxilla partibus superieñi sunt, utrinque alter, propterea quod in manducando, maxillam circumagunt, manducatorios vocant, cum illi qui è superiori parte deferuntur, efficere id minimē ualeant; attrahunt enim sursum eam tantummodo, non traducere etiam hāc illāc queunt; Vnde in committendo quoque ore, ipsorum auxilio indigemus. 2. de arti. 5. à mandendo sic dicti, quos etiam mandibularios masticatorios & mansorios vocant, 4. de anat. adm. cap. 2. & cap. 4.

Mania, furor, insania, Μανία, species Paraphrosines, 2. de caus. sympt. ut enim τῆς παραφροσύνης, seu delirij est citra febrem insanire. & mente alienari, ita si huic insania adiungatur magnitudo, & vehementia symptomatum, ut quod calcitent, mordicus impetant, vel ingredientes, vel quoscunque obuios, ferarum more, mania dicetur, ex affata, uel atra, uel fluxuabile procedens, 3. de loc. aff. Et. cap. 7. quod si à sanguinis copia non putrescente originem ducat, erit quidem mania sed cum riso, bilari vultu, & perpetuo cantu Aliquando Hippocr. mania nomine pro melancholia morbo propriè dicto usurpauit, ut testatur Gal. 6. aphor. 21.

Manifesta uena, ramus est vena à Corde ad furculas ascendens, quæ per faciem, oculos, caput, & nates diuiditur,

ditur, ut omnia membra natriat, quæ inde manifesta vocatur, lib. de anat. viii.

Maniode sunt vehementes infanig, propter atrabilis malignitatem, cum flaua bilis Cerebrum apprehenderit, febrisq. uehementia aſſatum hunc succum melancholicum reddiderit, com. i. in i. prorrh. 10.

Manna, mel roridum, vel aerium dici poteſt; Mellis ſpecies eſt non ignota veteribus Galeno, Plinio, Dioſcoridi, ſed mellis nomine, & titulo comprehenſa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, proditamq. putet; ſic enim de ea ſcriptum reliquit Galenus. In folijs, inquit, ſtirpium adnaſcitur quippiam, quod nec eorū ſuccus, nec fructus, nec pars exiſtimari poſſit, ſed roridum quiddam, nec tamē continēter, neque copioſe prognaſci ſoleat. Nec me præterit, per æſtatem, in arborū, fruticū herbarumq; folijs plurimum fuiſſe inuentū, ſic ut à Iudeis ruſticis Iuppiter diceretur melle pluuiſſe; Præceſſerat tū nox frigoris pridie calida, ſiccaq; cæli cōſtitutio diluxerat; qua propter rerum naturæ peritos conueniebat, halit⁹ quos terra, vel aqua ꝑſpirafſet extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluiſſe. Id i regione noſtra rarius euenit, i Libano mōte quotānis, adeo ut extenſis pellibus arbores ſuccutiant, receptoq. quod profluit, ollas & fiſſilia cōpleant, priuatoq. nomine uocant *προσομέλι*, i. roſcidum mel, & etiam *ἀερομέλι*, id eſt mel aerium. Hac Galenus, 3. de alim. facu. cap. 39. de melle. Cuiq. igitur patere debet, notam Galeno mannam, quæ guſtu prorsus mellea ſentitur. Dicitur item & manna thuris (quæ & ſuccuſſio, & Pollen nuncupatur, 2. de art. 44.) id eſt thuris micæ concuſſu elife, item corticis parum participes, adſtringendi vim totam, & qualitatem poſſidentes, 5. de comp. med. per gen. cap. 2. Videturq. aliquibus

Leuce Λευκή, i. alba *Vitiligo*, 2. meth. 2. seu corporis, & pilorum in album colorem mutatio, præter naturam, li. finit. & 1. de comp. loc. 1. neque verò ad solam cutem, sed ad subditam eius carnē vitium hoc pertinet sitq. cutis, & caro alba, & pituitosa, qualem *Polypodes* & *locustæ*, cæteraque crustacea, ex angui, & alba carne prædita obtinēt. Idq. malum videtur esse, quod nostrates lepram albam, *Anicenna*, albaras album nuncupavit; Differt à lepra, & *Elephantiasi*, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis: leuce verò cutem habeat lenem sine ulla aspredine & rosione.

Leucoma, Λευκίμα, i. oculorum albugo, de remed. par. fac Estq. cicatrix oculorum altior, magisq. profunda; nam quæ superficialia est *επιλειπία* dicitur.

Leucopblegmatis, i. alba pituita quadam aquæ inter cutem, species est, vel quod sit etiam aliqua pituita liuida, vel quod sui quidem ratione semper sit alba, sed propter mistionem quorundam aliorum humorum, verum mutet colorē, 7. apher. 29. quam eandem dicit esse cum ea *Hydropis* specie, quæ *Hypofarcidiū*, siue *Anasarca* dicitur, Ὑδρῶς φάρκιδις, lib. introd. cap. 13.

Lichene affectio, vide *Impetigo*.

Lien, vide *Splen*.

Lienteria, vide *Intestinorum difficultas*.

Ligamentum, quod Græci Σύνδεσμον vocant, est corpus nervosum, ex osse quidem omnino ortum habens, insertum in os, aut in musculum, cui nomen ab usu est inditum, 1. de motu musc. c. 1. quod & *Copula* dicitur, lib. Tegni, cap. 9.

Ligatio, i. obstructi articuli, & difficiles artuum motus, quos Græci *Ancylas* vocant, 7. de comp. med. per gen. c. 6. Est & affectus qui interdum naturaliter accidit, membranis linguam continentibus durioribus & brevioribus statim

tim à primo ortu factis, Interdum ex acquisitio, ob cicatricem quampiam duriorē, sub ipsa ex ulcere contracta; Quam Græci ἀγκυλώτιστον vocant, qui hoc malo laborāt, tarde sermonem explicare incipiunt; Atque ob id hoc vitij genus, Latinis ligatio lingua dici potest.

Lingula, vide Epiglottis.

Linon, vide Leno, & Torcular.

Linospermon, i. semen lini, 1. de alimen. fac. 32.

Lipodermus, id est (translato ad morbum nomine) appellatus, defectus est pellicula tegentis glandem Colis, adeo, ut distrahi amplius non possit, lib. finit.

Lipopsychia, i. animi deliquium, idem quod Lipothymia, Λιποψυχία καὶ λιποθύμια, solo differunt, quod & si ex ipso nominis Etymo Lipothymia, vitalis facultatis defectum, Lipopsychia animalis facultatis exolutionem significet, at tamē utriusq; facultatis defectu, omnium virtutum exolutio contingit, ut sensu, motuq; destituantur egri, non minus q̃ animo, quale aduenit ijs qui nisi frequentius nutriantur, resoluuntur; unde aliud est a syncope, 12. meth. ca. 5.

Lipothymia, vide Lipopsychia.

Lippitudo oculi est, cum album rubescit, & palpebra attolluntur cum dolore conniunt, & egrē manus admotas ferunt, lib. Introd. c. 15. vide Ophthalmia.

Lippitudo dura, vide Sclerophthalmia.

Liquabilia medicamenta vocantur, tum quæ ignis commercio colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, vino; Igne liquefcit propolis, cera, resina, ladanum, sennum, chalbanū; Aceto citra ignem, ammoniacum, sagapenum, oppoponacum, 3. de comp. med. per gen. c. 5.

Liquida aliis, in qua liquida deijciuntur, com. 2. in 2. prorrh. 3.

Litbiasis, i. calculi morbus, renibus adueniens in quibus

bas generatur, lib. de tenuum aff. digno. cap. 2. Et si quidam
autumant hoc aut esse calculi generationem in vesica, quāvis
illuc etiam in renibus generari possit; Dicitur & λιθιάσις
oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in qua alba
quædam & τραβία callis, aut lapillis similia apparent, oculi
tam purgentur.

Lambdoides os, λῦβιδίς, i. lapideum, 9. de usu part. c. 10.
est quod utraque ad aures positum, petreæ speciem refe-
rens. Lambdoides sutura a finibus terminatur, in quo inest
processus columnæ similis, ad acus, styli ve similitudinem;
vnde Styloides, Belenoides, & Graphioides σιλοειδής;
βελανοειδής & γραφοειδής appellatur, sub quo auditorius
meatus continetur lib. de ossib. cap. 1.

Lobi i. fibræ, quibus tamquam digitis Hepar ventricu-
lum, & Pulmo Cor ad vnguem complectitur, 4. de usupar.
c. 8. & lib. 7. c. 10. & 7. de anat. adm. c. 11. Dicitur & λο-
βός, una & cernosa aurium pars.

Localia medicamenta, quæ Topica dñr, medicamenta
sunt, quæ extrinsecus applicantur corporis particulis, quib.
non prius utendum, quàm totum corpus purgaueris. si re-
dundantia in tuo corpore subest, alioquin, implebis potius
corpus, quàm vacabis 13. meth. 22.

Lochia, λῦχια dicuntur omnia, quæ à puerpera post fe-
tum & secundas exeunt, quæ Arist. vocat purgamenta, sunt
autem vetera τὰ καταμνήα, à quibus tamen sola ratione
differtur, quod hæc ante partum, illa post partum, sic ap-
pellentur, lib. de atra bile, cap. 8.

Locus à recentioribus medicis, corporis particula quali
bet appellatur, 1. de loc. aff. 1.

Longæon, siue longæxon intestinum, vide Rectum.

Longitudinalis sutura est, quæ à medio posterioris Cal-
varia per capitis longitudinem ad mediam usque antero-
rem,

rem, extenditur, unde Græcis ὀβελαίας, i. recta, vulgò sagittalis, & longitudinalis appellatur à lambdoide ad Coronalem finiens, lib. de ossib. c. 1.

Longus pulsus, vide Latus.

Lopidoides sutura, quæ & lepidoides, vide Lepidoides.

Lordosis, id est excavatio facta per uertebraum luxationem, ad internas corporis partes, 4. de loc. aff. vide Cyphosis.

Lotium est, cum renes serosum sanguinis extremētum attraxerint, utilem qui in eo est sanguinem retinent, & ex eo nutriuntur, excrementum verò ipsum serosum à facultate segregatrice, cœu inutile expellitur, sed quauddin in uenis atque arterijs hoc cum sanguine currit, excrementum serosum, cum segregatum est lotium & urina dicitur, li. de ren. aff. dign. cap. 1.

Lustuosa respiratio est, interrupta inspiratio, stante interim thorace, deinde rursus id quod deest adijciente, qualis infantibus accidit, quò tempore plorant, quæ est duplex intus aeris reuocatio, uelati superinspirantibus, 6. aph. 54.

Lumbrici, vide Elminthes.

Lumbi, ὀσφύς, propriè pars est totius spinæ, quinque ueræ tebris omnium crassissimis, maximisq. compacta, inter dorsum, & os sacrum medijs, estq. dorsu ea pars qua cingimur, vide Dorsum.

Lupus, Græcè λύκοειδής, seu strangulator dicitur, affectus hys eueniens, qui sperma diu præter naturam retinuerint, quòd ueneni naturam sapiens crescensq. in uenis & arterijs, dum nequit descendere in sanguinis massam, nimiam generat passionem in fancibus, quasi suffocando, lib. de spermat. fol. 36.

Lusciosus dicitur, qui eo affectu qui Myctalops dicitur, vexatur, 19. de simplic. Μύωψ dicitur, qui à pri-

mo ortu, oculis propius admota videt, eaq; propè oculis contingit, & limis semiclusisq; oculis aspicit, etiam si parua sint; remota verò quamvis magna, videre non potest. Vitium oculorum est congenitum ab imbecillitate spiritus visui, eamq; ob causam incurabile, eo differt à Nyctalope, qui non natura, sed ex morbo talis euasis Μύωπας Græci vocant, quos minus videntes, Latini Lusciosos, & Nuscitiosos, appellant, ipsa verò affectio μυωπία, & μυωπίασιs appellatur.

Lutea bilis, id est Vitellina, 8. de placit. 4. vide Bilis pallida.

Luxationes, quas excidentias, exarticulationes, & exarticulata interdum vocat Hippoc. sunt ossium à propria sede excessus, qui sine fractione fiunt, 1. de fract. 1.

Lycanthropia, Græcè Λυκανθρώπια, Λυκανθρώπιον & Κυνανθρώπια Κυν'άνθρωπον, Λυκάνων. Arabice Catrab, Cntubut; Latine Lupina, vel Canina insania species est melancholicæ, ut testantur Aetius & Paulus, qua agri mense Februarij, quo præsertim humor melancholicus redundat, noctu domo egressi, urbem circumeunt, quadrupedum more incedentes, lupos imitantur, ululantes, donec dies illucescat, defunctorum monumenta queritant, adaperiunt, cadaverum frustra arripientes, secumq; collo gestantes, fugiuntq; die viuos homines, nocte insequentes mortuos.

Lycoides, vide Lupus.

Lyparia febris, vide Febris lyparia.

Lysberia, id est solutoria signa, quæ magni, & vehementis morbi solutionem firmam solent præcedere, 1. de diebus decret. c. 1.

MADAROSIS, *Madapórtis* ἢ *Madápórtis*, id est, Glabrities, Caluitium, capillorum defluuium est, à vitiosis humoribus proveniens, sicut quæ Ophiasin, & Alopeciam nominant; qua omnes passiones sanabiles sunt, vitiosis humoribus, qui ad radices capillorum hærebant, vel resolutis, vel alio translatis; Unde aliud sunt à Caluitie, 6. aph. 34.

Madorem & *Pladorem*, id est superfluentes humiditates, appellare consuevit Hippocr. siue ex tenuibus, siue ex crassioribus humoribus consistant, cuiusmodi & pus est, 3. de fract. 19.

Magma, mirabolanorum faciem vocant, 7. de composit. med. per gen. cap. 7. aliqui verò omnem unguenti fecem, quæ expressa reliqua liquidiori materia relinquitur *μάγμα* vocant; extenditur significatum, ad omne unguentum spissum, paucoliquore subactum.

Magna arteria, vide *Arteria aorta*.

Magna febris, vide *Febris magna*.

Magnus morbus, vide *Affectus gravis*.

Magnus pulsus est, qui naturalem omnibus tribus dimensionibus superat, qui verò iisdem dimensionibus à naturali superatur, parvus dicitur, de puls. ad Tyron. cap. 2.

Mala, carne a partes sunt, quæ inter nasum, & aures iacent, quæ priscis Genæ dicuntur, lib. Introd. c. 10. quæ ad mali similitudinem sub oculis leniter rotunda prominent, 1. de artic. 3.

Malaëtica medicamenta, induratorum corporum sunt, ea nimirum, quæ ipsorum solvunt duritiem, quemadmodum & relaxantia quæ tensioni medentur, 7. de comp. med. per gen.

gen. c. 9. *malaesticum* autem emolliens dicitur, non omni in durato corpore, sed de eo tantum quod congelatione induruit, magisq. etiam si in eo contentus sit humor præter naturam, velut in Scirrhis, quod verò à siccitate induratum est, humectari postulat, quod à Congelatione calefieri, Græcè μαλακτικά φάρμακα, 5. simpl.

Malagmata vocant quamplurimi medici omnia phar-maca, quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, quæ vox emolli-tionis significationem habet, verum nos permittemus ipsis etiam si non propriè appellèt. 8. de comp. med. loc. 5. Propriè autem malagmata vocantur, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exsiccantia, aut humectantia manifesto. Nam, cum exactè mollientia, medium quodammodo ordinem inter humectantia, siccantiaq. sortiantur, indurescentium substantia veluti fusionem quandam molliuntur, quod nimium propter moderatum in eis calorem accidit; ubi verò diutius suffusa fuerit, digerentium medicamentorum usus veniat, 7. de comp. med. loc. cap. 1. Unde quidam nullum discrimen constituunt inter μαλάγματα, ἐμπλάστρα, τροχίσκος. Verum & malagmatum in ijs admo- uendis differentia est, aut enim medijs corporis regionibus (quæ propriè πιδέματα, Paulus appellat) ut ventriculo, iccinori, lieni, cordi imponuntur, aut extremis partibus, aut capiti, & articulis.

Maligna, vide Cacoethe.

Malleoli. sunt imæ ab utroque latere tibiæ, suraq; partes gibbæ ex parte exteriore, intrinsecus cavæ carne carentes, extra alia prominentes, sub quibus utrinque talus continetur, lib. de ossib. cap. 22.

Malleoli vena duplex est, altera interna ad interiorem tibiæ

tibiꝑ partem (cream Latini vocant) procedens, ac inde ad malleolum, ad ipsum tibiæ extremum pervenit, quæ & Saphana corrupto vocabulo, pro Sappea, i. manifesta, dicitur; altera externa, & superficiaria per exteriorem alterius ossis tibiæ, quod $\pi\epsilon\pi\omicron\nu\kappa\omega$ vocant Græci, producitur, ad pedis pertingens articulum, unde externa malleoli, & Ischiadica aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, i. mollicinum, quo genere Hipoc. omne medicamen vocat, quod connatam humiditatē habet, qualis in pingui est, singulisq. oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera, 4. de compos. med. per gen. c. 9.

Malum granatum, & malum punicum, vide Chartilago ensiformis.

Mammæ, ($\mu\alpha\sigma\theta\epsilon\varsigma$ καὶ $\tau\iota\tau\theta\epsilon\varsigma$ Græcè) est carnosæ in pectore eminentia, ad utrumque latus pectoris glandulosa, semicircularis sita, in cuius medio papilla Græcè $\sigma\eta\lambda\eta$, extuberat, quam ambit circulus quidam subniger qui $\phi\acute{\omega}\varsigma$ dicitur, gignendi lactis vim à natura habens, i. de sanit. tuen.

Mammillaris, $\mu\alpha\sigma\theta\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, præsertim vaccinarum, similis; Extuberat, & canus est, quo aer ampla, & anfractuosa eius cavitate conclusus, magis resonet auribus. Dicuntur, & à quibusdam uteri Cornua $\kappa\epsilon\rho\alpha\tau\iota\varsigma$ vocant $\mu\alpha\sigma\theta\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ ἀποφύσεις, propter similitudinem, quam habent cum mammis.

Maneum & Mancinitatem, hoc est Cyllon, & Cyllofin non nulli, de omni longorum membrorum distortionem intelligendum censent, generaleq. ei attribuunt significatum, alij eam tantummodo distortionem significare asserunt, in qua in interiorem partem membrum inclinatur,

ditur, ut omnia membra natriat, quæ inde manifesta vocatur, lib. de anat. uiu.

Maniade sunt vehementes insanie, propter atrabilis malignitatem, cum flaua bilis Cerebrum apprehenderit, febrisq. uehementia assatum hunc succum melancholicum reddiderit, com. 1. in 1. prorrh. 10.

Manna, mel roridum, uel aerium dici potest; Mellis species est non ignota veteribus Galeno, Plinio, Dioscoridi, sed mellis nomine, & titulo comprehensa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, proditamq. putet; sic enim de ea scriptum reliquit Galenus. In folijs, inquit, stirpium adnascitur quippiam, quod nec eorū succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed roridum quiddam, nec tamē continēter, neque copiosē prognasci soleat. Nec me præterit, per ætatem, in arborū, fruticū herbarumq; folijs plurimum fuisse inuentū, sic ut à ludentib. rusticis Iuppiter diceretur melle pluuisse; Præcesserat tū nox frigor pridie calida, siccaq; celi cōstitutio diluxerat; qua propter rerum naturæ peritos cōueniebat, halit⁹ quos terra, vel aqua pspirasset extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Idī regione nostra rarius euenit, ī Libano mōte quotānis, adeo ut extensis pellibus arbores succutiant, receptoq. quod profluit, ollas & fīcilia cōpleant, priuatōq. nomine uocant *προσομέλι*, i. roscidum mel, & etiam *ἀερομέλι*, id est mel aerium. Hac Galenus, 3. de alim. facu. cap. 39. de melle. Cuiq. igitur patere debet, notam Galeno mannam, quæ gustu prorsus mellea sentitur. Dicitur item & manna thuris (quæ & succussio, & Pollen nuncupatur, 2. de art. 44.) id est thuris micæ concussu elise, item corticis parum participes, adstringendi vim totam, & qualitatem possidentes, 5. de comp. med. per gen. cap. 2. Videturq. aliquibus

Leuce Λευκή, i. alba Vitiligo, 2. meth. 2. seu corporis, & pilorum in album colorem mutatio, prater naturam, li. finit. & 1. de comp. loc. 1. neque verò ad solam cutem, sed ad subditam eius carnē vitium hoc pertinet. fitq. cutis, & caro alba, & pituitosa, qualem Polypodes & locustæ, ceteraque crustacea, ex angui, & alba carne prædita obtinēt. Idq. malum videtur esse, quod nostrates lepram albam, *Anicenna*, albaras album nuncupavit; Differt à lepra, & Elephantiasi, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis: leuce verò cutem habeat lenem sine ulla aspredine & rosione.

Leucoma, Λευκίμα, i. oculorum albugo, de remed. par. fac Estq. cicatrix oculorum altior, magisq. profunda; nam quæ superficialis est *lepilior* dicitur.

Leucopblegmata, i. alba pituita quædam aquæ inter cutem, species est, vel quod sit etiam aliqua pituita liuida, vel quod sui quidem ratione semper sit alba, sed propter mistionem quorundam aliorum humorum, verum mutet colorē, 7. apher. 29. quam eandem dicit esse cum ea *Hydropis* specie, quæ *Hypofarcidiū*, sine *Anasarca* dicitur, Ὑδρῶς φάρκιδις, lib. 1. introd. cap. 13.

Lichene affectio, vide *Impetigo*.

Lien, vide *Splen*.

Lienteria, vide *Intestinorum difficultas*.

Ligamentum, quod Græci Σύνδεσμον vocant, est corpus nervosum, ex osse quidem omnino ortum habens, insertum in os, aut in musculum, cui nomen ab usu est inditum, 1. de motu musc. c. 1. quod & *Copula* dicitur, lib. Tegni, cap. 9.

Ligatio, i. obstructi articuli, & difficiles artuum motus, quos Græci *Ancylas* vocant, 7. de comp. med. per gen. c. 6. Est & affectus qui interdum naturaliter accidit, membranis linguam continentibus durioribus & brevioribus statim

tim d primo ortu factis, Interdum ex acquisitio, ob cicatricem quampiam duriores, sub ipsa ex ulcere contracta; Quam Græci δγκυλώτισσον vocant, qui hoc malo laborāt, & de sermonem explicare incipiunt; Atque ob id hoc vitij genus, Latinis ligatio lingua dici potest.

Lingula, vide Epiglottis.

Linon, vide Leno, & Torcular.

Linospermon, i. semen lini, 1. de alimen. fac. 32.

Lipodermus, id est (translato ad morbum nomine) appellatus, defectus est pellicula tegentis glandem Colis, adeo, ut distrahi amplius non possit, lib. finit.

Lipopsychia, i. animi deliquium, idem quod Lipothymia, Λιποψυχία καὶ λιποθύμια, solo differunt, quod & si ex ipso nominis Etymo Lipothymia, vitalis facultatis defectum, Lipopsychia animalis facultatis exolutionem significet, at tamē utriusq; facultatis defectu, omnium virtutum exolutio contingit, ut sensu, motuq; destituantur egri, non minus q̄ animo, quale aduenit ijs qui nisi frequentius nutriantur, resoluuntur; unde aliud est a syncope, 12. meth. ca. 5.

Lipothymia, vide Lipopsychia.

Lippitudo oculi est, cum album rubescit, & palpebra attolluntur cum dolore conniunt, & egrē manus admotas ferunt, lib. Introd. c. 15. vide Ophthalmia.

Lippitudo dura, vide Sclerophthalmia.

Liquabilia medicamenta vocantur, tum quæ ignis commercio colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, vino; Igne liquefcit propolis, cera, resina, ladanum, seuum, chalbani; Aceto citra ignem, ammoniacum, sagapenum, oppoponacum, 3. de comp. med. per gen. c. 5.

Liquida aluiis, in qua liquida deijciuntur, com. 2. in 2. prorrh. 3.

Lithiasis, i. calculi morbus, renibus adueniens in quibus

bus generatur, lib. de renum aff. digno. cap. 2. Et si quidam λιθιάσιον dicant esse calculi generationem in vesica, quāvis ille etiam in renibus generari possit; Dicitur & λιθιάσις oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in qua alba quaedam & crassa callis, aut lapillis similia apparent, oculum pungentia.

Lithoides os, λιθοειδής. i. lapideum, 9. de usu part. c. 10. est quod utrinque ad aures positum, petreæ speciem referens, lambdoides suturæ finibus terminatur, in quo inest processus columnæ similis, ad acus, Stylive similitudinem, unde Styloides, Belenoides, & Graphioides σιλοειδής, βελονοειδής & γραφιοειδής appellatur, sub quo auditorius meatus continetur. lib. de ossib. cap. 1.

Lobi, i. fibræ, quibus tamquam digitis Hepar ventriculum, & Pulmo Cor ad unguem complectitur, 4. de usu part. c. 8. & lib. 7. c. 10. & 7. de anat. adm. c. 11. Dicitur & lobos, ima & carnosæ aurium pars.

Localia medicamenta, quæ Topica dñr, medicamenta sunt, quæ extrinsecus applicantur corporis particulis, quibus non prius utendum, quàm totum corpus purgaueris. si redundantia in toto corpore subest, alioquin, implebis potius corpus, quàm uacuabis. 13. meth. 22.

Lochia, λιχία dicuntur omnia, quæ à puerpera post partum & secundas exeunt, quæ Arist. vocat purgamenta. sunt autem reuera τὰ καταμνία, à quibus tamen sola ratione differunt, quod hæc ante partum, illa post partum, sic appellantur, lib. de atra bile, cap. 8.

Locus à recentioribus medicis, corporis particula qualibet appellatur, 1. de loc. aff. 1.

Longæon, siue longæon intestinum, vide Rectum.

Longitudinalis sutura est, quæ à medio posterioris Calvaria per capitis longitudinem ad mediam usque anteriorem,

sem, extenditur, unde Græcis ὀβελαιας, i. recta, vulgò sagittalis, & longitudinalis appellatur à lambdoide ad Coronalem finiens, lib. de ossib. c. 1.

Longus pulsus, vide Latus.

Lopidoides sutura, quæ & lepidoides, vide Lepidoides.

Lordosis, id est excavatio facta per vertebrarum luxationem, ad internas corporis partes, 4. de loc. aff. vide Cyphosis.

Lotium est, cum renes serosum sanguinis extremētum attraxerint, utilem qui in eo est sanguinem retinent, & ex eo nutriuntur, excrementum verò ipsum serosum à facultate segregatrice, seu inutile expellitur, sed quoad in venis atque arterijs hoc cum sanguine currit, excrementum serosum, cum segregatum est lotium & urina dicitur, li. de ren. aff. dign. cap. 1.

Luctuosa respiratio est, interrupta inspiratio, stante interim thorace, deinde rursus id quod deest adijciente, qualis infantibus accidit, quo tempore plorant, quæ est duplex intuitus aeris renovatio, velati super inspirantibus, 6. aph. 54.

Lumbrici, vide Elminthes.

Lumbi, ὀσφύς, propriè pars est totius spinæ, quinque vertebris omnium crassissimis, maximisq. compacta, inter dorsum, & os sacrum medijs, estq. dorso ea pars qua cingimur, vide Dorsum.

Lupus, Græcè λύκοειδής, seu strangulator dicitur, affectus ijs eueniens, qui sperma diu præter naturam retinuerint, quod ueneni naturam sapiens crescensq. in uenis & arterijs, dum nequit descendere in sanguinis massam, nimiam generat passionem in fancibus, quasi suffocando, lib. de spermat. fol. 36.

Lusciosus dicitur, qui eo affectu qui Nyctalops dicitur, vexatur, 19. de simplic. λυώλις dicitur, qui à pri-

mo ortu, oculis propius admota uidet, eaq; propè oculis contingit, & limis semiclusisq; oculis aspicit, etiam si parua sint; remota verò quamuis magna, videre non potest. Vitium oculorum est congenitum ab imbecillitate spiritus visui, eamq; ob causam incurabile, eo differt à Nyctalope, qui non natura, sed ex morbo talis euasis Μύωπας Græci vocant, quos minus videntes, Latini Lusciosos, & Nuscitiosos, appellant, ipsa verò affectio μυώπια, & μυωπίας appellatur.

Lutea bilis, id est Vitellina, 8. de placit. 4. vide Bilis pallida.

Luxationes, quas excidentias, exarticulationes, & exarticulata interdum vocat Hippoc. sunt ossium à propria sede excessus, qui sine fractione fiunt, 1. de fract. 1.

Lycanthropia, Græcè Λυκανθρωπία, Λυκανθρώπι & Κυνανθρωπία Κυν' ἄνθρωπος, Λύκαν. Arabice Catrab, Cutubut; Latine Lupina, vel Canina insania species est melancholiæ, ut testantur Aetius & Paulus, qua agri mense Februarij, quo præsertim humor melancholicus redundat, noctu domo egressi, urbem circumueunt, quadrupedum more incedentes, lupos imitantur, ululantes, donec dies illucescat, defunctorum monumenta queritant, adaperiunt, cadaverum frusta arripientes, secumq; collo gestantes, fugiuntq; die viuos homines, nocte insequentes mortuos.

Lycoides, vide Lupus.

Lyparia febris, vide Febris lyparia.

Lysberia, id est solutoria signa, quæ magni, & vehementis morbi solutionem firmam solent præcedere, 1. de diebus decret. c. 1.

MADAROSIS, Μαδάρωσις ἢ Μαδάρωσις, id est, Glabrities, Caluitium, capillorum deflunium est, à vitiosis humoribus proueniens, sicut quæ Ophiasin, & Alopeciam nominant; quæ omnes passionēs sanabiles sunt, vitiosis humoribus, qui ad radices capillorum hærebant, vel resolutis, vel alio translatis; Vnde aliud sunt à Caluitie, 6. aph. 34.

Madorem & Pladorem, id est superfluentes humiditates, appellare consuevit Hippocr. siue ex tenuibus, siue ex crassioribus humoribus consistant, cuiusmodi & pus est, 3. de fract. 19.

Magma, mirabolanzorum sæcem vocant, 7. de composit. med. per gen. cap. 7. aliqui verò omnem unguenti sæcem, quæ expressa reliqua liquidiori materia relinquitur μάγμα vocant; extenditur significatum, ad omne unguentum spissum, paucoliquore subactum.

Magna arteria, vide Arteria aorta.

Magna febris, vide Febris magna.

Magnus morbus, vide Affectus grauis.

Magnus pulsus est, qui naturalem omnibus tribus dimensionibus superat, qui verò iisdem dimensionibus à naturali superatur, parvus dicitur, de puls. ad Tyron. cap. 2.

Mala, carne a partes sunt, quæ inter nasum, & aures iacent, quæ priscis Genæ dicuntur, lib. Introd. c. 10. quæ ad mali similitudinem sub oculis leniter rotunda prominent, 1. de artic. 3.

Mala Etica medicamenta, induratorum corporum sunt, ea nimirum, quæ ipsorum solvunt duritiem, quemadmodum & relaxantia quæ tensioni medentur, 7. de comp. med. per gen.

gen. c. 9. *malacticum* autem emolliens dicitur, non omni in durato corpore, sed de eo tantum quod congelatione induruit, magisq. etiam si in eo contentus sit humor præter naturam, velut in Scirrhis, quod verò à siccitate induratum est, humectari postulat, quod à Congelatione calc fieri, Græcè *μαλακτικὰ φάρμακα*, 5. *simpl.*

Malagmata vocant quamplurimi medici omnia phar-maca, quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, quæ vox emolliationis significationem habet, verum nos permittemus ipsis etiam si non propriè appellèt, 8. de comp. med. loc. 5. Propriè autem malagmata vocantur, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exsiccantia, aut humectantia manifesto. Nam, cum exatè mollientia, medium quodammodo ordinem inter humectantia, siccantiaq. sortiantur, indurescentium substantia veluti fusionem quandam molliuntur, quod nimirum propter moderatum in eis calorem accidit; ubi verò diutius suffusa fuerit, digerentium medicamentorum usus veniat, 7. de comp. med. loc. cap. 1. Unde quidam nullum discrimen constituunt inter *μαλάγματα*, & *μπλάσρα*, *τροχίσκος*. Verum & malagmatum in ijs admonendis differentia est, aut enim medijs corporis regionibus (quæ propriè *πίθιματα*, Paulus appellat) ut ventriculo, iccinori, lieni, cordi imponuntur, aut extremis partibus, aut capiti, & articulis.

Maligna, vide *Cacoethe*.

Malleoli. sunt imæ ab utroque latere tibi, suraq; partes gibbæ ex parte exteriore, intrinsecus cavæ carne carentes, extra alia prominentes, sub quibus utrinque talus continetur, lib. de ossib. cap. 22.

Malleoli vena duplex est, altera interna ad anteriorem tibiæ

tibiꝑ partem (cream Latini vocant) procedens, ac inde ad malleolum, ad ipsum tibiæ extremum pervenit, quæ & Saphana corrupto vocabulo, pro Saphæa, i. manifesta, dicitur; altera externa, & superficiaria per exteriorem alterius ossis tibiæ, quod *περὶ ὀνύχου* vocant Græci, producitur, ad pedis pertingens articulum, unde externa malleoli, & Ischiadica aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, i. mollicinum, quo genere Hippoc. omne medicamen vocat, quod connatam humiditatē habet, qualis in pingui est, singulisq. oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera, 4. de compos. med. per gen. c. 9.

Malum granatum, & malum punicum, vide Chartilago ensiformis.

Mammæ, (*Μασὸς καὶ τὶτθὸς* Græcè) est carnosā in pectore eminentia, ad utrumque latus pectoris glandulosa, semicircularis sita, in cuius medio papilla Græcè *Σηλή*, extuberat, quam ambit circulus quidam subniger qui *ὥς* dicitur, gignendi lactis vim à natura habens, i. de sanit. tuen.

Mammillaris, *Μασοειδής*, est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, præsertim vaccinarum, similis; Extuberat, & canus est, quo aer ampla, & anfractuosa eius cavitate conclusus, magis resonet auribus. Dicuntur, & à quibusdam uteri Cornua *Κεραιὰς* vocant *μασοειδὲς ἀποφύσεις*, propter similitudinem, quam habent cum mammis.

Maneum & Mancinitatem, hoc est Cyllon, & Cyllosin non nulli, de omni longorum membrorum distortionem intelligendum censent, generaleq. ei attribuunt significatum, alij eam tantummodo distortionem significare asserunt, in qua in interiorem partem membrum inclinatur,

ditur, ut omnia membra natriat, quæ inde manifesta vocatur, lib. de anat. uiu.

Maniade sunt vehementes insanie, propter atrabilis malignitatem, cum flaua bilis Cerebrum apprehenderit, febrisq. vehementia assatum hunc succum melancholicum reddiderit, com. 1. in 1. prorrh. 10.

Manna, mel roridum, vel aerium dici potest; Mellis species est non ignota veteribus Galeno, Plinio, Dioscoridi, sed mellis nomine, & titulo comprehensa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, proditamq. putet; sic enim de ea scriptum reliquit Galenus. In folijs, inquit, stirpium adnascitur quippiam, quod nec eorū succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed roridum quiddam, nec tamē continēter, neque copiosē prognasci soleat. Nec me præterit, per æstatem, in arborū, fruticū herbarumq. folijs plurimum fuisse inuentū, sic ut à Iudæis rusticis Iuppiter diceretur melle pluuisse; Præcesserat tū nox frigor pridie calida, siccaq. celi cōstitutio diluxerat; qua propter rerum naturæ peritos cōueniebat, halit⁹ quos terra, vel aqua, pspirasset extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Id ī regione nostra rarius euenit, ī Libano mōte quotānis, adeo ut extensis pellibus arbores succutiant, receptoq. quod profluit, ollas & fictilia cōpleant, priuatōq. nomine uocant *δροσομέλι*, i. roscidum mel, & etiam *ἀερομέλι*, id est mel aerium. Hæc Galenus, 3. de alim. facu. cap. 39. de melle. Cuiq. igitur patere debet, notam Galeno mannam, quæ gustu prorsus mellea sentitur. Dicitur item & manna thuris (quæ & succussio, & Pollen nuncupatur, 2. de art. 44.) id est thuris micæ concussu elisē, item corticis parum participes, adstringendi vim totam, & qualitatem possidentes, 5. de comp. med. per gen. cap. 2. Videturq. ali-

quibus

quibus mannam thuris nihil à thure trito ac lenigato dif-
ferre; mannam enim proprie appellant, id quod excussum
est à thure circa magna onera confracto; auferuntur enim
ab ipso fragmenta quadam parua, corticis thuris, 4. de cōp.
med. loc. 4. & 13. meth. cap. 5.

Manus (quas homo pro corporis nuditate, quod armis
nudum sortitus est, armorum loco obtinuit) sunt iuxta Ari-
stotelem organum apte omnia organa, cum nullum sint eo-
rum quæ particularia organa sunt, sed quodlibet eorum pos-
sint recipere, 1. de usu par. c. 4. Manus autē nunc totū crus,
brachium scilicet, cubitum & manum significat, nunc ex-
tremam manum tantum, 2. de usu part. cap. 2.

Manus dolor, Græce χεράγυια, arthritis species est, qua
manuum articulos occupavit, ut Genagra, qua genu, & Pa-
dagra qua pedes.

Manforij musculi, vide Mandibularij.

Marasmus, siue ex morbo senium, est frigidum, & siccū
corporis temperamentum, non natura, vel annorum mul-
titudinis ratione comparatum, sed febrili morbo, quod non
in animalibus modo, verum etiam in stirpibus supra modū
arefactis, visitur, 5. de sanit. tuen. cap. 9. Marasmus autē
idest Tabes, qua non idem morbus est ac febris marasmo-
des, id est tabida; marasmus enim absque febre in decrepi-
ta ætate solet accidere, extincto nativo calore, quod nihil al-
liud est, quàm mors, qua sine sensu doloris ac secundum na-
turam ex siccitate contingit; sicuti his qui præter naturam
tabescūt, altera aduenit species, quæ ex ægritudine senectus
vocatur, inquam non solum senes, sed etiam pueros vidi-
mus incidisse quamplurimos. Tabida verò febris, non tan-
tum sicca, sed calida est, 1. de diff. febr. cap. 8.

Marcor, Marcor frigidus, torridus, syncoposus, vide fe-
bris marcida, & ex ægritudine senectus,

Mari-

Marisæ venulae sedis sunt, quæ aliquando foris extuberant ore hiantes, & statò tempore sanguinem melancholicum excernentes, unde hemorrhoides dicuntur, quibus plus in stœfluëtibus, aqua inter cutem subsequitur; interdum superius delitescunt, & cæcæ αἰμορροΐδες appellantur, vide Sycofis.

Marmarygas, idest oculorum hallucinationes, 3. cristæ

II. & ca. 7.

Maſeteres, vide mandibularij.

Mater dura, & pia, vide membrana dura.

Matrix, i. vulua, foris nervosa, intus carnosior, nas fetus gestandi, quæ a Græcis Hystera quoque appellatur, quod omnium partium sit postrema, lib. finit.

Maxillares dentes, vide Dentes; Tomi, Incisorij.

Maxille sunt illæ faciei partes, quæ genis subiiciuntur; quæ ad mentum vsque descendunt, & hæc in mucronem desinunt, lib. Introd.

Meatum siue Porum simpliciter Herophilus appellat, neruū illum, qui à Cerebro ad oculum pertinet, sensibilis spiritus uia, quod eius solius foramen clare cernitur, 1. de sympt. caus. cap. 2.

Meatus auditorius, auditus instrumentum est, qui in osse lapidoso est, satis inuolutum, ne quid eorum quæ extrinsecus incidunt, ipsi noceret, in medium situs, extrinsecus quidem conuexarum, intrinsecus aut cavarū, ne quid meatui incidere, uel aures facile afficerentur, 11. de usu p. c. 12. Constituitur aut in medio nervi quintæ coniugationis, qui unā cum dura cerebri membrana, inde exoriente, in auditus foramen incidit; dicitur autem & hic meatus cæcum foramen propterea q̄ anfractum illum, per quem neruus foras post aures excidit, hand possunt dissectiones perfectè perforare, lib. de ner. diss. cap. 6. vide Cæcum foramen.

Meatus genitalis est, qui genituram à testibus haustam

ad Colis radicem defert, qui meatus iuxta radicem vesicæ varicosior conspicitur, unde ei nomē inditum est, Varicosus assistens, 1. de sem. cap. 15.

Meatus Varicosus, vide Meatus genitalis.

Meconium, excrementum est, ex toto fetus nutrimento in utero, estque humor is qui in Vrinaculo est, lib. quod animal sit id ca. 5. Est quoque *μυκόνιον*, papaveris succus concretus, qui *ἑπιον* appellatur, 3. simpl. 20.

Media, seu Medianæ cubiti uena est, quæ communis est ei, quæ humeralis nominatur, & ei quæ per axillam fertur, 3. loc. aff. c. 7. quæ & purpurea, & nigra vocatur, lib. de anat. viii. vide Communis uena.

Medianum, seu mediastinum, sunt duæ membranæ utraq; parte singulæ totum thoracem *διαπάρτοντες*, i. intersepiētes, quæ posteriore parte spina vertebris, anteriore verò ossi medio pectoris insiguntur, sursumque ad Claves, & deorsum ad ensiformem cartilaginem porriguntur, in duæ partes totum thoracē dividētes, unde vulgo mediastinum siue medianum vocant; his enim medius thorax dirimitur, 6. de usu p. & 5. de anat. adm. quæ membrana non aliter differunt, nisi quod in costis *ὑπεζωόντες*, i. succingentes appellātur; ubi verò recta ad Claves feruntur, *διαπάρτοντες*, id est intersepiētes, 5. de anat. adm. vide Diaphragmatōtes.

Medicari, non de omni medicamento exhibitione intelligit Hip. sed de eorum tantum quæ purgant, 2. de fra. 29.

Medicamentum omne id dicimus, quod nostram naturam alterare potest, 1. simplic. cap. 1.

Medulla spinalis, (quæ & Dorsi medulla, & Rhachidis, Græce *μύελος*, & vulgo Nucha nominatur) est quæ omnibus, & singulis vertebris inest, 8. de usu part. cap. 4. estque Cerebro continua, eiusdem cum eo generis et na-

tura, nisi quod ipso multo est durior, potissimum in infer-
nis spina finibus; eam tamen perperam medullam appel-
larunt, cum medulla ipsa non modo spinali hac, verum
etiā Cerebro ipso sit humidior mollior, & pinguior, quod
verò in spina ossibus contineatur, coloremque habeat me-
dulla assimilē, ob id ipsam medullam nominant, quo mo-
do quidam ipsum Cerebrum vocitarunt, 3. de alimen. fac.
cap. 10. Atqui saepe eam spinalem vocant medullam. ad-
dita scilicet medulla appellatione, interdum verò sine
additione simpliciter spinam nuncupant, 3. loc. aff. 10. vi-
de Myelon.

Megalosphachnos vocat Hippo. non eos, quibus magna
ex natura ipsa sunt viscera, sed quibus ea ex affectu ali-
quo intumuerunt, siue scirrhum, siue phlegmonem, siue œ-
dema, nata sunt, 3. acut. 9.

Melancholia morbus, est insania species ab humore
melancholico, (a quo nomen sortitus est) in ipso Cerebri
corpore contento proveniens, qui si affetur Maniam f. cit,
& furorem, 3. loc. aff. 7.

Melancholia & flatuosa hypochondriaca affectio, mor-
bus est ex tertia melancholice specie, indicante nomine
humorem, qui ipsius causa est; Cumque circa ventricu-
lum prima inceperint accidentia; ipsisque auctis melan-
cholica sequatur affectio, deinde alui deiectione, vomitu,
proba coctione, ructibusque leuetur is qui laborat, Hypo-
chondriacum, flatuosumque morbum ipsum nominabi-
mus, 3. loc. aff. 7.

Melancholicam ecstasim vocat Hipp. motionem men-
tis, aberrationemque intelligit vehementem & ferinam,
quæ irrigante Cerebrum assata flava bile oritur, quæ in
nigram permutari solet, 1. prorrh. 14.

Melancholicus humor, alter est qui propriè melancholi-

cus succus, siue *melancholicus sanguis* à Galeno dicitur, estque *ueluti sæx sanguinis* satis crassus facibus vini nō absimilis, qui in terram affusus non inducit fermentationem nisi forte in ardēti febre assetur, neque ullius acidæ qualitatis est particeps; qui in meatibus Cerebri cōtentus, Comitialē morbum in Corpore Cerebri melancholiam morbum generat, vide *Nigra bilis*. Alter est tenuior, gustu acidus, qui terram radit, attollit, fermentat, ampullasque exoriat, qui atra bilis appellari potest, quique pressata atrabile nascitur, ferinaque deliramenta, modo cum febre, modo sine febre inducit, 3. loc. aff. ca. 7. & 2. de diff. feb. 9.

Meliceris, *Μελικρίς*, est apostema, humorem melli similem, membrana conclusum habens, species est apostematis, ut & *ἀδύρωμα*, & *σεάτωμα*, quorum hoc adipe, illud à pulicula intra membranā conclusa, nomen habet. Sic *Meliceris* humorem continet, melli similem, cumque membrana comprehendit, qui ea scēta non aliter, quā *melè fauis* diffluit, vide *Atheromata*.

Melicratum, siue aqua mulsa, siue *Hydromel* est mellis & aquæ compositio, vel æqua utriusque portione, ut uia aquæ paret, & ad distributionem agat, uel altera alteram superante, 3. acut. 13. licet quidā uelint *μελικράτον* à πόντῳ ὑδροπλάιτος, uetustate differre, quod *melicratum* sit aqua mulsa subita & recens hoc est ex tpe parata, *hydromel* autem inueterata, & recondita.

Melon, est tertius modus egressionis. uueꝝ oculi, cum tantum egreditur, ut palpebra minus praualeant, & pili palpebrarum pungentes, iungendo dolorem inferant, lib. de ocul. part. 4. cap. 11.

Membrana, quam Græci nunc *μύημα*, nunc *μῆτωμα*, nunc *μύρωμα* vocant, uide *Tunicarum*.

Membrana Adelon, quasi minus apparens, est quarta
ocu-

oculi tunica, à nonnullis inuoluta, quam Amphiblestroide tunica, quasi in summo excipit, membrana minima simul & tenuissima, quam Hipp. non cognouit, lib. Intro. c. 11.

Membrana dura inuoluta, crassa, cuticularis (idem enim significant) est quæ primum catuæ & ossibus exemptis, Cerebrum in orbem contegens apparet (quæ vulgo dura mater appellatur) & ut altera tenuis, mollisque subnectitur, (quæ pia mater nominatur) 9. de anat. adm. c. 15. & tranque meningem uocant, solis Cerebri membranis nuncupatione hac reservata; cum ueteres non has solus membranas, sed omnes etiam, Meningas uocarent, ibid. cap. 2. quas etiam Vaginas uocant, 3. de artic. 33.

Membrana Pericardios, quæ & Tunica, & Domicilium, & securum Vallum Cordi circumiectum dicitur, est membrana in cuius medio Cor est suspensum, quæ ex capite ipsius ampla ualde exorians, post autem paulatim coarctans sese, modo quo Cor, ipsū in quādā Coni acutic, & ipsa desinit, ossi pectoris annexa, 16. de v. sup. c. 16. quæ Capsula Cordis, & Cordis inuolucrū vulgo appellatur.

Membrana Periostios, est inuolucrum tenue, fibrosum, uelut indumentum ossium, à natura condita, lib. finit. per quam ossa sentiunt (si modo quid sentiunt) generaleque quidem nomen est, habetque pro uarietate partium, specialia quædam nomina, in Cranio. n. περι κρανιος, in costis, ὑπε ζωνος dicitur, uide Periostios.

Membrana pinguis, idest Mesaracon, & Mesenterium, 10. meth. 8.

Membrana secundiformis, uide Choroides.

Membrane Sigmoides sunt tres illæ membrane in uena arteriosa, à qua Pulmō alitur, intus foras spectantes, quas à figura litteræ Sigma, Sigmoides appellarunt, 6. de v. sup. cap. 14.

Membranae subcingentes, vide Hypezochores, Cingentes, Diaphragmattondes, & Medianum.

Membrana Triglochina, sunt membranae arteria venose, quae in pulmonem distribuitur foris intro pertinentes, quas Triglochinas appellarunt, non à figura aliqua, sed à mutua inter se ipsarum compositione, quae Cuspidum, telorum eminentijs, atque angulis quos glochinas vocant, penitus est similis, 6. de vsu par. capit. 14.

Membra spiritalia sunt, Pulmo, Cor, Thorax, & duplex arteriarum genus, leue & asperum, 7. de anat. adm. capit. 1.

Membrum simplex est, cuius quamcunque partem sensibilem assumpseris, erit illa toti communicans in nomine & definitione, ut caro, & os, oppositè uerò mēbrum compositum, lib. de anat. viii.

Mendosa costæ, vide Illegitima.

Mendosa sutura, uide Lepidoides.

Meninx Græce μνινξ, vide Membrana dura.

Meningophylax, idest membrana custos: Lamina cinea est, firma, pauca resima, ab exteriori parte leuis, qua chirurgi in Vulneribus capitis utuntur, quoties excidendum, & attollendum est os, metusque imminet, ne in ipso opere Cerebri membrana, negligentius & ultra quam res exposulat, premendo, laedatur, ex quo sopores, & graues inflammationes cum mortis periculo oriuntur, propterea quod membranam à curationis iniurijs teneatur, μνινξφυλαξ appellata est, 4. loc. aff. 2.

Menses, i. menstrua mulierum purgationes, quae per uerum singulis mensibus fiunt, lib. de atra bile, cap. 8. quae & muliebri fluxus, & uteri Rheuma appellatur, 3. de caus. symp. c. 4. Unde menses mouentia medicamenta sunt, quae in pessis, aut fomentis, aut quouis alio modo vulgè admota,

admoda, non habent vim familiarium succorum attrahicem, sed hoc solo nomine bibuntur, ut sanguinem extenuent, & meatus vteri obstructione liberent, 5. simpl. 20.

Mentagra, vide Impetigo.

Menti eruptiones sunt affectiones ulcerosa & aspera, in mento sua sponte nascentes, quae & menti papulae, & mentagra appellantur, 5. de comp. med. loc. c. 6. & cap. 7.

Mentum, quod Graeci μέντον dicunt, id omne est, quod labro inferiori, longa orbiculari figura subiacet, lib. Introd. cap. 10.

Meri Arabibus, Gula Latinis, Graecis propriè μήρῃς dicitur, & communiter Στόμαχος, omni enim ventri, collum praepositum, instar Isthmi cuiusdam angustum, nominatur stomachus. Meri autem communis quadam via est, quae ab ore fert ad Ventericulum, inter hunc, & fauces media, 4. de usu p. & 13. meth. cap. 4.

Mesenterium (quod & Mesaraion, dicitur) utroque nomine ab accidentibus ipsi indito; Mesenterio quidem a situ, Mesargeo autem a peculiari substantia, nam & medium inter intestina situm est, & omnes venas ex iecore in ipsa descendentes (quae ob id Meseraicae dicuntur) vicinis arteriis, & nervis, in orbem complectitur, quem admodum intestina singula, 6. de anat. adm. cap. 6.

Mesenterij appendiculum nominant, illud unum principium in quo mesenterij venae, ac arteriae, quae veluti radices in arboribus ad concavam anfractuum partem, inferuntur, invicem coeunt, (in quo totum mesenterium cum intestinis continetur) ligamenti natura praeditum, sursum tendens, adiacentes sibi habens venas ad Iecoris portas; arterias autem ad eam spinae partem, quae in septum transversum & renes habetur, 6. de anat. adm. cap. 6.

Meseraica veng, vide Mesenterium.

Mesopleuria, id est, *Intercoſtalia loca*, lib. de muſ. diſſ. cap. 23. vide *Intercoſtales muſculi*.

Metacarpium, vide *Brachiale*.

Metalepticus, i. *transumptiuus*, vel *translatiuus motus*, quem natura muſculis quibuſdam conciliauit, 7. de uſu par. cap. 14. vide *Transumptiuus*, & *Euthyporos*.

Metaptoſis, *transitus eſt*, ſiue *transmutatio*, alicuius morbi, vel febris in aliam ſpeciem, ut ſi ex acuto fiat non acutus, extus *μεταμώρεος* fieri dicitur.

Metaphrenum, id eſt, *Dorſum*, media eſt ſcapularum pars; cui ſtomachus intus ſubiaceat, lib. Interod. cap. 10. cui *Thorax* conſigitur tanquam ad carinam nauis, libr. tegni, c. 29. vide *Spina*, *Dorſum*.

Metaporopœſis eſt *exiguorum meatuum ſtatus mutatio*, ad naturalem ſtatum, nomen eſt, idē plane poteſtate ſignificans, quod *μετασύνπρις*, à quo *μετατορπύνις*; nihil differt, 14. metbo. c. 4. Vnde *Metaſyncriticum medicamentum*, quod à dolore tollendo, etiam *anodynion* nominatur, confirmatorium eſt, & perſanat, lib. de dynamid. in proœmio, & 7. de comp. med. per. gen. c. 11. ex alto adhuc humores eudcat ac transfert, 1. de compoſ. loc. cap. 8.

Metaſyncriſis, vide *Metaporopœſis*.

Metaſtaſis morbi, propriè appellatur, cum ex parte una in alteram malum migrat, per abuſionem autem ipſius etiam ſolutio, ita nominatur, 5. apb. 7.

Metopon, *μέτωπον*, pars faciei ſupra oculos ſita, & ad tempora uſque protenſa, ſubſtantia muſculoſa, & offe ſubiecto conſtans; Alijs *frons* tantum dicitur quantum inter ſupercilia, & capillos patet, pilis nudum. Alij totum id ſpatium quod ab oculis ad coronalem uſque ſuturam interiacet, frontem appellant, quod totum illud frontis os nuncupetur.

Metren-

Metrenchyte, idest uteri clysteres instrumentum est, per quod in uterum medicamentorum idoneorum aliquod immittimus, quemadmodum & *Otenchyte*, idest auricularij clysteres, per quos in aures & *Recti Syphones*, quos *Catheteras* vocant, instrumenta quibus in vesicam aliquid infunditur, 5. meth. II.

Methodica medicina est, quæ communitatibus, & similibus speculationi adhaeret, omnes enim particulares affectus, ad generales duos reducunt, adstrictum, & fluentem, quas communitates vocant, lib. *Introd. nap. 3.*

Milphosis, *Μιλραὶ ἢ μιλρωσις*, idem est, ac *Madarosis*, pilorum defluuium est è palpebris, ab acri fluxione, vide *μαδάρωσις*.

Mina Attica, & *Aegyptia*, habet uncias sexdecim, Romana uncias viginti, libr. de pond. & mens. cap. 3. dicitur etiam *Mina*, Cordis capsula, & glandula, lib. de anat. viii.

Mochlia, traductio est ossis, aut ossium ad naturalem locum, ab eo qui præter naturam sit, lib. finit.

Modus morbi, uide *Morbi mos*.

Mola, *μύλα*, est os latum & rotundum, toti genu suprapositum, ob figuræ similitudinem sic dictum, a quibusdam patella, rotula, *ἔγχρονάτης* dicitur; Est adhuc mola, caro informis, & inutilis, in muliebri utero concepta; quem conceptum inutilem in utero coneretum, si subdurus sit, *μύλοι*, siue *μυῖλω* Græci appellant, idest scirrhum.

Molares dentes, uide *Dentes*, & *Tomi*,

Mollicinum emplastrum, uide *Malthacode*.

Mollientia medicamenta, uide *Malagmata*.

Mollis pulsus est, in quo arteria quasi carnosior in occursum apparet, durus ubi siccior; rigidiorque in modum *Corij*, de puls. ad *Tyron. cap. 3.* *mollitudo* autem & *durities*

313 N
sies sunt tunica arteria qualitates, ibid.

Mollities oculorum (quæ & paralyfis oculorum dicitur) morbus est, cum illorum voluntarius motus, omnino aufertur, quemadmodum cum minuitur, tremor & titillatio dicitur; Cum verò deprauatur, ipsiusque lacerti, non ut decet, mouentur, Spasmus nuncupatur, lib. de ocul. par. 4. cap. 7. vide Paralyfis.

Monoculum, vide Cæcum intestinum.

Monobemera collyria sunt, quæ unius dici opera, lipitudines apta sunt curare. 4. de comp. med. loc. c. 2.

Moram, id est Triuon, siue attritionem dixeris, Hippoc. appellat, callo obduratam sedem, quæ ex diuturna capitis brachij immoratione efficitur, in ea carnis circumiecta parte, in quam id prima prolapsione incubuerat, 1. de artic. 21.

Morbidus rigor, perfrictio est sanis eueniens, cū nulla exteriori causa violenta corpus, sed ex se talem obtinet dispositionem, at cum aqua frigida corpori supra infusa rigor excitatur, non est morbidus rigor, sed cum ex ipsa corporis dispositione suscitatur, lib. de trem. conu. cap. 6.

Morbosum (νόσος) dicitur, ut corpus, ut causa, ut signum, nam corpora quæ morbos continent, cause quæ hos efficiunt, & signa quæ ipsos indicant, νόσος Græcis, nobis morbosa dicuntur, Gal. initio artis parua.

Morbus, νόσος est dispositio præter naturam ladens operationes, 2. cr. f. cap. 2. primò & secundum ipsius substantiarationem, lib. de symp. differ. ca. 1. præter naturam dicere, siue contra naturam, nihil prorsus refert, utrunque enim vno verbo παρά φύσιν Græci dicunt, nam & fædus Ictericorum color, & lentigo, & alius quiuis etiam leuissimus affectus, contra naturam est, nec tamen morbus dicitur si propter sui exiguitatem, actionem non ladat.

Mor-

Morbus Herculeus, vide Comitialis.

Morbus magnus, vide Comitialis.

Morbus puerilis est Comitialis affectus, cum à naturali intemperie prouenit, quibus humidum natura est Cerebrum, teste Hipp. lib. de aere, aqua, & locis, ita scribente, pueris accidere conuulsiones, & suspiria, quæ putant puerulum efficere, & sacrum morbum esse, ubi per puerulum, intelligit affectum, com. 1. in 6. de morb. vulg. 5. vide Comitialis.

Morbus regius, qui Arquatus, Aurigo, & Æteros dicitur, est bilis refusio in cutem, quo fit ut superficies tingatur, luteaq; fiat, & vitietur cutis, alba quoq; in ventre desectiones fiant eo morbo affectis, lib. finit. vide Æteros.

Morbus sacer, vide Comitialis.

Moria, & Morosis, est deficiens functio, ratiocinatoris facultatis, quæ etiam fatuitas dicitur, Græce μωρία, μωρωσις, de sympt. diff. cap. 3. vide Fatuitas.

Mortifera facies est, de qua in Prognostico dixit, Naris acuta, oculi concaui, collapsa tempora, 3. acut. 54. vide Facies Hippocratica.

Morbi mos, siue paroxysmi, quem etiam modum vocant, ut si benignus, vel malignus sit, tum ex propria morbi specie, tum ex superuenientibus ei symptomatibus, spectatur, 1. de crisi, cap. 3.

Motòs, μωτòs, linamentum, seu linteum carptum quod vulneribus, ulceribus, apertionibus corporis seu siccum, seu medicamentis quæ ob id ἐμωτὰ, vocantur oblitum, inditur; vel ad sistendum sanguinem, vel ad detergendum, siccandum, exedendum; Adhuc motus linamēta vocant, & medicamenta sunt, quibus foris impositis, vel eschara ulceribus inducitur, vel meatus obstruuntur, vel cum carnosæ partes, quæ circa vlcus sunt, ulceribus super im-
po-

ponuntur, aut ipsa cutis, aut quęcunque ipsi comminiscimur, 5. meth. 3. vide *Enmotia*.

Motus naturalis, vel secundum naturam; ac eius carentia est, quando voluntatis imperiū sequuntur, si involuntariē in corpore fiant, preter naturam sunt. *Ad Thrasib. c. 26.* Motus enim sensibiles in animantium corporibus, cum sana sunt, duplices genere apparent, ex arbitrio sane, ac voluntate, ac impetu, aut quomocunque noīare velint, nūm quidem periti, rerum aut scientiā negligentes, qui neruorum, muscūlorumq; ministerio fiunt; atque hac medici voluntarias actiones appellare solent; Alij verò motus in animantium corporibus existunt, qui arteriarum, & Cordis officio obeuntur, quos vitales nuncupant. Ac aliud quoddam tertium motuum genus in venis habetur, quod & naturale dicitur, & sensibus non percipitur, lib. de trem. palp. cap. 2. Vnde motus naturalis & genus & species motus est.

Mox apparentia symptomata, vide Affidentia.

Mucor, vide Coxendix.

Mucosum humorem, eum consuevit appellare Hippo. qui lentore quodam, & albedine præditus est: qui ad exanguēs partes, hoc est ossa, & chartilagine cogi consuevit, cum imbecilla ita natura est, ut benè conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum quid relinquat; Non secus atque in oculis membrana relinquunt, cum lippitudine laborant; Euadit autem natura imbecillior, aut ex propria intemperatura, aut ex multitudine humoris, qui illuc confluit, ut in preter naturalibus tumoribus, 3. de artic. 65.

Mucro est inferna Corporis Cordis pars, quę tantum protenditur, quantum Cordis magnitudo occupat spatij, 2. de placit. 4. vide Basis Cordis.

Mu-

Mucronata chartilago, vide Chartilago ensiformis.

Mucus, siue Graueda, siue Coryza, non est pituita species, ut quidam falsò asserunt, sed excrementum est quod à Capite distillat, 2. natur. fac. 9. Mucus siue Blena est crassior pituita, 2. de sem. cap. 6. Prodigus, mucum vocat phlegma frigidum & humidum albi coloris, 2. de natur. fac. 6. Mucum adhuc vocat Hippoc. 4. de artic. 42 quem alibi vocatuerat mucorem, vide Coxendix, Blena, Phlegma.

Muliebris fluxus est humorum delatio, per uterum ad multum tempus perdurans, quam eius facit excretio, lib. finit. Vnde muliebria, idest menstruarum purgationum vacuatio, quæ per circuitum repetit, 3. prorrh. 50. 5. aph. 28. vide Menses.

Mulsa, vide Melicratum.

Multitudinis (quæ & Plenitudo dicitur) nota sunt, vasorum distentio, robur, gravitas uniuersi corporis, pigritia ad motiones, & tentiones membrorum, vlcerosa, et lassitudinaria sensio, traducta in otio prior vita, non sine ciborum, ac potuum largiore ingestione. & solitarum excretionum suppressione, lib. de multitud. cap. 1. & lib. de cur. rat. per san. capit. 4. Est autem multitudo, omnium humorum aquabilis redundantia, vel ut alij, solius sanguinis, non qui sincerus sit, & alijs humoribus impermixtus, sed cum ijs naturæ modo confusus, qui cum in hominum corporibus exuperat eius excessus πληθώρα vocatur; Ea autem duplex est, una πρὸς ἀγγεία, vel ut alij vocant κατὰ τὸ ἄγγειον, hoc est quoad vasa, quoniam humoribus per vasa infusis, consistit; quæ & vasorum plenitudo dicitur, cum vena tunica in tumorem impleta supra naturalem cuique modum se attollunt, præterque id tensio accidit, de mult. 6. 10. Altera πρὸς τὴν σπλάχνιν, idest

ideſt quoad vires, cum nonnulli qui conſueſta etiam nummunia obeunt, ſentire ſeſe graues, pigros, ſegnes, atque agre mobiles referunt, lib. de cur. rat. per ſan. cap. 4. illa propriè Plethora dicitur, qualis athletarum eſt.

Muſculus, lacertus, Μῦς, neruoſum corpus eſt, permiſta huic carne, ad partium corporis motum procreatus, lib. ſinit. Eſtq; proprium inſtrumentum, motus uoluntarij in animalibus, 16. de uſu par. c. 2. cuius ſubſtantia duobus conſtat, carne & fibris poſitu ſimplicibus & ſecundum longitudinem ut plurimum ex porrectis. Cuius tres ſunt partes, caput quod & principium appellant, in quod neruus & ligamentum inferi ſolent, uenter carnoſus magis, & muſculum præcipuè circum ſcribens, & ſinis ex quo tendo & Aponeuroſis oritur, atque in partes mouendas inferitur, 1. de motu muſc. & 12. de uſu par.

Muſculi carnoſi, ſunt muſculi recti, quibus nulla caro ſub eſt, unde ambientibus muſculis candidiores ſunt, 5. de anat. adm. cap. 7.

Muſculi cremaſteres, id eſt ſuſpenſores, ſunt duo graciles muſculi, in utrumque teſtem peruenientes, quorum alter à pubis, alter ab ilium oſſe, per membranofum ligamentum tenue exoritur. illic permeatum qui ad teſtem deuenit. perferuntur, qui teſtem ſuſum attollunt, lib. de muſc. diſſ. cap. 27.

Muſculi maſticatori, uide Mandibularij.

Muſculi Rhachyæ, i. ſpinales, lib. de muſc. diſſ. c. 24.

Muſculi trapeales, uide Crotaphita & Mandibularij.

Muſculus cuticulofus, uel carnoſa cutis, qui extremis cutis ſedis partibus, admiscetur. lib. de muſ. diſſec. c. 30.

Muſcul' latus, μυῶδες πλατύσμα, uide latus muſculus.

Muſculus maximus, qui Pſoa dicitur, eſt qui ab imis regionib. exortum habens, ad humeri de articulationem aſcen-

ascendit, lib. de musc. diff. cap. 1. vide Psoa.

Mydesis commune nomen est, partium quæ ex putrefactione corrumpuntur, lib. 7. introduct. cap. 15.

Mydriasis dicitur, cum pupilla quidem, nihil colore variat, dilatatur autem magis quam natura poscat, ut Iridis circulo fiat proxima, & visioni noceat, est enim pupilla nimia dilatatio, 3. meth. 2. & lib. Introduct. cap. 15.

Myelos, quasi medulla *μύελος*, familiare ossis nutrimentum est, 2. de usu p. 16. substantia simplex est humida, pinguis, alba, sensus expers in cauis ossium contenta, exanguis quidem, sed ex sanguine in ipsas cavitates per venas illabente ortū habens, quæ si in Cerebro spectetur, dicitur *μύελος ἐγκεφαλίου*, i. medulla spinalis, vel *ωτιαῖος*, vel *διαυχένιος*, vel *ῥοῖτης*, ad alterius differētiā.

Myla, vide Patella.

Mylyphæ appellantur, defluvia palpebrarū, 4. de comp. medic. loc. 5. Adhuc sunt *pharmaca* arida, quæ scabris palpebris conueniunt, & ad palpebrarum defluvia conducunt, & obtusè cernentibus, siue per atatem, siue crassitudinem, aut frigiditatem humorum in oculis, aut flatu caliginosæ redundantiam, id accadat, ibidem.

Mycephalon, id est muscæ caput, est exigua vutæ tunica porrectio in nigro oculi, muscæ capitis similis, per ulcerationem facta, lib. finit. species est *τῆς προπίπτουσας* id est procidentia oculi.

Myodes platysma, vide Latus musculus.

Myopiasis, est dispositio ab ortu contracta, qua propinqua cernimus, remota vel parū, uel omnino nihil, lib. fin. *μυῖασις*, affectio, *μύωσις*, qui afficitur: differt à *Nyctalope*, qui non natura, sed morbo talis euasit; vide Lusciosus.

Myracopa, medicamenta sunt, quæ lassitudines tollunt, cum quadam odoris suauitate, 6. de comp. med. per gen.

gen. cap. 11. *μυρμηκίων* Græcè.

Myrmecia *Μυρμηκία* & *ακροχορδών*, utrunq; malum, cutis exigua est excreſcentia calloſa, & magna ex parte rotunda. Sed *Myrmecia* latiore baſi & ſeſſilis eſt, ac in ſcalpendo & attritu mordentis formica ſenſum efficit, ideoque Latinis formica appellatur. *Acrochordon* autem baſim anguſtiorē obtinet, ut chorda nexu ſuſpenſa eſſe videatur, Latini verrucam vocant ſimpliciter, aut cum adiectione penſilem, 2. meth. 2. quas *Clauos*, *Callos*, & *Pylus* uocant, quas aceto acri macerantes corticem arboris *Itææ* combuſtum, tollunt, 6. ſimplic. vide *Formica*.

Myſis, i. meatum conniuentia, vide *Stegnoſis*.

Myurus pulſus, ſiue *Sorici* cauda, eſt qui *Soriciſ*, murisve caudam imitatur, quæ in acutum terminatur, ut cum ſecundus iſtus primo eſt paulò minor, tertius ſecundo, quartus tertio, 1. de differ. pulſ. capit. 11. à figuris nomen, quæ in acutum terminant, mutuantes, ibid. Adhuc *myuri* pulſus dicuntur, qui ex maiori adauſto ſiunt minores, ex frequentiariorēs, ex celeri tardiores, lib. finit. *μυρμιζων σφυγμός* Græcè.

Myxa, Græcè *μύξα*, eſt humor ex naribus fluens; Latinis mucus, & pituita narium dicitur.

N

NARCOTICA, quæ & hypnotica, ſtupeſacientia, ſomnifera, Græcè *Ναρκωτικά φάρμακα* (*Colica* etiam appellantur, 5. de comp. med. loc. c. 9. & lib. 7. cap. 5.) nuncupantur, hoc eſt ſomnum conciliantia medicamenta, quæ temperiem ſortiuntur, vel ſummè aduerſam iſs, quæ reuera ſunt anodyna; refrigerant ſiquidem omnia corpus, & ſenſum eoſque obſtupeſaciunt, ut ſi paulò liberalius ebibantur mortem afferant, 5. ſimplic.

19. vide *Anodyna, Colica, Hyponica.*

Nares, *μύκτιρες* proprie dicuntur, *concaue nasi partes* utrinque posita, qua meatum præbent spiritui & odoribus, veruntamen quandoque totum etiã id membrum *μύκτις* a medicis appellatur, qui Latine *Nasus* dicitur, odoratus instrumentum, quippe si occlusis naribus spiritum ore adducimus, odorem nullum sentimus; sin autem spiritum apertis naribus attrahimus, odor sensum protinus mouet, in medio oculorum prominens, libr. de instr. odor. capit. 1. *Nasus* verò in se septum quoddam per media loca diductum habet, duoque foramina satis conspicua, hæc inquam, quæ cernuntur, & in singulis naribus singula sunt, nares dicuntur. ibid. cap. 2.

Narium ala, vide *Alæ narium.*

Nasus, vide *Nares.*

Nates, quas *πυγᾶς*, & *γλουτῆς* Græci vocant, sunt inferiores corporis partes, quibus natibus carnosæ corpora substrata sunt, quarum gibbæ partes, quod orbiculares sunt, sphaeromata, ceu modo orbium facta Græcis appellantur, lib. Introd. cap. 10.

Nates Cerebri, vide *Glutia.*

Natiuus calor, (quem & calidum innatum vocant, cuius vi omnium animantium uitam natura moderatur) apud Galenum est aut anima, aut primum & præcipuum animæ instrumentum, quo omnia quæ sunt ad uitam necessaria, administrat; cuius caloris præsentia, vita est, ut absentia mors; inæqualiter in singulis corporis partibus dispersus; In Corde flagrantissimus, in ventriculo & præcordiis moderatior, in capite & Cerebro adhuc minor, in ossibus perexiguus, pro ut natura unicuique particula expedire adiudicauit. Hic fixus insitusque dicitur, hoc est à natura, in prima conformatione singulis partibus cer-

ta mensura inditus; Cui calor fluens aduentitius opponitur, quem natura in Corde tanquam in quodam penu collocauit, qui ab eoper arterias cum spiritu & sanguine suis uehiculis & pabulis continenter depromitur, ferturq; in singulas partes, ut earum calorem natium, fixum, insitumq; foveat, atque instauret; qui calor fluens, in amore, metu, uerecundia initio, frigore, accessionum principijs & somno, intrò cum sanguine & spiritu ad Cor recurrit, ob idq; per eos affectus, & cutis, & subdite illi partes frigent & pallent, contra in gaudio, uerecundia iam uigente, statu accessionum, uigilia, ad cutim copiosior effunditur, cum spiritu, & sanguine, à quibus, calor, rubor, tumor & nitor inducitur.

Natura nomine, temperamentum intellexisse Hippocratem, atque id esse praprium, & maxime proprium Natura significatum, ab ipsa natura substantia desumptum, cum sepius, tum libro toto de natura humana, Galenus testatur, 3. aphorif. 2. ubi naturarum has dicit astate, hac hyeme, male beneuere habere.

Naturalis motus, uide Motus naturalis.

Naturalis uirtus, quoniam diuina, à Galeno in arte parua, distinguitur, in primas, seu principes, & in secundarias, siue ministras; primæ statuuntur tres generatrix, auetrix, nutrix. Illis omnibus singulis, alie quatuor inferuiunt; attrahetrix, reuetrix, concoetrix, expultrix, quæ non in iecinore modo, sed in omnibus vel minimis corporis partibus, insunt.

Nauiforme os, uide Scafoides.

Nausea, uide Vomitus.

Nauseationes in uenis, id est nauoionas appellat Hippocrates, quas prius uocauerat exuccationes, hoc est sugillationes, cum neng(more eorum qui nauseam patiuntur,

tur, & euomunt,) sanguinem expiunt ac quasi euomunt, tum ex propria imbecillitate, quam ex inflammatione contraxerunt, tum ex ipsius sanguinis copia, & prauitate, 2 de fract. 24.

Nebula, Græcè νεφέλη, sunt utriusque oculi membrana ex aliquo ulcere tenues & superficiarie albedines & caligines, nam si crassiores sint & profundum petant Αδονόματα, & albugines dicuntur, libr. de remed. part. fac. cap. 12.

Nephritis dicitur omnis affectus, quo ren laborat, siue is similis sit ut intemperies, siue instrumentalis, ut Calculus, siue communis, ut ulcus inflammatum; proprie tamen Lithiasis, i. calculi morbus, nephritis appellatur, lib. de ren. aff. dign. ca. 2. Omnes uerò homines qui subinde difficulter meiunt, aut etiā suppressam urinam omnino habent, ubi circa lumbos dolent, ac arenosa meiunt, nephriticos dicunt, quo calculo emisso, corū protinus dolor, & urina suppressio desinit, 1. de placit. cap. 13. Vnde nephriticas antidotos, & compositiones appellant, quas renibus affectis accommodant, ut ex ipsa appellatione manifestum est; nephriticę enim nihil aliud, quàm renales sonant, 10. de comp. med. loc. cap. 1.

Neruum quidam appellant, omnia simularium corporū genera, in animalib. quæ & ex sanguine, & sensu carentia uidentur, ut quæ ex ossibus ab Hippoc. Copula uocata, quæ ex Cerebro & dorsali medulla ab eodē proprie Nervus & Tomus dicta quæque ex musculis Tendones dictis, prodeunt; quidam igitur omnia hæc nervos appellant, primum ipsorum genus colligatorium esse aiunt, secundum autem sensibile, atque electorium, tertium aponeurosim, hoc est neruorū propaginem cognominant, com. 1. in 6. de morb. vulgar. νεῦρον igitur, ἀπὸ τῆς νῆρας, Græcis

dictum est, quod nutare & flectere significat, ut docet Gal. initio libri de motu muscul. uide Tonos.

Neruum colligantem medici uocant, νεῦρον συνδετικόν, quem Hippocr. uocat ligamentum, seu αλυσθέρμιν, Copulam, ex ossibus ortum ducit, uide Neruum.

Nerui duri, & molles non eadem substantia sunt, molles enim ad sensum, duri ad motum sunt destinati; non quidem quod duri non sentiant, sed à duris hebetior & obtusior fit sensus, quàm à mollibus, mollium principium est Cerebrum, durorum spinalis medulla; ab hoc principio singuli in suas sedes à natura mittuntur, molles quidem in organa sensuum, duri in musculos; dicuntur autem molles, uel duri, sibi & ad Cerebrum, collati.

Nervos opticos, seu visuos, uide Nervos sensificos.

Nervos sensificos in genere uocant, qui ad sensuum instrumenta mittuntur, alijs quidem qui mouent membrum molliores, 7. de plac. 5. propriè autem sensificos uocant neruos, siue Poros, nervos à Cerebro ad oculos descendentes, qui soli sunt conspicui & sensibiles uis spiritus, 10. de usu par. 12. eosdem Opticos uocant, 16. usu p. 3. eosdem & visuos ab actione nomen imponentes, libr. de neruor. diff. cap. 2.

Nerui uocales sunt nerui gutturis, qui ad instrumenta uocem concinnantia propriè pertinent, quos Galenus, & inuenit, & eo nomine donauit, quibus uel incisis, uel laqueo interceptis, uox perit; qui alij sunt à neruis apud arterias existentibus, quos recurrentes nominant, ipsorum enim essentia pars sunt, utrique enim uocem efformant, 1. loc. aff. 6.

Nervus cauernosus, uide Nervosum.

Nerui voluntarij (ne equiuoca nomina obscuritatis aliquid afferant) qui ex Cerebro, dorsiq; medulla ortum ducunt,

ducunt, qui ex musculis tendones, qui ex ossibus ligamenta à nobis appellantur, libr. de ossib. in proœmio.

Nervorum coniugatio dicitur, quoniam nervus non unus aut simplex aut ἀσυνῆς, à suo principio proficiscitur, sed omnes coniugati feruntur, ideoq; ab anatomicis nervorum paria appellantur, ac septem quidem paria à Cerebro, triginta uerò à spinali medulla proficiscuntur.

Nervi recurrentes, νεῦρα καὶ ἀλινδρομεῦντα, sunt rami duo nervorū sextę coniugationis à Cerebro prodeuntium, quorum dexter circum arteriam quę axillam adit, sinister uerò circum magnum arteriæ descendentis truncum obvolutus, sursum reuertitur in laryngem, ad vocem efformandam, quare Galenus 4. loc. aff. φωνητικῆς, maluit appellare, idest uocales, ita enim sunt necessarij ad vocē, ut secti vel intersepti vocem prorsus aboleant; refrigerati uerò tantisper, vocem impediunt, donec calefacti, naturalem temperiem recuperauerint, 1. loc. aff. 6.

Nervosum, νεῦρωδες, corpus est spermaticum, & exanguē, ad nervi naturam & similitudinem accedens; licet enim Gal. tria nervorum genera dicat initio, libr. 15. de usu par. & com. 1. in 6. τὸν ἐπιδημιῶν, ut verbo Nervum docui; præter illa tamen tria genera, sedes, uterus, vesica, & pudendum nervosa dicuntur, cum tamen nullo prædictorum generum contineantur, aut componantur, sed quod nervosorum corporum similitudinem gerāt, contrahi enim in angustum, & extendi in latum possunt, quæ corpori carnosio & pingui non conveniunt. Vnde quidam Penis colem, nervum cavernosum appellant, ab eoq; penem & ipsum totum cavernosum vocant, quod contrahi, extendique possit, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2.

Nervosa & discriminationes sunt fines membranarum, quæ orificiis cordis adiacent, 1. de placit. 10.

... *Nestes* intestinum, vide *Entera*, & *Jejunum*.

Neurotonus est is, qui in nervis vel tendonibus, sine discrimine, vulneratus est, 3. de comp. med. per gen. 2.

Neutrum corpus est, vel quod neutrius extreme dispositionis est particeps, vel quod utriusque, vel quod nunc huius, nunc illius, ut salubre nunc, nunc insalubre, lib. tegr. cap. 6.

... *Nigra bilis* est humor melancholicus, qui dum animal naturaliter se habet, quotidie gignitur, quæ alia est ab ea quæ ex vitione ac velut assatione conflatur, 14. meth. c. 9.

... *Nigra vena*, vide *Media*, *Communis*.

... *Nigritia*, & *Nigror*, vide *Contusio*, & *Effusa*.

... *Nodi* sunt extrema pars posibrachialis, à quib. digiti incipiunt, quos *Condylus* Græci vocant, lib. Introd. c. 10.

... *Nomas* appellare medicis mos est, putrescentia ulcera, ab eo quod putredo depascat, & ad vicinas partes serpat, (ἀπό τῆ νίμοδαί, quod pascere significat) una cum primum vitata, & ipsas corrumpens, 9. simplic. vide *Phagedænas*.

... *Nothæ collæ*, vide *Illegitima*.

... *Nothon*, vide *Tergum*.

... *Notyæos myelos*, vide *Myelos*.

... *Nubis* nomen, solent Medici ab ære, ad urinas transferre, siue Hippocrates, hoc nomen primus pro aliqua eorum quæ pendent in urina, specie, vel Urinarum, siue is alius attribuerit; Vt ergo in ære interim temperatas sit, ubi nubibus condensatus sit atris, caliginosa; interim purus apparet & serenus, videnturque nubes quædam per eum disiectæ, ac tunc aer nubilosus dicitur; quo quidem tempore nubium cernimus colorem, non exquisitè atrum, nec lucidum; sed inter hos medium; haud aliter nubes in urina, quam vocat etiam Hippocrates nebulousam.

losam suspensionem, alia alba, alia nigra, alia media est, com. 1. in 3. de morb vulg. 4. quæ dicitur Nubes, Nubecula sublinamentum, ἐναίωμα ἐπινεφελόν; Caterum id omne crudum esse, & à flatuoso spiritu, in altum efferri Galenus docuit, quod verò perfectè concoctum, secretum, æquale simile reque est, id certè quoniam nihil flatus habet, in fundum uasis urinarij descendit.

Nucha, vulgò appellatur, quæ Latine spinalis medulla, Græcè ὀστέϊον μυελόν, vide Medulla spinalis.

Nutrimētum est, quicquid substantiam nostri corporis conseruare, & augere aptum est, 1. simpl. c. 1.

Nutritio est continuo effluentis substantiæ reintegratio, unumquodque verò, ea substantia, qua primum genitum est, ali etiam perpetuò consuevit, 1. de semin. c. 16. vide Prothesis. Vocatur autem alteratio ipsa, usque quo alimentum in similitudinem partis, quæ nutritur, transformatur, concoctio, ubi verò iam parti apponitur, nutritio, 8. de comp. med. loc. c. 6.

Nyctalops νυκτάλωψ., lusciosus, is est qui die videt obtusius, sole occiduo acrius. nocte magis adhuc, vel contra, die parum, vesperi aut nocte prorsus nihil, unde nocturna oculorum cæcitas appellatur, 2. meth. 2. 4. de cõp. med. loc. 8. & lib. Introd. vide Lusciosus.

Nympha, vide Colliculum.

O

OBAUDITVS, sine Obauditio, est vitiata actio auditricis facultatis, pro portione respondens vitioso visui, veluti cum oculis, colore, figura, magnitudine, vel situ mutata videntur, differens à Barycoia, quæ est audiendi difficultas, gravis auditus, seu diminuta audiendi actio, ut surditas est ablata audiendi actio; Aufertur autem, minuitur, vel deprauatur auditus, aut le-

sa aliqua aurium particula, aut nervo qui in has à Cerebro, pertinet, aut Cerebro ea parte, qua is nervus exoritur, 1. de Symp. caus. cap. 3. 4. 5. vide Barycoia.

Obliquatus pulsus est, qui non constituta in rectum arteria præter situm editur, lib. finit.

Oblongum & depressum dicunt ossis caput, ad cervicem id ipsum cui adnascitur, referentes, lib. de ossibus in proemio.

Obelaa sutura, est cranij commissura recta, quæ à media syncipitis sutura ad mediam futuram occipitis secundum longitudinem extenditur, Græcè dicitur, ὀβελία, καὶ παρθενῆς ἰσχυρὴ, utrumque nomen inditum est, quod verum aut sagitta, aut virge instar recta incedit, Latini rectā & sagittalē vocant, 9. de usu p. 17. & lib. de ossib. in proem.

Observatio, Τηρησις, Empyricorum vox est, qui quicquid observassent fieri in morbis, id ἀπορροια, & quasi axiomata nuncupabant; à qua proximè artem constituiebant.

Obstipitas est distortio spinæ ad lateralem corporis partem, 3. de artic. 2. quam Scoliosin Græci vocant, vide Cyphosis.

Obstruclio, vide Compressio.

Obstruentia corpora, quæ Græcè Stegnotica, quæque generaliori nomine cōtrahentia, occludentia, & constringentia dicuntur, sunt quæ ora vasorum occludunt, & quæ sensibiles excretiones cohibent. Corpus enim stegnoticum, quod claudit, & continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi, ex sese emittit, Græcè στέγνον nuncupatur; Differunt à condensantibus, quod hæc poros & meatus corporis contrahant, obstruentia autem & oppilantia, vasorum corpora, 5. simp. 14. illa στεγνωτικὰ hæc πύκνωτικὰ Græci vocant.

Obstupefcentia est, cum eger iacens, neque aliquid
dicat,

dicat, neque agit, sed apertis oculis quietus manet, similis ijs, qui ex timore sunt attoniti, 7. aph. 14.

Occiput, ὀπίθων, ea est capitis pars, quæ à vertice tanquam à centro circuli, unde capillorum prouentus incipit, ad posteriorem Capitis partem, usque ad Tendones, descendit, lib. Introd. c. 10.

Ochima trofis, i. vehiculum nutrimenti, simul cum appellatione, usum ostendens, quod Hippocr. vocat serosum recrementum, est aquosa & tenuis sanguinis humiditas, ad crassam substantiam Chymi, per arctas venas, in totum corpus ferendam, 4. de usu par. cap. 5.

Ocithode ulcera, idest uerrucosa, quæ non maligna, & contumacia sunt, sed solum labra callosa & dura habent, 4. de com. med. per gen. cap. 5. vide Dulcia ulcera.

Ocrea, vide Tibia.

Odaxismus, ὀδᾶξις μὸς, est pruritus is, qui conceptis iam intra gingiuas dentibus, & erumpere festinantibus, sentitur; quosolent infantes relatis ad os digitis, identidem eos mordere, & ipsi gingiuas suas confricare.

Odontalgia, idest dentium dolor, 2. meth. 2.

Odontoides, vide Dentem.

Odontophya, puerorum est dentitio, ubi scilicet è gingiuis prorumpunt dentes.

Odoratum, nominant, non solum odoris sensum, sed etiam vim ipsam, cuius odorandi officium est, libr. de instrum. odor. ca. 1. ὀσφραϊς Græcè.

Oedema, ὀἰδήμα, videtur Hippocrat. omnes præternaturam tumores, hoc vocabulo nominare, siue dolore careant, durique sint, quos scirrhus Græci appellant, siue dolorem inferant, quos phlegmonas, idest inflammationes propriè vocant, siue absque dolore laxi, atque molles sint, hos verò solos ὀἰδηµατα, Græci nominant, com. 1.

in 6. de morb. vulg. 2. Atqui oedema est tumor præternaturam, qui dolore vacat, & digitis cedit, & si aliquando apud Hippocr. significet durum, & dolentem tumorem, 1. progn. 29.

Oenodes vinum, id est, vinosum, quod multam sustinet aque misctionem, & imbecilles vires ferit, quod & Polypborum, & multiferum appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam; Contrario autem modo, Oligophoron, siue pauciferum, quod ut bibatur minima eget aque misctione, 3. acut. 20. & 7. meth. 6. vide Hydato-des.

Oesophagum veteres nominabant, eam partem, quæ inter fauces, & os ventriculi media est; Aristoteles, & qui post eius seculum scripserunt, Stomachum, nos gulam appellamus, quæ via est eorum quæ tum deuorantur, tum vomitione deijciuntur, 5. loc. aff. 5. gula, Arabibus Meri dicitur.

Oesyperus, id est lana succida, siue non lota, 14. metho. 7. vide Lana succida.

Olecranos, quartus est musculus, qui per profunda adit cubitum, in medio gibberi interioris, inferiorisque brachij capitis intervallo constitutus, 3. de anat. adm. ca. 4. à quo, & Cubitus, & Cubitios, Olecranos appellantur, vide Ancon.

Oligophoron, vide Oenodes.

Oligotrophia, i. parciior nutritio, 3. sanit. tuen. cap. 8.

Omentum, ἐπιπλοὺν ἢ ἐπιπλοῦν, est corpus membranofum ex duplici peritonæi, seu plexu compositum, procedensque medium inter vasa, quæ in ipso continentur, quibusdam aut multo infra quàm umbilicus consistens, quibusdam ad pubis ossa descendens, cum in primum, seu ad Umbilicum, parua magnorum vasorum soboles,

ex

ex alto deferuntur, 6. de anat. adm. 5. ex duabus tunicis densis, & subtilibus sibi incumbenribus, quamplurimis arterijs & uenis, & pinguedine non pauca conflatum, gratia calefaciendi, 4. de vsu par. 9. quod Epiploon, siue Epiplun Arabibus Ζηβυς, Antiquis Rete quod ita instructum Omentum reti non sit absimile, indeque γάρρα-μων & σάπρον à plerisque dictum fuit, libr. de ner. & art. diss. cap. 1.

Omicæ vena, idest humeralis, ramus est venæ cauæ clauiculas supergressæ per omoplata in brachium descendens, quam Galenus interdum externam vocat, ad differentiam axillaris, quam internam nominat, v. de Humeraria.

Omotribes, siue Omphacinum oleum, i. crudum oleum, ex oliuis immaturis expressum, 8. meth. 3.

Omoplata (quæ & homoplata dicuntur, & Scopiula, 8. metho. 8.) idest scapula, quæ humeri articulum constitunt; est enim in extremo scapularum insculpta capacitas tanta magnitudine, quanta Capiti brachij dearticulando, cui inferitur, esset aptissima, 13. de vsu par. capite 10.

Omos, humerus. Propriè dicitur id totum, quod in articulatione brachij cum Omoplata apparet sensibus, est enim reuera ipse articulus brachij cum Omoplata.

Oncae, apud Hippocr. idem est ac tumor, significatque id, quod est supra id quod est secundum naturam incrementum, libr. de tumorib. c. 1. Onchos verò & Poros quidam nostri corporis meatus vocant, 1. simplic. cap. 1.

Onix, idem quod πύκνωσις, libr. finit. est autem puris collectio in nigro oculi, cum phlegmone, iuxta Fridem, Græcè οὐγῆ.

Ophiasis, est affectus capitis, quæ capilli primum ex-

ten-

tenuantur; de inde decidunt, certis spatijs in Serpentis similitudinem; Idem reuera cum Alopecia malum est, solaque figura ab eo differt, vide Caluities & Madarosis.

Ophthalmia, hoc est lippitudo, frequentissima oculorum affectio, estque inflammatio tunicae, seu pelliculae os capitis, & Caluariam ambientis, quam & membranane agnatam uocant, propterea quod alyis quae oculum ipsum constituunt, tunicis, forinsecus adnata sit, ligamentumque existens toti oculo, ad circumscripta ossa, & ob id omnia quae circum circa oculos sita sunt, usque ad malas, quandoque in vehementi lippitudine attolluntur, 4. de comp. med. loc. c. 2.

Opium, est papaueris lacryma & succus, 2. de antid. 7. Vnde opiata medicamenta sunt, quibus opium admiscetur, quae Arabes vocant *Alsabiars*, id est Somnifera.

Opistotonos, vide Distentio.

Opopanaxem uocant Panacis guttam & liquorem, 3. de comp. med. per gen. cap. 5.

Oppilatio, vide Compressio, & Obstruentia.

Opticinerui, sunt primum neruorum par, quod cum utroque Cerebri panniculo, ad oculos descendit, secum uisibilem spiritum ducens, libr. de ocul. part. 2. cap. 3. vide Neruos sensificos.

Ordinatus pulsus est, quando ictus pari semper numero, partibusque pulsibus procedunt, quique per circuitum par est, de puls. ad Tyron. c. 6.

Orexis, ὀρέξις, appetitus, siue appetentia; est concupiscentia cibi & potus, quam Hippoc. Αἰμός, hoc est famem appellauit; eo aphorismo, quo scripsit, famem meri potione solui, ut in commento Galenus annotauit.

Oricularia, vide Laminas.

Oroboides, *Prina*, quae habet hypostasim similem orobis.

bis, eaque fit à Colligatione, & dissolutione Carnis, lib. de urinis, cap. 26.

Oros dicitur à quibusdam τοπεδιόν, hoc est pars tota pedis superior, quam alii πολυέσων appellant, id est multorum ossium, Orros verò tum serum lactis significat, tum Perinæon, tum etiam sacri ossis extremum, ad Caudam usque protensum.

Orthocolon, ὀρθόκωλον, quasi rectus articulus est articuli vitium, quando ob durum aliquem tumorem chorda musculos partem aliquā inflectentes, nō sequitur, sed perpetuò articulus tenditur, nec inflecti potest, 3. de art.

Orthopnœa, quasi rectam spirationem dixeris, est magna spirandi difficultas, ut non aliter ea fieri possit quā recta ceruice, & thorace, quale ijs accidit, qui uelociter cucurrerūt, unde affectio ὀρθοπνοία, qui sic affecti dicuntur ὀρθοπνεῖστοι. Idem malum ab alio symptomate Asthma nuncupatur; viscosis, & crassis humoribus, circa asperas in pulmone arterias sine febre congregatis, de difficult. respiricap. 11. & com. 4. in 6. de morb. vulg. 4. vide Anhelosi.

Os Στίμα, duobus modis dicitur, primum quantam diducta labra patent; secundo & propriè totum id spacium, quod dictis labris, ad imas usque fauces interiacet, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsillæ duæ continentur, quarum omnium partium una tunica est, etiam naribus communis.

Ossa, ὀσά, partes humani corporis durissimæ siccissimæ, maximeque terrestres & frigida sunt quæ se mutuò, & alias partes omnes, tanquàm fundamenta sustinent, & firman, atque ad uniuersam corporis substantiam sustentandam subiiciuntur, quibusq; omnia adnascuntur, & stabiliuntur, lib. de ossib. in proœmio.

Ossa

Ossa alata, vide Pterigodes.

Os Ballista, vide Astragalus.

Ossa cavernosa, vide ossa Ithmoidea.

Os cartilagineum, est quod ad caput Cordis inuenitur, ad quod omnium ipsius ligamentorum principia adaptantur, quod aliqui os cartilagineum, alij cartilaginem osseam nominant, 7. de anat. adm.

Ossa colatoria, siue Colo similia, vide ossa Ithmoidea.

Os cubiforme, vide Os Cyboides.

Os Cyboides, idest, cubiforme, est quod ab externis Tarsis partibus, est locatum, firmumque in terra statuitur, 3. de vsu p. cap. 7. & de articulatione cavitati calcanei, ad finem adjacenti, ibid. cap. 8.

Ossa foraminulenta, vide ossa Ithmoidea.

Os frontis, quod vulgus Coronale vocant, vide Coronale os.

Os humeri, quod Arabes, os adiutorii vocant, vide Adiutorij os.

Ossa Ithmoidea sunt ossa quædam foraminulenta, & cavernosa in meatu olfactorio posita, quæ natura varie pertusa velut spongiam & cribrum apposuit; simul ne aliud corpus durum extrinsecus incidat, simul ne viribus integris aer frigidus inspirantibus nobis, rectè in Cerebri ventriculos se se insinuet, simul ut vapor odorem secum ferens per ea foramina à Cerebro recipiatur, simul ut Cerebrum vacuaret repente, ac semel si quando usus inciderit, excrementorum copiam; quæ quoniam ad Cribrum & spongia similitudinem perforata sunt, ideo ithmoidea, & spongoidea dicuntur, 8. de vsu p. cap. 6. & 7. quæ ossa Galenus 3. loc. aff. 10. colatoria, vel colo similia vocat, quod per illa crassum Cerebri excrementum purgetur & persoleatur; quod Arist. vocat Perittoma, tenuio-

nio-

uiora autem excrementa, & quæ vaporis similia sunt, in sublime lata per caluarię suturas excernuntur; crassiora autem prona feruntur, quorum altera pars in eas vias, quæ ad os pertinent, influit, & per sreatum ejicitur, altera quæ mucus dicitur in nares, & per efflatum vehementem, excernitur, lib. de inst. odor. cap. 2.

Os Iugale, vide Zygoma.

Os latum, vide Spina.

Os magnum, vide Spina.

Os nauiforme, vide os scaphoides.

Os palati, vide Sphenois os.

Os petrosum Λιθιδες, ossis nomen, sic dicitur pars ossis temporalis, protesis suturæ lambdoidis sinibus terminata, sic dicta, quod petra, vel rupi videatur similis, non duritie modo sed etiam specie.

Os sacrum, ἱερόν ἰσπὲρ, duobus modis a Galeno sumitur, uno latius ut Coccygem etiam apprehendat, ut 12. de usup. scribens os sacrum constare ossibus quatuor, tribus scilicet propriis, & Coccyge; hæc enim ossa sibi unita per symphysim, efficiunt unum os, quod parte superna vocatur sacrum, inferna Coccyx. Altero, sumitur pro ea tantum parte, quæ re vera sacra est, idest magna, & lata, qua parte hoc os, cum osse Illo per synarthrosim iungitur, idest magnum & latum, tuncque eius reliquum gracilescens semper ac tenuatum, in tres cartilagineas acutissimas desinit, & Coccygem vocant, lib. de ossib. ca. 12. & 3. de artic. 104.

Os scaphoides, vide Scaphoides os.

Ossa spongoidea, vide Ossa fethmoidea.

Oscitatio, & Pandiculatio, sunt mediocres motus virtutis expultricis Cerebri, 2. de sympt. caus. cap. 6. per quæ contenta aliqua in musculis (per quos quoque voluntarij sunt

fiunt motus) vel humiditate flatuosa, vel spiritu flatuoso expurgatur, 7. aph. 56. Oscitatio tale quidem in solis maxillæ inferioris muscalis accidit, quale in Pandiculatio-
ne in omnibus musculis symptoma est; utraque enim eua-
cuandorum in musculis halituosorum excrementorum
causa fit, com. 1. in 6. de morb. vul. 4. & 7. aph. 56. $\chi\acute{\alpha}\sigma\mu\eta$
illa, $\eta\epsilon\varsigma$ $\sigma\kappa\omicron\phi\delta\iota\nu\eta\mu\acute{\alpha}$, Græcè.

Osculorum apertio, quæ tum in arteriis, & venis fit per resudantiam, & dicitur Anastomosis, siue Exanastomosis, tum in ulceribus & vulneribus, quæ sinuosa sunt, fistulosa, & angustî orificiî, quæque dehiscunt, 6. de compos. med. loc. cap. 2.

Ostocopi, idest, ossium dolores nominantur, cum membranarum quæ ossibus adiacent dolores, & profundi sunt (idest in intimo corpore sensum excitantes) & ossium ipsorum ueluti dolentium inducunt imaginem, qui magna ex parte ab exercitationibus euenire solent, interdum à frigore, & plenitudine, 2. loc. aff. 8.

Ostracoderma, animal omne est, cui pro cute, testis est, lib. 1. de aliment. fac. 1.

Ostraga, instrumenti genus est, quo in ossium fracturis, collisionibus, & comminutionibus utimur, 6. met. 6.

Otalgia, aurium dolor est, non omnis quidem, sed qui ad profundum auditorii meatus pertinet, 2. meth. 2.

Otenchyta instrumenta sunt chirurgica, quib. aliquid in aures infunditur, Aurifusoria specilla ab aliquibus, à Celso strigiles, aliàs auriculares clysteres appellantur.

Oxelæum, idest compositio ex aceto, & oleo, 1. de compos. med. per gen. cap. 7.

Oxycratum, idest compositio ex aqua, & aceto, 1. simplic. 29.

Oxydercica facultas est, quæ oculos, ubi nullum insit illis

illis sensibile pathema, male tamen munere suo fungentes, corrigit & in integrū restituit, ac nimirum & in auribus, & naribus, & per quemque aliorū sensuū singulatim pro portione talis quaedam sit facultas, est necesse, quæ in auribus oxycos dicitur, 5. simplic. 23.

Oxygalax, idest acidum lac. 3. aliment. 16.

Oxymel, non ex aceti, mellisque mixture tantū, compositio est, verum ex mulsæ paulum aceti accipiente, 3. acut. 24. & 4. sanit. tue. cap. 6.

Oxyregmia, idest acidus ructus, qui sine aliqua pituita, quandoque in uentriculo frigidior, & in quibusdam leuitatibus intestinorum, quæ ex frigidityte ortum habent, unda sunt, 6. aphor. 1.

Oxyrhodinum, quod & Rhodinum dicunt, est frontis linimentum, ex aceto, oleo, & rosacea capiti phreniticorum, perfusum, 13. meth. 21.

Oxys, idest acutus, à quo ὀξύς πυρετός, acutas febres, ὀξύαν ποσόν, & ὀξύ νόσημα dictum est; Consistit autem acuti morbi essentia, non in celeri tantum motu, sed in magnitudine & periculo. 2. aph. 23.

Ozena, est ulceratio in naribus profunda, tetri odoris, atque halitum emittens, lib. finit. & 3. de comp. med. loc. cap. 3. unde ex ulcerum genere est, eoque à polypo differt, qui in tumorum tantum genere est, non ulcerum; nascitur influxu humorum acrium, & putrescibilium à Cerebro in nares facto, unde uel earum alæ, uel interstitium, uel aliæ partes exulcerantur.

P

PÆDOTROPICA, est medicina pars, quæ de puerorum sanitate, doctrinam instituit, libr. de part. art. med. cap. 5.

Palatum, partem illam in ore altioris sedis canam uo-

cant, quae super foramina è naribus in ipsum pertinentia, sublimis est. com. 1. in 6. de morb. vulg. 3.

Palatios, uide *Basim Cerebri*.

Palimnolus homo dolosus est, qui aliud loquitur, aliud sentit, & qui facile sententiam mutat, eiusmodi quoque morbus appellatur, qui speciem quidem illi facit leuationis, sed tamen intus malignus est, com. 1. in 6. de morb. vulg. 6.

Pallida bilis, uide *Bilis pallida*, & *amara*.

Palma est ea pars manus, quae *Metacarpium*, & post brachiale dicitur, 1. de m. j. c. diff. cap. 21.

Palmòs, uide *Palpitatio*.

Palpitatio, quae & *Subsultio*, & *Palmòs παλμὸς* Graece dicitur, similiter atque tremor, motus est, quo partes palpitantes, circa uoluntatem nostram, nobisque inuitis attolluntur, & deorsum aguntur, à crasso & uaporofo spiritu, cui non adsit exitus; differunt uerò palpitatio à tremore, quod nemo qui artus mouere non instituerit, tremet; palpitantes autem particulae etiam si in quiete fuerint, sique nullum illis motum induxeris, palpitant; Etenim supercilium palpebrae; & oculus subinde citra omnem uoluntatem attolluntur; tremor autem totius & integri membri motus est, ut totius manus, brachij, capitis; palpitat uerò pars membri, ut uel sola cutis, uel sola arteria, ut censebat *Praxagoras*, uel solus musculus ut *Herophilus*. Tum & quae tremunt totum mutant locum, quae autem palpitant partes, eundem obtinent sed modo ampliore, modo minore; in se ipsas enim concidunt partes palpitantes, dum contrahuntur, aliò autem mouentur, quae tremunt. libr. de trem. palp. cap. 4. & 5. Adhuc *Palpitatio* est contractio quaedam præter naturam, in illis corporis partibus, in quibus distentio, dilatatio, & contractio

tractio accidere possunt, 2. de sympt. caus. cap. 2. non enim os, vel chartilago palpitant, quod dilatari non possint. Adhuc palpitatio motus est à toto genere præter naturam, tremor autem missus ex motu secundum naturam, membrum mouente, & motu præter naturam, uirtutem ad uolenter mouendum prioritante & cogente, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Palpebrae sunt externa oculi partes, supercilijs subiacentes, superius, inferiusque interiores tunicas contegentes, hæc inferior, illa superior, lib. Introd. c. 10.

Pancæus, uide Endemus.

Pancratium, uide Pancreas.

Pancreas, corpus glandulosum, vel caro glandulosa est in medio mesenterio sita, quam natura quatuor uasis, uenæ, arteria, nervo, & uescibilis in orbem substravit; diuisionesque inter se mutuas repleuit, ne ullum ipsorum facile scindatur, propter uehementem motum, sed molli cedente corpore, conquiescat, 5. de usu par. capitu. 2. quod corpus, vocat etiam Pancratium, 1. de motu musc. 6. Idemque & Pancreon, & Calicreon, dicitur, libr. de ven. & art. diss. cap. 1.

Pancreon, uide Pancreas.

Pandemus, uide Endemus.

Pandiculatio, uide Oscitatio.

Panus, idest tuberculum immaturum, quod aliquando & magnum, & durum, & diuturnum exoritur. 3. de art. 2. est enim tumor, non altus, sed latus, in quo quoddam pustulæ simile est, panis similitudinem habens, hinc Latini Panum etiam appellant, uide Phygethlon.

Papilla mammae, idest extremum mammae mulieris, quod ori infantis inditur, 15. de usup cap. 7.

Papula, nomen est ijs, quæ sponte extuberant in cute,

conueniens, quæ superfluis constant humoribus, atque qualitatem etiam non iniuria subsequuntur, cum tennes humores sunt, exulcerationem potius, quàm tumores creant, at crassi intumorem pellem attollunt, com. 3. in 3. de morb. vulg. § 1.

Paracentesis, idest punctio, quæ Hydropibus, & Herniosis adhibetur, ad aquam euocandam, 14. metho. 13. & 6. aph. 27.

Paracmastica, vide Continua.

Paracynanche, vide Cynanche.

Paralysis (qua & Paresis à medicis dicitur) est nervorum resolutio cum nervi, alicuius ex non præcipuis corporis partibus omnino sensus, & motus, expertes sunt, 1. de sympt. caus. cap. 5. sitque cum humorum multitudo indissolubiliter in aliqua corporis parte ex non præcipuis impacta fuerit, ut & Epilepsia, & Apoplexia partis dici possit, 4. acut. 27. Exquisita autem paralysis est, in qua nervi omnino sensum & motum perdiderunt; imperfecta in qua, motus quidem perit, servato sensu, imperfectior in qua incolumi motu, sensus aboletur, est enim paralysis motus potius, quàm sensus affectio; quæ si fiat in uniuerso corpore apoplexia potius dicenda est, quam uera paralysis. Acciditque paralysis oculis, ubi & mollities dicitur, cum oculus, uel motu, uel uisu, uel utroque priuatur, laeso vel Cerebro, vel nervo concauo, uel spiritu uisibili, lib. de ocul. part. 4. capit. 13. Estque Paralysis etiam imaginatricis facultatis affectio qualis, quæ & Caros, & Catalepsis nominatur. de sympt. differ. cap. 3. vide Resolutio.

Paramefus digitus, idest digitus anularis, lib. de muscul. diff. cap. 22.

Paraphrosyne, prauus quidam, erransque motus uirtutis

tutis imaginatricis, Cerebri est, qui & delirium dicitur, de sympt. differ. cap. 3. differt verò ab Ane, & amentia quod illa sit imaginatricis, aut ratiocinatricis depravatus, vel diminutus motus, hac verò earundem facultatum paralyfis, & resolutio.

Paraphimosis, vitium est Phimosi contrarium, cum videlicet ea quæ naturales meatus concludunt, ita diducta sunt, ut reduci nequeant; proprie tamen dicitur de præputio retrorsum adducto, ut glandem tegere nequeat; quod malum ex nervi contractione maxime contingit, sit & ex immodica præputij siccitate; ei contrarium vitium Phimosi appellatur, lib. finit.

Paraplegia, est alicuius corporis partis immobilitas sensusque privatio, quam etiam Apoplexiam per abusum vocat Hippoc. com. 2. in 1. prorrh. 50. quod utraque à frigidis, & pituitosis fiat humoribus. Paraplegia affectio unius partis corporis talis est, qualis paraplexia totius, com. 3. in 1. prorrh. 26. Interdum facta absque convulsione Apoplexia, in partis alicuius resolutionem finiens, paraplexia appellatur, 4. acut. 27. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 59. Apoplexia, à paraplexia, ut à toto pars, differt; Apoplectici namque prorsus & paraplectici sunt; Paraplectici verò, non omnino & Apoplectici. Adde sanos mente paraplecticos, resolutos parte una corporis dextra, vel sinistra, Apoplecticos & mente, & toto corpore resolutos esse constat, lib. finit. Ex quibus omnibus locis nunc videntur idem significare paraplexia, & paraplegia, quasi unam apoplexiæ speciem, nunc paraplexia genus est ad paraplegiam, suam speciem.

Pararhythmus pulsus est, qui (cum quaque ætas proprium pulsum agnoscat) non convenit illi ætati in qua

est ille pulsus sed alterius proximioris, quemadmodum heterorhythmum pulsus vocamus, qui alterius ætatis habet rhythmum. lib. finit.

Parastatæ, qui & seminarij meatus dicuntur, quasi Latine astites nominentur, sunt qui ex vena & arteria constant, in unam naturam consertis, semen confouentes, lib. finit. vide Glandulosi assistentes.

Pararosis, est depravata visus actio, cum oculis colore, figura, magnitudine, vel situ, mutata videntur veluti Amblyopia est diminuta actio visus, & cacitas, ablata. I. de sympt. caus. cap. 5.

Parasynanche, vide Cynanche.

Paregorica, idest mitigatoria medicamenta, quæ non sanant, sed mitigant, ne malum crescat, lib. de Dynamid. in præmio.

Parempsis, (quam & Periptosis, hoc est incidentiam & casum vocat. 3. παρὰ πρὸς) est intercidentia, siue coincidentia, cum ea plenitudo, quæ ex ingestione eorum, quæ comeduntur, & bibuntur in venis gignitur, à venis in arterias delabitur, lib. de caus. procata est. cap. 3. atque uniuersim peremptosis est, quando aliunde in aliud vas humor fluit, 7. de anat. admin. capit. 16. speciatim, transumptus spirituum ex arterijs in venas, parempsis dicitur, lib. de venæ sect. contra Erasistratum, cap. 2. vide Coincidentia.

Parencephalis, quod & Cerebellum, & Encranion dicitur, est posterius Cerebrum, quod a priori (anterius enim propter sui magnitudinem, nomen totius sibi vendicauerat) crassæ meningis duplicatione est diremptum, 8. de usu p. cap. 1. vide Cerebrum.

Parenchymata (quasi affusiones dixeris) Græci vocant carneam illam substantiam, quæ inter vasorum intercape.

tercapedines recipitur, 7. de anat adm. cap. 5. ut quæ in visceribus, ceu Iecinore renibus, liene, & pulmone visitur, quam substantiam Galenus non vult vocari carnem; ea enim solum caro dicitur, quæ in musculo est, reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci sed quæ in visceribus, ceu Iecinore, renibus, liene & pulmone visuntur, eas parenchymata, (quasi affusiones dixeris) Græci vocant; quæ verò in intestinis ventriculo, stomacho, & utero sunt, sine nomine relinquunt, 10. meth. 11.

Paresis, idem quosî paralysis, idest resolutio, vide Paralysis.

Parietalia, vide Bregmata.

Paristhmia, quæ & Tonsillas, & amygdalas vocant, sunt locorum ad Isthmum (idest eam oris regionem quæ os & gulam interiacet) attinentium inflammationes, 3. aph. 26. Paristhmia, Tonsillæ, & Vuæ, nihil aliud sunt, quàm inflammationes, Vuæ quidem Gargareonis, Tonsillæ verò adenum, qui in principio faucium inter se oppositi sunt, Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus sunt, lib. de tumor. cap. 17. quonamine non solum inflammationem, sed etiam faucium partem illam nominant. Sic autem eam appellauerunt Græci, quod locus ille cui adiacent, cui ueluti Isthmus quispiam angustus est, quum inflammatione tumet, multo quàm antea angustior fiat. Latini Tonsillas diminutiua voce a tolles, hoc est tumore appellant. Alio nomine etiam ἀντιάδης vocant. vide Isthmus.

Parocheteusis, idest deriuatio, est cum sanguis auertitur, atque ad alia membra proximiora conuersus, deriuatur, si verò ad contraria reucllitur, Antispasin Græci vocant, 5. meth. cap. 2.

Paronychia, abscessus est, qui ad latera unguium adnascitur, 8. de comp. med. loc. cap. 2. quem Arabes panariticum vocant, Latini Redunias.

Parotides, vide *Eparmata*.

Paroxysmus, vide *Accessio*.

Partes inanes corporis sunt quaecunq; inter extremam thoracis costam, & femoris ossa habentur, 2. progn. 1.

Partus rōnos; actio est partim uteri, ipsius adaucti fetus gravitate, & excrementorum redundantia laesi & distenti, ut propria expultrice, fatum in cutem ejicientis; partim ejusdem fetus grandioris effecti, & maiori alimento, quàm quod in utero recipere possit, indigentis, atque ex uteri angustia & adaucto nativo calore suffocationis imminens periculum auersantis, quum non sufficiat spiritus maternus, quem illa per arterias subministrat, ad exitum repente concitati.

Parulides, vide *Epiludes*.

Parygron, idest, humidum. seu liquidum medicamentum, quod medetur particulae, parua adhuc phlegmone, confluctanti, non multo post confectionem tempore, sed protinus impositum; ubi duritiem à dolore alienam pars affecta acquisierit, vel paulo recenti vetustius utile est, quemadmodum etiam si phlegmonoso affectu, omnino sit libera, 7. de comp. med. per gen. cap. 2.

Passio, πάθος πάθημα, generaliter quidem dicitur, omnis motus qui ab altero in alterum fit, siue secundum naturam fiat, siue præter naturam, qua parte ab altero recipitur, hinc visio, auditio, calefactio, frigefactio, humectatio, delectari, dolere, gaudere, tristari, passiones dicuntur, quorum essentia in fieri est, cum motus sint, cuius nullæ sunt partes permanentes, sed dum fiunt solum sunt; solumque in verti & mutari generationem habent; Cum

motus autem desit, non affectio aut passio, sed affectum esse & passum dicitur, Græce διαθεσις, speciatim verò non solum dum fit alteratio passio dicitur, sed dum facta est, quæ motu absoluto superstes est, quam etiam πάθος appellant, ut ex vulnere cecitas, ex contusione nigror, ex febre tabes, ex continuis uigijs sapientia, Tertia adhuc significatione specialius, non modo passio quæ fit, nec quæ facta est, sed quæ est præter naturam tantum facta affectio, ut ex vulnere cecitas, quæ significatione morbi, & symptomata à medicis passionibus dicuntur; uide affectus & symptoma.

Pastilli Græci τροχίσκοι, seu rotulae & orbiculi ab efformationis figura, dicuntur medicamenta plana in rotæ aut circuli formam coacta, 5. de med. per gen. 11. & 1. de antid. cap. 9.

Passio, idest ulcus depascens, 5. med. per gen. cap. 3.

Patella est os chartilaginosum, & rotundum, gibbum, quæ femur Tibiæ connectitur, aliterque Mola dicitur, lib. de ossib. 23. quæ & Rotula & Myla & Epigonatis, 1. super genualis appellatur, 3. de usu p. c. 15.

Pathema, i. passio, uide Affectus, Passio, Symptoma.

Pathognomonica syndrome, idest concursus effectuum index, 1. loc. aff. 1. Pathognomonica autem signa sunt, quæ & homoidea, & homogenea dicuntur, idest, eiusdem speciei, uel generis, quæ in una aliqua fiunt affectione, quæ perpetuò & soli illi, insunt, tanquam soli propria, & inseparabilia existentia, ueluti quæ per sputa excernuntur, affectionis tum pulmonum, tum thoracis, tum asperæ arteriæ, tum gutturis, & tandem respiratione subseruientium instrumentorum, signa sunt, quæ & in respiratione uitium per se & primum contraxerunt, non per consensum: atque hæc signa sunt certissima, non autem ea quæ perpetuò, sed

Pedion, idest planum, planities, seu planta est pars pedis, quæ est ante digitos, quæ uerò pars ante hanc sita est, *Tarsus* dicitur, 3. de usu par. 5. *Arabice* *Rascetta*, illud *metacarpio* manus, hoc *Carpo* pro portione respondens, cap. 6. Atqui & interiorem summæ manus regionem, & quantum infra pedem est, *pelma* Græcè, plantam Latine dicunt, 2. de anat. adu. cap. 1.

Pelignus est color liuidus, 14. meth. 9.

Pelma, vide *Tedion*.

Peluis, vide *Infundibulum* & *Choana*.

Peltalis chartilago, vide *Cricoides Chartilago*.

Pemphygodes febris, vide *Febris Pemphygodes*.

Penis στῆμα, virile membrum, quod & αἰδοιον, & καυλός dicitur, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Pensilis Verruca, (vide *Acrochordon*) dicitur, quod in imo usque adeo sit angusta, ut pendere videatur, tota enim foras prominet, adeo ut excisa nullam radiculam relinquat, angustiore basi prædita, atque ob id pendere uideatur, summæ chordæ similis; à *Myrmecia* differt, quæ basim habet latiore, & nigro colorem præditam, atque ubi à chirurgo tollitur, sanguinem fundit copiosiore, quæ & sessilis *Verruca* appellatur, vide *Myrmecia*.

Pepasmus, πεπασμός, morbi est, & eorum quæ præter naturam sunt veluti coctio quadam & maturatio, in qua quod assimilatur paucum est, quod autem semicoctum & superfluum, multum; Quâquam alibi πεπασµο significatum latius extendit Galenus, dum omnem deductionem in mediocrem temperiem πεπασµὸν appellat, & alibi omnem morborum πῆψιν, idest coctionem in succorum alteratione consistere scribit.

Pepsis, vide *Pepasmus*.

Pera-

Peracutus morbus, vide Acutus simpliciter.

Per consensum morbus, vide Idiopathia.

Perditio, vide Abortus.

Perfrictio est natiui caloris frigiditas sine sensu doloris, longiori temporis spatio, & paulatim facta, lib. de tremor. conuul. cap. 6. quæ natiuam caliditatem, ab humorum multitudine grauari ostendit, 4. acut. 26. vide Frigus.

Perforatio, est sectio, quæ in spatiosam pulmonis sedis capacitatem penetrat, reliqua, uerò omnis diuisio ipsius, nulneratio quidem dicitur, perforatio non item, 7. de anat. adm. c. 14. Nominatur adhuc & perforatio, magnus quidam uentriculus, & meatus qui ab anterioribus duobus Cerebri uentriculis, in ipsum Cerebellum prorumpit, per quem parencephalis Cerebro, est communis & connexa; cum enim Cerebrum sit à parencephalide, crassa meningis duplicatione diremptum, ipsumque oporteret aliqua parte illi coniungi, quo prædictum meatum produceret, in unum prius locum utresque uentriculos terminauit, quem sanè quartum totius Cerebri uentriculum nonnulli nuncupant, alij rectius non uentriculum, sed perforationem nominant, ex qua cavitae animalis spiritus parencephalidi transmittitur, 8. de usu par. c. 11.

Periapta medicamenta, sunt capitis dolori conferentia, quæ Latinis Amuleta appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligentur, lib. de remed. par. fac. cap. 1. vide Amuleta.

Pericardium, quod & membrana, & tunica dicitur, membrana à substantia, tunica ab usu, 7. de anat. adm. cap. 2. vide Membrana Pericardios.

Pericranios membrana, tunica est cranio superposita, quæ ex duplicatione dura meningis connatq. undique & adhærescentis intrinsecus cranio, per suturas extra cranium

nium egressę, ut cranium durameningi & Cerebro ar-
tius uinciret, ipsi cranio extrinsecus in orbem circun-
funditur, 8. de usu p. cap. 9.

Pericharia, hoc est, subitum, & uehemens gaudium,
contrarium Ecplexi, quę est subitus timor, ambarum oc-
casione scimus multos interisse, 12. meth. cap. 5.

Pericholus, idest biliosus, siue is homo sit, siue deie-
ctio, siue urina, siue morbus, com. 2. in 1. in 1. prorrhet. 18.
Consueuerunt autem excrementa bilem, substantia te-
nuem circiter habentia, atque ea circumuoluta, uocare
Perichra, idest circiter colorata, ibid.

Perinæon, quod & Perinæum, semen, & interfemi-
neum dicitur, uide Interfemineum.

Periodus, uide Circuitus.

Periostios membrana, & tunica est ea quę singulis
ossibus adiacet; aggenerauit enim natura ac circumiecit
omnibus ossibus carnes, simulque ipsa pinguißima quoque
partesuctu extracta; terrestria atque arida, necnon pin-
guedine omni prorsus carentia reddidit; atq; ex eo quod
extraxit lentum ac tenax singulis, & in capitibus colli-
gamina, quibus inter se connectuntur, & in longitudine
circum undique tenues membranas produxit, quę cir-
cum ossa, hoc est, ossium innolucra, & periostia nuncu-
pantur, quibus carnes aggenerauit, 1. de semin. cap. 10.
Estque periostios membrana, succingentem costas cir-
cundans, quę costis intus tenditur, ita ut inter costas &
succingentem, media collocetur, 8. de anat. adm. cap. 10.
Est quoque periostios oculi tunica, septima in ordine,
quę totum oculum cum ossibus colligat, simul autem &
mouentes ipsum musculos, operit, 10. de usu par. c. 2.

Peripneumonia, seu Pulmonia, pulmonis inflamma-
tio est, quam semper acuta febris comitatur, qui cum ui-
scus

scus sit laxum & molle, fistulisque inanibus undique infinitis cauum, cordi vicinum, à pituitosiore atque crassiore sanguine inflammatur, cum subtilis, biliosusque fluat ferè nec cum viscere ulla ratione coherescere possit, 4. de caus. puls. cap. 12. eadè pulmonia appellatur, 2. progn. 64. quam sequitur spirandi difficultas, tantaque angustia ut suffocari laborantes uideantur, ac recti sedere conètur, calidamq; sentiunt expirationem, multumque aerem frigidum attrahere concupiscunt, atque inter tussendum sputum varium colore eijciunt, insuper gravitatis cuiusdam, thoraci incumbentis sensum sepe percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipsum pervenire, & ad os pectorale, & ad spinam, 2. loc. aff. cap. 9.

Periptosis, uide Paremtosis.

Peritonæum, membrana est à Græci vocabuli etymologia dictum, quod alimenti vasis prætendatur, quæ & Peritonæos membrana peritonæos tunica, & tegumentum appellatur; tenuis substantiæ membrana est, ex simplicium & primorum corporum numero, prætenditurque tum visceribus, tum intestinis, tum vasis, quæ inter septum transversum & crura habentur, tum etià ijs quæ interiacent, quale est vulva, & vesica, tenuæ admodum corpus, latis araneorum telis simillimum. 6. de anat. adm. c. 4. abdomini substratum, 4. metho. 6. Arabibus Siphac.

Peritonæi vertex membrana est, telis araneorum similis, inferioribus septi partibus obiecta, sibi continua, totam inferiorem septi transversæ regionem subliniens eidemque circum hærendo, & simul serpendo, 6. de anat. adm. cap. 8.

Perittoma est id, quod post completam coctionem, nec confectum, nec assimilatum relinquitur, quod corpori nec adnascitur, nec accrescit, sed per ipsius laxiora intus spatia tanquam superuacaneum errat; Vnde nomen quoque rectè

reſtè à maioribus ei, Perittoma eſt inditum, (1. de ſanit. tuen. cap. 3.) ideſt excrementum. ſive id ſpiritus, ſive corpus aliud ſolidum ſit, περιττώμα Græcè.

Perniones, quæ & Chimethia dicuntur, ſunt intertrimenta, & ſciſſuræ manuum, & pedum hyberno tempore à ſummis algoribus facta, libr. de med. fac. part. cap. 203.

Perona, ſura, fibula à quibuſdam; eſt alterum os tibię exterius & tenuius, alterum enim quod craſſiſſimum eſt, & interiori in parte ſitum, κνημὶ Græcis, eodem cum tota parte nomine, Latinis Tibia appellatur. Galenus autem ex Hippocrat. in ταῖς γλώσσαις dicit, Peronam diuerſa ſignificare, aliquando quidem os totum membri, aliquando ipſius offis epiphymiſim, interdum eius protuberantiā, ideſt malleolum.

Perofis, hoc eſt oblaſio, eſt priuatio & impedimentum naturalis functionis, aut alicuius particula mutilatio, ib. finit.

Persistentes morbi ſunt, qui eiſdem horis accedunt ac remittunt, libr. de Typis, cap. 3.

Perspiratio, & Perspiratus, vide Inſpiratio.

Per viciniam affici, vide Idiopathia.

Pes, πῆς, pars infima cruris eſt, quæ multiplici offe conſtat, malleolis, talo & digitis definitur, ex Ariſt.

Peſſarium, Peſſus, πτερός, eſt lana concerpta, aut pannus, aut bombax, aut linamentum, ad digiti figuram, rotundum factum, demerſum in medicamentum aliquod, inuolutum ſerico, filoque appenſum, tum præſertim utero accommodatum.

Peſtilentia, febris peſtilens, morbus peſtilens, Λοιμὸς, idem ſignificant, eſtque morbus Epidemius, contagioſus, pernicioſiſſimus, communis, è communi cauſa natus, aduen-

runt; quod si depaſtionem cum putrilagine ſuſtinent. No-
mādicuntur, ideſt depaſtious, 6. de comp. med. per gen.
cap. 1. παυδαίνας Græcè.

Phalacroſis φαλάκρωσις, caluitium, ſeu caluities, pi-
lorum capitis defluuium eſt; propter humoris penuriam,
non autem humoris uitio, nam tunc diceretur Alopecia,
uel Ophiasis, uide Madaroſis.

Phalanx, articulus eſt, tum maximè quo magnus di-
gitus offi Carpi propinguo, dearticulatur, 2. de uſu par. cap.
9. Græcè σκυτάλις, φαλάγγες, uide Digiti.

Phalangosia, affectus eſt, quo pilorum ſubnaſcentium,
duplex, triplexue acies, uel in ſuperiore, uel in inferio-
re palpebra, prouenit; libr. Introd. cap. 15. Ex quo uide-
tur author Introducitorij phalangosin, idem facere, cum
diſtichiaſi, quod falſum eſt, quoniam in hac noui pili, &
non naturales ſuccreſcunt, in illa ſoli naturales pili ſunt, qui
inuerſi negociū oculo faceſſant; in qua cilium introſpectat,
pilorum acie ſimul cum eo inuerſa, ut inquit Paulus. ſic e-
nim oculum compungunt; quibus duobus affectibus, commu-
ne genus eſt Trichiaſis, ideſt noxa oculis à bilis proueniens,
qui pili ſi recenter exoriuntur, diſtichiaſim efficiunt, ſi nati-
ui, & naturales, phalangosim.

Pharmaceutica medicinz pars eſt, qua medicamentis
per os aſſumptis medetur, 3. de comp. med. per gen. c. 2. alte-
ra therapeuticę medicinz pars.

Pharmacia, purgatio, καθάρσις, ἀνακάθαρσις, duplicem
habet apud Hippoc. & medicos ſignificationē, vnam qua ſi-
gnificat, humorum qui ſua qualitate moleſtant, euacuatio-
nē ſiue natura, ſiue arte fiat, per quamcūq; regionem, vom-
itum. ſudorem, urinam, nares, tuſſim, aluum, uterum; alte-
ram qua eiusdem humoris ſit euacuatio per aluum tantum
ope medicamēti, prior ſignificatio habetur, comm. 4. in 6.

de mor. vulg. posterior in eo aph. qui bene corpore habent, difficulter fere purgationes; & corpora sana cum purgantur, exoluuntur.

Pharyngethron, apud Galenum, nunc pro Pharynge sumitur, nunc pro osse hyoide, quod sit portio maxima Pharyngis, vide Hyoides.

Pharynx, duos significat, & fauces id est regionem intra os, ubi tam gulæ tum asperæ arteriæ extrema concurrunt, id est medium illud spatium inter laryngem & gulam; & ipsam asperam arteriam, cuius summum laryngem uocant; veruntamen loci uicinia effecit, ut pharyngis nomine, nunc pro medio inter laryngem & gulam spatio, nunc pro aspera arteria, nunc pro ipsius asperæ arteriæ summo capite, i. larynge, indifferenter sumatur, ut ex pluribus Galeni, & Hippocrat. locis elicere est.

Phathnia, sunt ossa dentes continentia, libr. de ossib. vel ut alij sunt aluoli & prasepiola, & cavitates quibus dentes inseruntur, quas Græci *λοβία* uocant, unde uidentur hæ duæ voces *φάθνια* & *ἐσθπια*, idem significare.

Phaulon simplicem & vulgarem uictus rationem uocat Hippoc. ita eam quæ huic contraria est exquisitam, inter utranque autem medium, hypophaulon, id est subuulgarem nuncupauit, 1. de fract. 45.

Phimos, & Phimosi, vitium quoddam in masculis est, ut docet Cels. lib. 7. cap. 25. in quo Colis glans, ita cutis tegmine contestæ est, ut nudari non possit; huic contrarium mælum, in quo propter cutem curtam, aut retro abactam glans tegi non potest, Periphimosi, vel parephimosi appellatur.

Phimosi est, cum cutis palpebrarum extrinsecus ualde ensg. immatur, atque id, cò usque, ut uicina regionis pars aliqua

aliqua occupetur, palpebra inuertitur, cum uerò modica quidem in cute inflammatio est, at membrana quæ intus ad Irim usque extenditur, valde deficit, tunc fit ut intro palpebra conuertatur, quod uitium cum utrisque palpebris accidit, Phymosis hoc est Capiſtratio nuncupatur, cum diducere eas æger atque aperire ita oculum nequit. Idem morbus interdum in labijs oritur, & preputio & ano, cuius causa eadem est, 3. de ijs quæ in med. 32. vide Paraphimosis.

Phleborrhagia, idest venarum ruptio, 4. acut. 86.

Phlebotomia, idest sanguinis per venæ sectionem, missio 11. meth. 1.

Phlegma, humor est frigidus & humidus albi coloris, qui tum in senibus, tum ijs qui ratione quauis sunt perfrigerati plurimus acernatur, autumno abundans, quem Prodiens Blenam & mucum vocat, 2. de nat. fac. cap. 9. vide Pituita, Grauedo, & Coryza.

Phlegmatie significant, siue illas quæ propriæ phlegmonæ, idest inflammationes nominantur, siue etiam libeat febre una complecti, secundum antiquam vocabuli acceptionem, 1. apho. 7.

Plegmone, est abscessus, in quo sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partem, procumbens, maiora eius vasa distendit, ab his ad minora preceedit, à quibus exudat foras in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, ut etiam omnia quæ in composita carne habentur, loca occupet, 10. meth. 6. Solet etiam Hippoc. phlegmonas appellare omnes inflammationes, & si tumore præter naturam careant, sed ipso posteriores, nomen phlegmones tumoribus præter naturam attribunt, quando cum inflammatione & resistentia, & pulsatorio dolore consistant. com. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Consueuerunt aut. q. i.

in omni caliditate, nomen phlogosis, idest inflamminis, & Pblegmones hoc est inflammationis, uti, 2. Glauc. 1. & 4. acut. 21. & 13. meth. c. 1. φλεγμονή, καὶ φλογώσις Grace.

Plegmone erysipelatosā, est tumor prater naturam, a sanguine & bilioso humore subortus, sed sanguine in prædominio peccante, bile in subdominio; è contra Erysipelas phlegmonosum, in quo prædominatur bilis, sanguine in subdominio peccante, ita ut ab eo quod in mistura exuperat, nomen ipsi indatur, ac dicatur de eo, id quod exuperatur, sicut phlegmonem erysipelatosam, vel erysipelas pblegmonosum id vocemus; Vbi autem neutrum vincit, ibi vitium phlegmones, erysipelatosque medium nominetur, 14. meth. cap. 2. vide inflammationis.

Phlegmone oculi tumor est circa oculos, qui cum rubore & caliditate multa, & motu difficili, & punctiōibus gignitur, lib. finit. vide Inflammationis.

Phlogosis, idest inflamminis nomen sepe Hippoc. assert, pro phlegmone, hoc est, inflammationis vocabulo singula vi, 3. prognost. 71. vide Inflammationis, & Pblegmone.

Pblyctenam vocant, ubi per exulcerationē uel etiam sine hac exterior Ceratoidis tunica meubrana tenuissima, & sublimis elata, intra se humorem collegerit, aut sub tunicę spatio, crassior humor currens pblyctenam pariat. Introd. cap. 16. Inde ad pustulas per corpus erumpentes ob serosos humores ad cusem translatos, nomen transfertur, 2. progn. 70.

Pblyctides sunt pustulę quę in ardentissima febre per caloris intensiōem, in ore generantur, lib. finit. vide Febris pempbigode.

Phocatos, instrumenti genus est, quo in fracturis calvarie utimur, a lenticulę specie dictum, 6. meth. 6.

Phenigmus, rubrificatio, est ruboris per medicamen-

ta, in aliqua corporis parte excitatio ; quædam.n. medicamenta, eam vim habent, ut cuti admota, ruborem, caloremq; accendat, atque etiam si diutius immorentur, vesiculas excitent, tandemq; exulcerent, ab Arabibus vesicantia, & vesicatoria appellantur.

Phoxos, est depravata capitis figura: cū acuminato est vertice, & non ad oblongæ spheræ similitudinem qualem secundū naturam humanum caput habet, lib. de ossib. c. 1.

Phrenitim, mortales omnes eam affectionem appellant, in qua Phrenas, id est mentem lasam esse videant; 1. prorrh. 1. Est verò phrenitis mentis alienatio cum febre acuta, quando Cerebrum propria, primariaque affectione laborat, si verò Cerebrum per consensum afficiatur, dicitur Delirium, 5. loc. aff. 4. Est autem affectio, inflammatio in meningibus, & in ipsum etiam Cerebrum, aliquando pervadit, estque perpetuum cum acuta febre delirium, 1. prorrh. 1. quod si febrem adiunctam non habeat, tunc non phrenitis, sed vel delirium, vel mania, appellatur; si verò perpetuum non sit delirium, adhuc phrenitis dici non debet, sed vel paraphrosine, vel paraphrenitis, ut quæ tum à ventriculo, tum à diaphragmate, tum in summo febris vigore, excitatur, tunc enim declinante paroxysmo, cessat mentis alienatio, com. 3. in 3. de morb. vulg. 45. unde omnia signa, quæ eam, vel efficiunt, vel significant, dicuntur phrenitica, com. 1. in 1. prorrh. 4.

Phrenas, vide Diaphragma.

Phrenicę venę, sunt duę propagines venarum, è truncovenę cavæ superioris orientes, insertæ in diaphragma, ipsaq; totum nutriendes.

Phtharticum, vide Deleterium.

Phthiriasis, est scabies, circa palpebrarū radices, quæ squamas furfuri similes dimittit, lib. fini. Vocaturq; mor-

bus pedicularis, cuius generatio quibusdam contingit in capite acervatim, ex multis videlicet humoribus, calidis quidem, sed non ad totam caliditatem progressis, ad quam proveniunt acres Ichores, idest sanies, 1. loc. aff. 7.

Phthisicus Græcè *φθισικός* is dicitur, vel qui *phthisi* correptus est & contabuit, vel qui quavis ex causa macilentus evaserit; vel qui ad *phthisim*, natura proclivis est, angusto scilicet adstrictoq; existens thorace, luti à tergo, operta scoptula, instar alarum promineant (unde *πτερυγίσκος*, hoc est alatus nominatur) tandem cui caput imbecillum est, organaque respiratoria, facile omnem eius fluxionem recipiunt, com. 2. in 1. de morb. vulg. 13.

Phthisis, quæ *Tabes* Latinis, dicitur, si cōmuniter sumatur, est diminutio, & colliquatio corporis; *Tabes* verò, propriè est pulmonis ulceratio, vel thoracis, vel faucii, ut & tussicula & debiles comitentur febres, & corpus conficiatur, ea verò quam *Phthoen* proprio vocabulo appellant, est corporis consumptio ex ulcere, libr. finit. *φθίσις* Græcè, & *φθίσιν*; *Phthoen* etenim propriè Græci, & præsertim Athenienses nominant, ob pulmonis ulcere insanabilia, totius corporis cum parva febre extenuationem, eandemq; Hippoc. vocavit *Phthisim*, 7. apho. 16. atque ideo aliquando Galen. sanguinis sputum, vocat *Phthoen*, 5. meth. 15. eandem vocat *Tabem*, 1. aph. 12.

Phthisis oculi, vide *Tabes oculi*.

Phthoe, vide *Phthisis*.

Phthoria, i. medicamenta, quæ valent ad eijciendos faeces, viuos vel mortuos; alio nomine *Ecuolia* appellantur.

Phthoropæum, vide *Deleterium*.

Phygethon, inflammatio est adenum, quæ in inguinibus, & alis est, calore scilicet & celeritate generationis, ab alijs tuberculis distincta, lib. de tumoribus cap. 15.

Phy-

Phygethlon, est *erysipelas* inflammationis particeps, 2. *Glauc.* 1. figura illi *pano* similis est, quo textores utuntur, atque ideo *panus* & *panis* dicitur.

Phyma est *phlegmone* glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit, citra ulceris occasionem, accidens, 13. *metho.* cap. 5. quæ statim augetur, atque ad suppurationem venit, 2. ad *Glauc.* 1. vide *Tuberculum*. *Furunculus*.

Physema est *resinæ* species, quam & *pruinam*, & *piccam* nominant, expers pinguitudinis, admodum exsicicans, 7. de *comp. med. loc.* cap. 3.

Physiognomonica signa, sunt quæ rei naturam indicant, lib. quod animi mor. cap. 6.

Physiologia, idest naturalis scientia, 1. de elem. 5. qualis medicina censetur, quæ & *Physiologica* appellatur, nomine sumpto à materia, præ cognitioni medicæ exposita est, quæque materialis propriè appellatur, lib. de part. art. med. cap. 6.

Physis, apud *Hippocratem* nunc naturam, nunc temperamentum significat, 2. acut. 3 1. vocatur adhuc *Physis* flatus, flatuosus, siue balituosus spiritus, succis quibusdam pituitosis, vel cibis in ventre à deficiente calore, in balitum solutis; qui cum per os excernitur, ructum creat. cum per sedem, sonorum silentemve flatum; cum uerò neutra parte emittitur, symptoma creat, quod *Epneumatosis* hoc est inflatio uocatur, ventre scilicet impotente ad excrementosum, nebulosumque excernendum spiritum; sed is retentus propter magnam spiritus viæ, & intestinorum latitudinem, grauius sonat, murmur quoddam quod *Græci* *Borborygmon* uocant, causans, 3. de sympt. caus. c. 2. vide *Clydones*.

Pia & *dura mater*, vide *Membrana dura*.

Picatio auxilium medicum est, quo parte aliqua cor

poris pilos excidente, medicamento utimur, tum maxime cum quidam nouacula prasidium formident, praesertim in gutture, usque abrasis pharmacum aliquod applicamus, 1. de comp. med. loc. cap. 5. Aliqui verò picationem & picam significare inquit, symptoma deprauata, vitiosæq; appetentiæ cum stomachus vitiosus, & à natura alienos cibos concupiscit præter morem, quo malo mulieres grauidæ infestantur, ad extremum usque secundum uel tertium mensem, quarto namque ferè eo liberantur; quod malum & Citta, & Cittosa ab aue quæ Pica dicitur, denominatur, uide Cittosa.

Pica, uide Picatio, & Cittosa.

Picea, uide Physema.

Picra simpliciter, siue hiera picra, est idem ac medicamentum ex aloe, 4. loc. aff. 2 quod sui amaritudine, morbos & humores expellit, de Dynam. in proœmio; eadem & amara simpliciter appellatur, de cur. rat. per sang. c. 18.

Picrocholus homo, i. amara bile abundans, 2. acut. 29.

Pinguedo est affusio alimenti, circa membranas maxime concreescens sensu carens, lib. finit. uide Adeps.

Pinnae seu Pinnulae sunt alae narium lib. finit. uide Alae narium.

Pituiga est omnis frigidus & humidus natura humor, qui & phlegma dicitur, 8. de placit. c. 6. quatuorque humorum unus est, omnis qualitatis & saporis expers, non nunquam verò & dulcis particeps sit qualitatis, sed hunc humorem qualiscunque fuerit si modo albus existat, pituitam appellant, lib. de atra bile, cap. 2. Scindapson Galenus iocandi gratia, nunc pituitam, 8. de placit. cap. 6. nunc Cerebrum nominat, 8. de placit. cap. 4.

Pityina, uide Physema.

Pityriasis & pityra, uide Furfuratio.

Pity,

Pityroides urina, quæ habet hypostasim similem furfuri, i. furfuraceam hypostasim, lib. de urinis, cap. 28.

Pladarotes, sunt mollia veluti corpora venusta, & maximè decolora, palpebrarum parte interna, nondum aspredinem habentia, lib. Introd. cap. 15.

Plados omnis humiditas redundans superflua, et excrementitia, siue tenuis ea sit, siue in modum puris crassa, 3. de fract.

Plagula, quæ & splenia dicuntur à splenis forma, firmamenta sunt quæ stabiliunt deligationem; luxato enim fracto, vel comminuto osse fasciæ imponuntur, quæ confirmatum ac repositum os continent, prohibentq; ab affecta parte inflammationem, præsentem humorem repellendo, & aduenienti obsistendo, quæ fasciæ, & subfasciationes, & subligamina appellantur; supra hæc ne dimoucantur, ac diuertant, plagulæ imponuntur cerato aliquo intinctæ, quarum duplex est usus, unus ut subligamina contineant, alter ut ea membra circum expleant, quæ in acutū desinunt; Plagulis tertio aliæ fasciæ, quas superligamina nominant, conuoluuntur, quibus ferulæ superponuntur, quæ totam deligationem firment, ac stabiliant, 3. de ijs quæ in medic. 11.

Planities, vide pedion.

Planta, vide Pedion.

Planum, vide pedion.

Platysma, hoc est latius linteum, quod ulceribus extrinsecus superdatur, 4. de comp. med. per gen. 14. platysma autem myodes, est, dilatatio musculosa, siue latus ille musculus, qui cuti subnascens, buccam, sine maxilla, mouet, lib. de neruor. disse. cap. 6. vide Latus musculus.

Plectrum, vide pharynx, & Isthmus.

Plenitudo, vide Multitudinis.

Plenus

Plenus pulsus, qui arteriam ostendit pleniorē, & occursum humide tumidum, 1. de differ. puls. c. 6.

Plethora est ubi aequaliter inter se omnes succi sunt adaukti, id plethos, plethoran, & plethorian Græci vocant, nos plenitudinem, & succorum redundantiam dixerimus; ubi verò vel flauabile, vel nigra, vel pituita, uel serosis humoribus refertum iam corpus fuerit, cum habitum Cachymiam, quasi succorum vitium dicas, non plethoram vocant, 3. meth. cap. 6. & 13. meth. cap. 4. Vide Multitudinis.

Pleuritis, quæ & pleuresis dicitur & morbus lateralis, est inflammatio illius membranæ quæ costas intus subcingit, 6. aph. 33. quæ membrana mutuo à costis nomine, quæ Pleuræ dicuntur. & pleura ipsa dicitur vulgo. Exquisita verò Pleuritis fit, ubi cingens membrana costas, primario affectu laborat. proinde dolor, vel ad ingulum, vel ad præcordia peruenit; ad ingulum quidem superioribus eius partibus affectis, ad præcordia verò ubi inferiores afficiuntur, atque vehemens quoque febris hanc inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta, & parum distat à Corde, & cum panniculo ipsum inuolvente, ac septo transuerso cognitionem habet, 5. de loc. aff. 3. lib. de constit. art. cap. 15. Arabibus Sofati, Birsen, & Pleuresis, Græcis πλευρίτις appellatur. Non exquisita verò pleuritis est, in qua dolor externus est, & contactu mouetur, vel quod sine febre, uel sine sputo, uel sine tussi, vel sine spirandi difficultate sit, uel quod neque tensionem, neque duritiem ullam pulsus habet, quæ tamen singula exquisitam efficiunt pleuritidem. Pleuritidem verò incoctam appellant, quæ vel celeriter hominem ingulat, vel non nisi longo tempore finitur, 5. loc. aff. capit. 2.

Plexus choroides, vide Choroides plexus.

Plexus

Plexus retiformis, seu *reticularis*, est inuolucrum ex multis arterijs, sub dura meninge collocatum, ad retardandum spiritum animale, ne statim effluat; ubi enim natura uoluit diutius morari materias, ibi transitum ipsis difficilem molita est, quemadmodum in Ventrículo quidem Pylorus, in intestinis inuolucra, & ante testiculos arterię & uenę multipliciter inuoluuntur, non secus in capite sub dura meninge plexus arteriarum retiformis & reticularis, & Choroides dictus, 4. de usu par. cap. 13. & 9. de usu p. cap. 7. quem vulgo rete mirabile appellant, nide Glandulosi assistentes.

Plexus variciformis, vide *Flexus variciformis*.

Plixada, idest gressuram, totum id quod inter inguina utriusque cruris est, solet Hippocr. appellare, 4. de artic. 45.

Pneumatias, in *Pneumatodes*, vocat Hipp. anhelosos, qui densum spiritum habent, 3. de diffic. respir. cap. 12. Adhuc *pneumatodes* uocat Hipp. aliquando eos, qui uentrem inflatum habent. ibid.

Pneumaticus, idest spiritualis, qui omnia spiritibus attribuit, libr. Introd. cap. 9. vel qui de spiritibus agit, 3. de differ. puls. cap. 6.

Pneumomphalon, Umbilici est dilatatio, à flatuoso spiritu, libr. finit.

Enigalion, morbus Incubus. Latinis dictus, alio nomine. *Ephialtes*, nide *Ephialtes*.

Podagra est *Arthritis* pedum, ut enim *Arthritis*, vniuersi corporis & articulorum omnium, morbus est, ita si solum pedum sit, ab affecta parte, *podagra*, si manuum, *chiragra* nuncupatur, nide *Arthritis*.

Pollex, est breuior & maior digitus manus, quę *Antichira* & *promannum* uocant, lib. de ossib. c. 22. vide *Digiti*.

Poly-

Polychresta, medicamenta sunt, quæ multis affectibus conueniunt, quæ contrarijs medicamentis constant, etiam iuxta secundas qualitates ac vires, non tantum primas, 5. de comp. med. per gen. cap. 1.

Polychronius morbus, qui longo tempore comprehenditur, qui & Chronius dicitur, cui opponitur *Brachichronius*, qui breui tempore finitur, 3. diær. decr. cap. 13.

Polymorphum, vide *Sphenois os*.

Polypus, tumor est præter naturam, in naribus genitus, polypodis carni assimilis, iuxta substantiæ proprietatem, 3. de comp. med. loc. cap. 3. cuius quinque affert species Hipp. lib. περι παθήων.

Pompholix, bulla, est eleuatio in humore facta à flatuoso spiritu, quo intra humorem conclusa bulla excitari solet, præsertim si humor tenax, viscosusque est, tunc enim bulla permanet; nec facile soluitur, quales sæpe in urinis visuntur, renalem & longum morbum significantes. Est & *Pompholix metallicum* medicamentum.

Ponos, nunc laborem propriè dictum; nunc dolorem, seu ut quispiam dixerit malam affectionem, qua in acutis morbis, ægri male afficiuntur significat, 2. acut. 47.

Poples, siue *Ancyle*, est articulus ille quo os magni femoris articulatur ossi tibiæ, in quo pars exterior genu dicitur, interna vero qua crus flectitur, dicitur poples, vel *Ancyle*, lib. Introd. cap. 10.

Porocèle, est ramex callosus, siue tophus in testiculo, aut in membrana Erythroide concrescens, multus renitens, durus, & inæqualis. His notis ab hydrocele, & sarcocele, distinguitur, lib. finit.

Poromphalon, est concretio tophi in Umbilico, lib. finit.

Poropœia, est exiguum meatuum status, 4. meth. 4.

Porracea bilis, vide *Bilis pallida*.

Porrigo,

Porrigō, i furfuratio, vide Furfuratio.

Porta vena, vide Cava vena.

Portæ Hepatis, πύλαι ἡπατος, sunt pars sima hepatis, in qua sita est ea vena magna, quam vocant venam portam, vel venam portæ, qua est ingressus chyli iecur sicut in gibba sanguinis ex eo egressus.

Porta Ventriculi, est inferior ventriculi terminus, qui & pyloros dicitur, 3. loc. aff. 7. vide pyloros.

Portinarium est primum intestinorum, quod duodenum appellatur, lib. de anat. viii. vide Dodecadaetylon.

Porus est neruus mollis ex prima coniugatione neruorum oculum mouentium, à Cerebro ad oculos pertinet, qui solus manifestum habet foramen, unde & visificus, & meatus absolute dicitur, 4. loc. aff. 2. Porus est exiguus omnis corporeæ molis meatus, 1. sanit. tuen. cap. 12. Atqui & porus tophum significat, tum qui in Arthriticis, tum qui in calculosis generatur; cum enim humor erudus lentorem assumpsit, & transitus per renes quibusdam natura sunt angustii, id quod crassissimum est, & maxime lentum, diutius moratum tophum gignit, 1. de alim. fac. cap. 5. Porus adhuc & Callum significat, ad quem gignendum cogi, concreescereque aliquid proprii ossium alimenti oportet, quod in fracturis ossium accidit, 6. met. c. 5. vide Merum, & Oncos.

Post apparentia, vide Assidentia.

Post brachiale, vide Brachiale.

Posterius Cerebrum, vide Cerebellum.

Posthia, siue Crithe dicitur, cum parte interna palpebrarum, iuxta corollas, suppuratum, oblongum, figura hordeo simile sit, unde appellatum est, lib. Introd. c. 15.

Præcedentes causæ, vide Antegressa, & Febres putridæ.

Præ-

Præcognitio, πρὸγνωσις, prænotio est futuri euentus morbi, vel futuri symptomatis eorum quæ necessariam habent generationem solum, non autem omnium, quæ circa egrotos eueniunt: modo nihil aut ab ægro, aut ab affidentibus fuerit commissum, quo medici iudicium iure frustrari possit.

Præcordia, hoc est phrenas non ipse tantum, sed alij etiam veteres septum appellarunt, infra verò hæc præcordia tum venter, & intestina, tum iecur ipsum sitasunt, 8. de placit. cap. 9.

Prægmatis ossa duo sunt, capiti desuper incumbentia, parte posteriori, ab osse occipitis, anteriore verò frontis, utrinque ab ossibus temporum lincis fuerunt distincta, quæ & Bregmatis ossa appellantur, 12. de usu pa. cap. 20. vide Bregmata.

Præincipientes causæ, vide Antegressa.

Præputium, cutis est, quæ glandem pudendi vestit, 5. meth. 15. vide Glans.

Præsepiola, vide Phatbna.

Præternaturam, vide secundum naturam.

Prætextus, manifestissimas causas, & verissimas vocauit Hipp. cum tamen, in usu sit ut falsa causa prætextus appellentur, 2. de fract. 62. quin & prætextus aliquando non falsas causas, sed veras dicit, 3. de fract. 46.

Priapismus, (qui & Tentigo) est auctio pudendi flabilis in longitudinem, ac orbem tumefacti, citra rei venerea appetentiam, 9. de comp. med. loc. cap. 9. à flatuoso spiritu. 14. meth. 7. nulla stimulante ad libidinem, aut desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdam accidere consuevit, qui supini decumbunt, ducta denominatione a priapo animali; nam hunc ut cui suapte natura huiusmodi Coles esset, ita sinxerunt, atque pictura descripserunt homines, 6.

loc.

loc. aff. 6. quem & Satyriasm, & Satyriasum Græci vocant, quod Satyri arrigere semper crediti sint, de tumor. cap. 14.

Prima corpora, vide Homiomerēs.

Prima particula, vide Similare.

Primæ veng. (quæ & magna vasa appellatur, & vasorum radices. 5. meth. 3. (sunt, quæ sunt circa iecur, & mesenterium & Cor. 12. meth. c. 3. vide Radicem vasīs.

Primarius affectus, vide Idiopathia.

Primitiua causa, vide Antegressa.

Princeps intestinum, vide Rectum.

Principium morbi triplex dicitur, secundum unum quidem modum de primo insultu qui simplex est, & latitudine caret, secundum alterum verò, de eo quod ad tertium extenditur diem, & præter hæc etiam id quod tanquam pars accipitur totius morbi, in quod manifeste cōtione signa desiderantur. 1. de cris. cap. 8. & 19.

Proboscis, siue pronomæa est pars quadam pendens angusta, & longa in Elephante animali (quo loco alijs est nasus) adeò ut ad terram pertingat. 16. vsup. 14.

Procatartica causa, vide Antegressa.

Processus anchoralis, vide Ancyroides.

Processus cornicularis, vide Ancyroides.

Procidencia oculi, est cum ab iclu aliquo violento, aut strangulatione. cum febre continua, vel capitis dolore prolapsus oculus fuerit, lib. finit.

Procondyli dicuntur, primi digitorum articuli metacarpio proximi, ut mediij digitorum articuli condyli, extremi vero metacondyli.

Proegumena causa interna est, quam antecedentem solent nominare, quam Celsus vocat abditam, in occulto positam, & morbi continentem causam.

Pro-

Productio, vide *Dodecadactylon*.

Profundatio sudoris, vide *Chorion*.

Prognostica signa nuncupantur, quæ futura prænu-
 ciant, *Diagnostica*, quæ præsentia declarant, *Indicatoria*,
 quæ curationem indicant, lib. de Optim. sec. emp. cap. 6.

Prolapsiones, idest ossium integras alternationes, *Di-*
motiones non integras appellat, Hippoc. 3. de fract. § 1. &
 2. de fract. 36.

Prolepticus morbus, vide *anticipans* & *Cicumenus*.

Promanus, vide *Digitus*, & *pollex*.

Pronervationes, vide *Tendones*, & *Aponcurosis*.

Pronomus, vide *proboscis*.

Prophasis, vide *Antegressa*.

Prophylace, ea est artis medicæ pars, quæ morbi cau-
 sam adimit, *Prophylactice* verò, quæ à morbo præservat,
 11. meth. cap. 2.

Proprius affectus, vide *Idiopathia*.

Proptosis, idest procidentia appellatur, ubi cum in-
 flammatione moti oculi, sede sua procidunt, lib. Intr. c. 15.

Prostactesis hoc est appensio, longiorum est membra-
 narum, ad vicina loca applicatio, lib. finit.

Prostheromena, idest sumenda vocantur, quæ intro in
 corpus sumuntur, ut quæ eduntur, ac bibuntur, & inspi-
 ratæ aer, 10. meth. 7.

Prosthyxis, vide *Prosthesis*.

Prosthesis prior est virtutis nutritivæ facultas, quæ nu-
 trimentum membro, quod nutriri debet, apponit, unde ap-
 positio dicitur, quam subsequitur *Prosthyxis*, idest ag-
 glutinatio, siue unio, quæ nutrimentum appositum aggluti-
 nat, & unit membro, Tertia his annectitur, quæ unitum nu-
 trimentum assimilât membro quod nutritur, diciturque Nu-
 tritio, 3. de natur. facult. cap. primo. & 13.

Pro-

Prostethis, est pars carnosæ, quæ in manuum, & pedum caua parte attollitur.

Prosthopathia, vide *Idiopathia*.

Prurigo, pruritus quidam est, cum exigua quadam molestia, qualis puerorum qui iam dentire incipiunt gingivis accidit, 3. aph. 35.

Pfallide, vide *Fornices*.

Pfallioides, siue *Pfalloides*, vide *Camarion*.

Psamismus, curationis genus est, quo *Hydropici* arena calida, testæ capite, ad aquam ab uniuerso corpore, ciendam, & eiiciendam, sepeliebantur, & soli ardenti exponebantur.

Philothra medicamenta sunt, quæ pilos & capillos auferunt, uel duos, magnos multos, ciassos, & ueluti suillos pilos attenuando, & minores reddendo, uel ipsos penitus extirpando, & partes corporis depiles reddendo, 1. de comp. med. loc. ca. 4 differunt à *Dropace*, quod sint viribus *Dropace* valentiora, vide *Dropax*.

Psoa, quasi pulpam, idest lumborum carnem dixeris, est magnus musculus, ab undecima thoracis costâ incipiens, per uniuersa ilia & pubem progrediens. lib. de muscul. diss. cap. 31.

Psoa, scabies est, cum asperitate summæ cutis cum pruritu, furfuribus, & corporis colliquatione, lib. Introd. cap. 13. quæ omnia & si illi cum lepra communia sint, differunt tamen, quod in *psoa* summæ cutis occupatur, in lepra malum aliud descendit, adhuc in *psoa*, furfuracea fit cutis, in lepra squamosa; adhuc *psoa* variè figurata est, lepra verò circularib. magis erosionibus cutem depascitur. Quam *psoam* *Auic.* distinxit in excorticatam & non excorticatam, scædam & non scædam, humidam, & siccam; quod forte aliud sit Græcis *Psoa*, ac Arabibus.

Psoriasis hoc est scabies, & duritia scroti, cum intensa prurigine; quandoque verò & ulceratione, lib. finit.

Psorica medicamenta sunt, quæ scabras in palpebris affectiones sanant, 2. de comp. med. loc. cap. 3.

Psorophthalmia, idest pruriginosa scabies à sole, & pulvere orta, lib. de remed. par. fac. cap. 10.

Psychrophobus, homo est qui frigida aqua exhibenda est timidus, sicut & *hæmophobus* est, sanguinis mittendi timidus, & *hydrophobus*, qui à rabido cane morsus, aquam reformidat, 9. meth. 5.

Psychica medicamēta sunt, refrigeratoria, quæ omnem calorem, & lassitudinem mitigant, lib. de Dynam. in procem.

Psydracia sunt parvæ efflorescentiæ factæ in capite similes vesicis eminentibus in superficie; lib. de med. fac. par. cap. 5. Differunt à *Phlyctenis*, quæ toto corpore non tantum capite, ut *Psydracia*, oriuntur, & si autor *Introductorij* forte aliter sentire videatur; tum quod *Phlyctenæ* à calidiori, acriorique, hæc à minus calido humore, & acri gignantur.

Pterna, calx, os pedis omnium maximum est, parte qua ingredimur leniter rotundum, & latiusculum, posteriore tibiæ rectitudinem longe excedans, inferiore astragalo, anteriore osse scaphoidi inarticulatum.

Pterygoidea, quæ & *alaria* ossa dicuntur, vide *Sphenoidis* os.

Pterygiū dicitur, nervosa superinnata oculi membrana eminentia incipiens ab angulis, & procedens usque ad corneam; quando verò insuper augetur cooperit & pupillam, lib. de med. fac. par. c. 12. *Pterygia* etiam vocant *alarnarium*, i. fines eius infernos qui moventur, 11. de usu p. cap. 12. eadē *Vngula* appellatur & *Unguis*, differens ab *Entsan* hinc quæ est carnis in maiore angulo excrescentia, *Pterygium*

rygium verò neruosa caruncula est, 10. de usu p. cap. 11.

Ptilos, glabrias, simulque nascentes alias palpebras, quique pilos non habent, Græci vocant, 4. de comp. med. loc. capit. 8.

Ptilosis est casus pilorum palpebræ, lib. de medic. fac. par. cap. 12.

Ptisana, nunc pro succo hordei percolato, nunc pro infuso ex hordeacea etiam substantia sumitur, 9. de plac. c. 6. Ptilosis oculi unum est, quod alio nomine φαλάγγιας appellatur, uide Phalangosia.

Ptyelos, uide Cheana.

Pubes, pubertas, tempus est ætatis, quo lanugo circa pudenda oriri incipit, quod initio anni decimi quarti incipit, ad vigesimum quintum terminatur, 5. apho. 7. Est & Pubes, idem quod pecten, postrema pars hypogastri; siue Aqualiculi, qua pili nascuntur, uide Aqualiculas. Cuius pubis, seu pectinis ossa, apophyses sunt ossis sacri tenues perforata, & in anteriora protensa.

Publice grassantes, uide Communis, & Endemus.

Puerilis morbus, uide Comitialis.

Pulmo, caro quædam rara tenera, & spongiosa est, in quibus cauis aer attractus modice retinetur, & rectificatur à suis prauis qualitatibus, libr. de anat. viii. Vnde respirationis & vocis instrumentum est, 7. de usu p. 1. estque viscus quemadmodum hepar; vasis quam plurimis contestum, quorum intervalla carne molli, instar Stoeber cuiusdam opplentur, quo omne id quod inter vasa omnia est inane repletur, essetque firmamentum ac propugnaculum imbecillitatis ipsorum, ibid. cap. 2. & 8. uide μωυ Græcè, & spongiosus, quod follis instar aere impleti distendique citra noxam possit, substantia spumam sanguinis referens.

Pulmonia, uide *peripneumonia*.

Pulsatiuus dolor, uide *Dolor pulsatiuus*.

Pulsus est, sensibilis Cordis, & arteriarum motus dilatatione, & contractione factus, 1. de differ. puls. cap. 2. & 4. de differ. puls. cap. 3. Hoc nomen pulsus ueteres primum adhibuerunt designandis motibus dolorificis pulsantibus ex inflammatione, & palpitantibus, concitato, uehementique motu arteriarum; Deinde medici ea uoce usurparunt in significando motu secundum naturam in Corde, & arterijs facto per systolem, & diastolem, cuius naturam Hippo. uel non callebat, uel ut fallacem neglexit; in quo si medici tactus sua diastole eueritur, aut uolenter impellitur, & cum renixu quodam pulsat, uehemens pulsus, σφοδρὸς σπυγμὸς dicitur, cui oppositus, ἀμυδρὸς, languidus dicitur.

Puluis pinguis, est in quo nec asperum quippiam, nec acre subest, 5. sanit. tuen. cap. 3.

Punctio, solutio continuitatis in carne est, ab aliquo acuto incidente, & tenui facta; Græce *πύξις*, & *πύγμα* dicitur. Est adhuc punctio quæ & compunctio appellatur, incisionis ratio, quæ hydropicis ad ciendam aquam debetur, quæ *παρακέντησις* Græce dicitur (de qua consule aulum) Arabibus *punctura*.

Punctorius dolori, uide *dolor tristis*.

Pupilla, Græce *κόρη*, foramen medium Vuae tunice oculi est, in quo fit uisio, libr. de anat. uin. Estque media totius Iridis pars, lib. Introd. cap. 10.

Purgatio, euacuatio est per propria loca, deriuatio per propinquiora, Reuulsio per contraria, 4. meth. 6. & 5. meth. 3. Vacuationem appello proprie materiae ubi quantitate exuperet, purgationem uero alienæ per qualitatem, secundo, progn. 14. 1. aphor. 2. uide euacuatio, pharmacia.

Pur-

Purgamenta, Ἀρχαία Grace, dicuntur ea omnia, quæ à puerpera, post fœtum, & secundas exeunt per vterum, quæ & Catamenia appellantur, soloque hoc differunt, quod hæc ante partum sint, illa post partum.

Purgatorium facultatem non omnes intelligant, quod duo significat, alterum commune omnium, quæ quouis modo animalis excrementa expurgant, alterum uerò per Excellentiam de ijs tantum dicitur, quæ aut per uomitum, aut per uentris deiectionem purgent, 5. de simpl. med. c. 20. uide Catbar

Purpurea uena, uide Communis, & Media. (tica.

Purulentiam, Suppurationemque appellat Hippoc. ubi pus uniuersum constitit, concocto tumore quopiam præter naturam, 1. progn. 40.

Purulētus & suppuratus, uide Empyus, & Empyus.

Pus, πύον, est humor putris, partium spermaticarum substantiæ magna ex parte assimilis; Estque humor, quod in humoris modum fluat, atque ex humore habet originem, qui in partem inflammatione laborantem decumbens, & per inania eius spatia diffusus, occlusis undique meatibus, perspiratione intercepta computrescit, perinde atque alia omnia, quæ perspiratu carentia, alieno in loco uebementius incalescunt.

Pustula Græcis Hydatides, hoc est exanthemata, 4. sanit. tūen. cap. 4. sunt & pustulæ abscessus in nigro oculi humorem continentes cum phlegmone & fluxu, lib. finit. uide Exanthematum.

Pustulæ latæ, siue tubercula omnia, duplicem habent differentiam, quoniam quædam tendunt in acumen, & altum petunt, quædam ad maiorem extenduntur locum, non tamen in altum attolluntur, sic & pustulæ nonnullæ sublimes nonnullæ latæ fiunt. 6. apho. 6. latæ quædam tamen ob humoris frigiditatem, lentorem, & crassitudinem, tum

propter continentis membrana densitatem; sublimes vero tum propter humoris caliditatem, & rursus raritatem, tum propter uirtutis robur, foris expellentis pus, unde Coni similitudinem referunt, & in mucronem fatigiantur, 1. progn. 40.

Putredo est mutatio totius putrescentis corporis substantię ad corruptelam, à calido externo, 1. 1. meth. 8. ceterum non quicquid corrumpitur, *σύνεδαί*, hoc est potrescere dicimus, sed quibus id cum foetore accidit, 5. simpl. 15. dicitur autem putredo, siue putrefactio Græcè *Σήψις*, quem duplicem Galenus facit, 1. de diff. febr. unam quę sit superante natura, alteram quę sit superata, Galenum, eo loco consule (cia.

Pycnotica, & Pycnosis, uide condensantia, & Obstruē

Pyelus Græci uocant paruos alueos in quibus natationes instituuntur, 7. meth. 6.

Pylorus posterior est, & inferior uentriculi terminus sic dictus, quoniam portæ modo, ne nutrimentum ex eo confestim dilabatur, prohibet, libr. Introd. cap. 11. qui & Pyloron dicitur ad dextram propè iecur situm habens, libr. de ven. & art. dissect. cap. 1. qui & Ianitor dicitur, uide Porta Ventriculi.

Pylus, uide Myrmecig, Clauus, Callus.

Pyosis, uide Onyx.

Pyricauton, id est ambustum igne, simul & is affectus eodem nomine appellatur, quo quis in aqua feruenti uisus fluerit, 1. de comp. med. per gen. cap. 4.

Pytiroides, uide Hypostasis.

Pyriama, fofus, fomentum est, non uno modo corpori admotum sed uel per suffitum, uel calidam spongiam humido aliquo decocto imbutam, uel uaporem per arundinem, uel cucurbitulas.

Pyri-

Pyrinoides, vide Dentem.

Pyulcon organam, siue instrumentum est, quo malsa per ulcus infusa, iubemus aliquando quidem, ut acri inclinati in laborantem partem tussiant, aliquando etiam molliter concutiendo, sicque pars vniversum, saniemque ulceris extrahimus, 5. metho. c. 8. à quo & Pyulca, i puris attractiua medicamenta denominantur, 2. ad Glau. 8.

Q

QVADRATVM corpus, quod & Eusarcon vocant, est quod nec gracile, nec crassum, nec calidum, aut frigidum, aut alio quouis nomine ex ijs quæ excessum defectum ne indicant dicere possis, 1. de temp. cap. 9. sed inter hac omnia extrema medium constituitur, 3. de caus. puls. cap. 1. 1.

Quartana febris, τεταρτάη & πυρετός, est, cuius circuitus est quarto quoque die, quo unam & eandem accessionem facit, ac unam, & eandem remissionem, lib. de Typis, cap. 4.

Quassatio est quartus luxationis vertebrarum modus; tria enim uitia ex uertebrae exturbatione contingunt, cum retro abeunt gibberositas, cum intro repanditas, cum in latus torquentur obstipitas, præter hæc quartum vertebrarum uitium accedit, cum dimota quidem iuncturae ac compagesunt; sed vertebrae tamen in sua sede permanent, quassationem hanc appellanti, 3. de artic. 2. Dicitur & quassatio casus inaequalis pilorum non dissimilis ijs, quæ abscidit bipennis, lib. finit.

Quotidiana febris, vide Cathemerina.

Quotidianarum febrium typus est, qui quotidie unam, & eandem accessionem, & eam quidem longitudine commensuratam, & unam eandemque remissionem habet, ut Tertianus circuitus est, qui tertio quoque die,

S 4 unam

unam & eandem accessionem longitudine commensuratum, & unam & eandem remissionem facit, libr. de Typis, cap. 4.

R

RADENS bilis, vide Ator succus, & Acidabilis.
Radius, vide Cubitus.

Radicem uasis, seu uenæ uocant priorem eius partem, quæ vel iocinori propior est, uel etiam Cordi hæc in colle ab inferiore est parte, in brachijs & cruribus à superiore, 5. meth. cap. 3.

Ramenta sunt membranarum intestinorū rasuræ, aliquando etiam cruentosæ, 1. loc. aff. 4. vide Strigmenta.

Ramex, Hernia, Græcè Cele, est omnis in Scroto tumor siue ex delapsu intestini, siue Omenti, siue Vasorum spermaticorum, varicis, tophi, siue lenti humoris, siue aquosæ substantiæ, libr. finit. Fit autem & aliquando Ramex in inguine, quoties quidam validus Tendo (qui & membraneus dicitur, qui ante inguina ortum habet, & pubis ossi inseritur) laxescit, eiusque robur infirmius fit, & cū eo totus hic inguinum locus, laxior redditus, partes quasdam corporis subiacentium in se recipit, ueluti intestinorum, uel omenti, 4. de anat. adm. cap. 6. vide Celas.

Ranula, tumor est phlegmonodes sub lingua consistens potissimum in pueris, quem Græci βάτοαχον uocant.

Rarefacientia medicamenta, quæ Aræotica Græci uocant, sunt quæ cutis meatus referant, 5. simpl. c. 14. uide Anastomotica.

Rarum corpus est, cuius partes multis spatijs inanibus interceptæ sunt, aere plene, è contra corpus densum, seu spissum, 1. simplic. 13. siue rarum corpus est, quod meatus quos Græci poros uocant magnos habet, 2. de sanit. tuen. cap. 5.

Rarus

Rarus pulsus, uide Creber pulsus.

Rascetta, uide Brachiale.

Rationalis medicorum secta est, quæ natura rationem præbet, morborum causas inquiri, & signis ad illarum inuentionem utitur, curationem capiens à contrario, prout causæ exigunt. in Introd. cap. 3.

Rancedines, uide Branchos.

Recidua febris est, quam prauorum humorum reliquię putrescentes accendunt, cum omnis humor alienus à natura corporis in quo continetur, aptus non sit ad eius nutritionem, & deinceps necessario ad putredinem conuertatur, 2. aphor. 12.

Reciprocus pulsus, uide Deficiens, & Recurrens.

Reciprocus decurtatus, uide Deficiens decurtatus.

Recrementum, uide Callosum corpus.

Recrudescentia, ulcera maligna uocat, & recrudescere, quasi rursus crudum fieri, atque in pristinam malignitatem quippiam redire, ac rebellare, 2. de fract. 28.

Recta futura Caluaria, uide Obelœa.

Rectum intestinum est ultimum intestinorũ omnium, quod ad sedem usque porrectum est, 6. de anat. adm. cap. 9. quod & princeps intestinum uocatur; laxaque eius pars inferior, qua maxime laxatur, ad cuius finem est Sphincter, idest constrictorius musculus, ad cuius distinctionem reliquam recti partem, qua maxime dilatatur laxam appellamus, lib. de uulua dissec. cap. 1. quod & extensum, & longum dicitur lib. de anat. uiu.

Recurrentes nerui, uide Nerui recurrentes.

Recurrere est, qui ad quantum excurrit magnitudinis aut uehementię, in alijs rursus ad tantundem reuertitur, lib. finit.

Reduua, uide Paronychia.

Re-

Refrictio, vide Anatrypsis.

Regius morbus est, qui amaram bilem in toto corpore redundantem comitatur, erisypelata & ulcera serpentia, cum eadem amara bilis unam quampiam particulam obsidet; nigram verò in toto quidem corpore, elephantia, in una quapiam particula, Cancer subsequitur. Pituitoso excremento in toto quidem corpore, succedit hydrops leucophlegmatias dictus, cum in una insedit particula tumor qui edematofus dicitur, 3. de sympt. caus. cap. 2. vide Arquatus, & Icteros.

Relaxantia quædam medicamenta vocantur, Græcè chalastica, familiari omnibus propè recentiorib. medicis vocabulo, inde nimirum sicut & nomen ipsum indicat, quod tensas laxant particulas, quippe relaxari ac intendi, contraria inter se dicunt, 7. de compos. med. per gen. cap. 9. vide Chalaſt. c. 1.

Remissionem febris vocat secundam totius circuitus paroxysmi partem, in duo uniuersa diuisi, accessionem & remissionem, lib. de totius morbi temp. c. 8. vide Ablatio.

Remissus pulsus, vide Vehemens.

Renes, νεφροί, peculiare quoddam corpus sunt, densum, ex carne & fibris constitutum, carneaq; substantia, non paucas habens inuolutiones, figura autem Græce literæ C, & in medio cavitatem quandam, qua ex venis & arterijs serosum excrementum excipiunt, ad quos non maiores solum venæ, quarum aliæ in cavitatem hanc inferuntur, alię in membranam quę eos tegit, sed meatus etiam capillis modò exiles deferuntur, ad renes siti, paulò altius quàm ilia, à quibus duo urinarij meatus emergunt, quibus ad vesicam urina reducitur, quorum operatio est secernere, & percolare serosum excrementum à sanguine, lib. de ren. aff. dign. cap. 1.

Re-

Repanditas, vide Obstipitas. Quassatio, Chyphosis.

Repercutientia, vide Attrahens.

Respiratio, & Respiratus, vide Inspiratio, & Transpiratio.

Resolutio nervorum, est deperditio motus in aliqua corporis parte, non autem sensus; si enim deperditur sensus dicitur sensus resolutio. 3. loc. aff. 10. licet eiusdem capitis initio dicat, ubi omnes pariter nervi tum sensum, tum motum amiserint, apoplexia hæc affectio appellatur; ubi verò alteri laterum, aut dextro, aut sinistro id accidat, resolutio eius scilicet partis, in qua consistit affectio, interdum dextræ, interdum sinistræ, quod si in aliquo membrorum idem euenerit, eiusdem membri resolutio, Græcè paralysis esse dicitur, 3. loc. aff. 10.

Resolutus oculus dicitur, ubi naturali motu destitutus, neque sursum, neque deorsum intendi potest, verum sensus expers sit, frequenter id mali, partibus etiam oculi accidit, lib. Introd. cap. 15.

Restitutio, est ossis vel membri in propriam sedem collocatio, & repositio. 3. de fract. 38.

Rete, vide Omentum.

Retentrix facultas, vide Attrahrix.

Retiforme corpus; est quasi tunica, humorem vitreum oculi ambiens, quod ex Cerebri portione superne descendente atq; amplificata conflatum est, reti simile, quod à Choroidæ, i. tenui Cerebri tunica, quæ illi supernè dimittitur, continetur, unde tunica oculi choroidæ, id est secundina nominatur, 10. de usu p. cap. 2. vide Choroides.

Retiformis plexus, vide Flexus variciformis, & Amphiblestroide.

Retina est panniculus vitreum humorem oculi circun-

cundans quasi rete, cui annectitur alius qui dicitur secunda, quod secunda sit similis, iuxta quem tertius est qui ossa contingit durus & solidus, unde scliros dicitur, lib. de ocul. cap. 2.

Reuersiua febris nominatur, quæ non est acuta, sed diuturna, & imperfectas habet solutiones. com. 2. in 6. de morb. vulg. 21.

Reuulsio est, euacuatio alienæ materiæ per loca contraria, vide Purgatio, & Deriuatio. Est autem reuulsio facienda deorsum quidem ubi succi ad superiora feruntur, sursum ubi ad inferiora vergunt, & ubi introrsum ad exteriora, ubi extrorsum ad interiora, ubi dextrorsum inclinant in sinistrum, si sinistrorsum ad dextram reuulsio facienda; sic sanè fluxiones quæ retro inclinant in priora reuellendæ, quæ in priora in posteriorem regionem abducendæ sunt, lib. de hyrudin. cap. 2. lib. de Deriuat. c. 19. quæ Græci Antispasin vocant, vide Antispasis, Deriuatio, Purgatio.

Rhabdoides futura, eadem est ac recta capitis futura, vide Obelæus.

Rhachitæ, qui & Rhuchiæ sunt dorsales musculi, 4. de anat. adm. c. 6. 7. aph. 36. Rhachitis medulla; i. spinalis medulla, unde Rhachis spina est, vide Dorsum, Medulla.

Rhacodes, i. lacerosa, vniuersa est cutis à pure circa abscessum aggregato sufficienter extenuata, instar lacoræ vestis, idque accidit, ubi qui ad abscessum perueniunt tumores tardi secti fuerint, aut ob medicantium imperitiam, aut eorum quibus medela adhibetur timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant ut longiori tempore cutis à pure rodatur, 2. Glauc. 8.

Rhacosis, i. detritio, multa scroti extensio est, lib. finit.

Rha-

Rhagas, idest scissura, fissurae, diuisio est labia obtinens callo obdurata, libr. finit.

Rhagades, sunt rugae ani intumescences, rimaeque ac fissurae sedis, 1. de comp. med. loc. cap. 8. quae & rimae sedis dicuntur, non aliter, quam labra, quandoque & manus ex vehementi frigore, Plinius fissa appellat.

Rhages dicuntur extremi digitorum fines, qui & κορυφαὶ vocantur.

Rhegois tunica, quae caerulea, vne & uniformis dicitur, est oculi panniculus, albugineum humorem tangens, & circumdans, nigri coloris, unde vnea tunica à colore dicitur, post quem est alius panniculus cornu similis. Vnde Cera toides, i. Corneus appellatur, iuxta quem est tertius non circumdans alios, sed eos intra se iungens, quem coniunctiuam vocant, & Adnatam, siue Agnatam; Inter crystallinum & albugineum est tela aranea, lib. de ocul. cap. 2. & Introd. cap. 11. & 10. vsup. c. 4.

Rhaphe, idest sutura, commissura, syntaxis serrata, vide Commissura.

Rhegma, i. ruptum, est ossis ad os traductio à profundo ad superiorem, libr. finit. vel Rhegma est solutio continuitatis in vasis, ut Fractura in osse; Conuulsio, seu spasma in neruo, Apospasma in ligamentis, Thlasma in musculis, ita Rhegma in nasibus ex violento ictu, vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitata, 4. meth. c. 1.

Rhetidosis, idest oculi tabes, & corrugatio, 3. meth. 2. vide Tabes oculi.

Rheuma, idest fluxio, & humorum decubitus, 1. de comp. med. per gen. 4. vide Fluxio.

Rheumaticus vocatus affectus, ea ratione prouenit, qua toto videlicet corpore infirmo, quae una est mali habitus species, principibus verò illius partibus, paulum
licet

licet ipsis insit sanguinis grauari tamen solitis, eumque ad carnosas cutis partes protrudentibus, potissimumque ad adenae excipiendis recrementis idoneos, tum ob substantia laxitatem, tum quia omnium partium minimè robustas habent naturales virtutes, sicut & pinguedo; partes enim infirmiores omnium primæ, excrementitijs morbis corripiuntur. lib. de cur. rat. per sang. capit. 8. fluentibus verò humoribus Rheuma, seu fluxio dicitur, cum verò in aliqua parte confluxerint, is affectus qui inde generatur, Rheumaticus appellatur, 2. Glaucon. capit. secundo.

Rhexis, idest ruptio, est ulceratio ab ætu. vel alia quapiam causa, in alio totas subinde membranas diuidens, vel etiam humores, quibus videndi facultas administratur, effundat, lib. Introd. cap. 15.

Rhodinum, vide Oxyrhodinum.

Rhodomeli, idest, mel rosaceum, quod aliquando simplex, interdum purgatorium paratur.

Rhœas siue Rhyas, vide Encanthis.

Rhogme est orbis interruptio, per superficiem recta vel angusta, vellata, lib. finit.

Rhopalosis concretio est summorum pilorum indiuisibilis, qui etiam amplius non crescunt, lib. finit.

Rhus, profluvium fœminarum proprie apud medicos significat, fluente sanguine assidue penè & inordinate per uterum; longeq; diuersa fluxio est ab ea, qua fluit sanguis per uterum mensstruis periodis, cum illa præter naturam sit, hæc verò secundum naturam; Morbi nomen est ποῦς ῥυαῖς, fluxus muliebris.

Rhyas, est oculorum vitium, quando meatus qui ab oculis in palatum desinit, vel obstructus, vel conuincens, excrementa, non ad loca consueta transmittit, sed in oculos regurgitare facit, com. 2. in 6. de morb. vulg. 32. vide

Rhœas,

Rhæas, & Encanthis.

Rhypodea medicamenta sunt Græcè appellata, quæ à sordium similitudine, quasi strigmentosa nominantur, 2. de comp. med. per gen. cap. 1.

Rhyptica siue extergentia ea medicamenta nominantur, quæ in superficie, siue in cute, siue in ulcerib. sordem auferunt; quæ uerò altius poros expurgant, ea Ecphrastica, & Eccathartica, quasi expurgantia, & farctu liberantia dicas, appellantur, 5. simplic. 12.

Rhythmus in pulsu est proportio temporis ictus, ad tempus quietis, 1. de differ. pulsi. cap. 7.

Rigor *πῖρ*, est insiti caloris perfrictio, cum sensu doloris subita & uniuersim facta, lib. de tremor. conuul. c. 6. Nominaturq; etià Rigor, neruorū conuulsio, & Tetanos, 3. loc. aff. 10. Estq; concussio & commotio inæqualis totius corporis à tenui & acri, copiosiorique humore quàm qui in horrore peccet, 3. sanit. tuen. 5. qui & Rigor & Rigos dicitur, 1. de sympt. caus. cap. 8. vide Frigus.

Rigos, vide Rigor.

Rigor sine febre nonnullis quidem accidit semel, nonnullis autē per uices interpollens multorum spacio dierū, vel à principio vsque ad finem continuatur, aut uidelicet est ita omnino exiguus, ut neque adesse videatur, cum se quieti tradiderint sed cum moueri cœperint, tunc demum eum sentiunt, ut totam vim habet, ut sit etiam sine motu molestus, quod accidit pituita humore redundante, sed non putrescente, quando autem hoc tempore humor putruerit, non modo rigent, sed etiam febricitant agri, 2. de differ. febr. cap. 5.

Rob, vide Succum medicatum.

Ros, tertia est humiditatis species unde partes nostri corporis nutriuntur, quæ continetur in omnibus animalis parti-

partibus, ceu ros quidam per eas sparsus, quam inferere particulis, sine nutrimento non est, 7. meth. 6.

Rotula, uide Patella.

Rubra bilis, uide Bilis Pallida.

Ructus est flatus excretio per gulam, cum & alius sit qui per intestinum rectum secernatur, comm. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Ruptura, uide Unionis solutio.

S

SACCVS, uide Cæcum Intestinum.

Sacer morbus, i. ἐπὶ νόσος, i. Epilepsia, quo eius magnitudo designetur, sacrum. n. apud antiquos, significat magnitudinē; alij uerò sacrū dici putant, quod diuinus esset, & à dijs in vindictam mitteretur, quos Gal. reprehendit.

Sacer ignis, i. Erysipelas, lib. de purg. med. fac. licet Celsus, ignem sacrum prauum vlcus existimet dici.

Sacrum os, uide Dorsum.

Sagittalis sutura, uide Oblea.

Salsa pituita est, quæ alieno calore computruit, 2. de natu. fac. cap. 9. quæ salsa redditur, aut propter putredinem, aut propter salsa serosæ humiditatis admistionem, 2. de diff. 7. febr. cap. 9.

Saltus, qui & Palpitatio, & Palmos dicitur, secundo meth. 2. uide Palpitatio.

Saluatella vena est ramus venæ axillaris, media percurrentes inter medium digitum manus, & auricularem, 3. de anat. adm. cap. 5. & lib. de anat. vii.

Salubre corpus simpliciter est, quod ab ipso nature ortu, bonam habet temperaturam, in simplicibus & primis particulis, atque in ijs quæ ex illis componuntur instrumentis, est commensuratum, lib. Artis med. cap. 4. ex aduerso Insalubre simpliciter, ibidem.

Sanguis

Sanguificatio, quæ & *Hæmatosis* nominatur, est mutatio alimenti in sanguinem, lib. finit. vide *Attrahrix*, & *Hepar*.

Sanguifluas uenas eas appellat *Hippo.* quæ magnæ sunt, quibus ruptis, sanguinis eruptiones cōtingunt, id quod ex paruis euenire non consuevit, nam & paucus ex huiusmodi sanguis effunditur, & cito, ad oras ipsas diuisas coalescit, nocumentumque non affert, 2. de fract. 24.

Sanguinarium medicamentū, quod & *glutinatorium*, cruentis opitulans, *Græcè* autem *Enamon* dicitur, est quod vulneris oras committere, seu glutinare molitur, 3. de cons. med. per gen. cap. 2. vide *Glutinatorium*.

Sanguineus Cordis Ventrículus dexter ipsius est, qui priori orificio sanguis in Cor intromittitur, posteriori autem ex ipso in pulmonem deducitur, ut alius est Cordis ventriculus sinister quidem, quem spirituosum nominant; quo priori quidem orificio, ijs quæ in pulmone sunt arterijs, posteriori omnibus quæ toti animali sunt diffusæ, Cor est continuum, 6. de vsu par. 7.

Sanguis nunc sumitur pro omni in vasculis incluso succo, in quo pituita, utraque bilis, & tenues serosique liquores continentur, nunc pro quarta substantia, ut è directo reliquis humoribus opponitur, qui propriè sanguis dicitur, & è cuius exuberantia tota colectio nominatur, comment. 4. in 6. de morb. vulg. 26. & comment. 2. in 6. de morb. vulg. 38. & lib. de mult. c. 10.

Sanies, vide *Sordes*.

Sanitas partium similarium, est calidi, frigidi, humidi, & sicci symmetria, dissimilarium uerò compositio, numerus, magnitudo, figura conueniens, 1. de sanit. tnen. c. 1. & 4. & com. 2. in 1. de morb. uulg. 3.

Sapa, quam alij *Siræon* uocant, est mustum plurimum

T

coctum.

coctum, sunt qui & ficum siccarum decoctum ita nominant, lib. de attenuante diata, cap. 12. vide *Apothermus*.

Saphatum apud *Auicennam*, & *Plinium* manantia capitis ulcera, una uoce nominant, qua Graci ἀχώρας & Κύρια, *Aliabbas* tineam, sub quo & ficus, & ὑδράρια, & ἐξαρθράρια collocant.

Sapor, vide *Chymus*.

Saphena uena est, qua desuper ad partem cruris domesticam descendit, qua descendendo occultatur, donec partem super malleolum interiorem operire incipiat, lib. de anat. viii. vide *Malleoli uena*.

Sarcocoele est morbus testiculis induratis conueniens, quod si aquosus humor in tunicis qua circa testiculos sunt aggregetur, *Hydrocele*, *Epiploele*, & *Enterocoele* dicitur, lib. de tumor. cap. 15. *Sarcocoele* uero simpliciter *Ramex* dicitur, 14. meth. cap. 17.

Sarcoma est carnis in naribus prater naturam auctio, differens a *Polypo* magnitudine & opificio, lib. finit.

Sarcomphalon incrementum carnis est, prater naturam in *Umbilico*, uel mitis, uel maligna. lib. finit.

Sarcosis in utero est carnis collecta expullulatio, quam si magna sit particulatim recidere conuenit uellicatum scalpris, quo celerius emoriatur, sin' parua protinus tollere, lib. finit.

Sarcoticum medicamentum est, quod carne ulcus implet, 3. meth. 2.

Satyriasis, & *Satyriasmus*, vide *Priapismus*, & *Elephas*.

Scabies, vide *Psora*.

Scabies oculi est summarum genarum, angulorumq; oculi erosio cum pruritu, quam acerrima fluxio progignit, lib. finit.

Scalpella, vide *Laminas*.

Scal-

Scalptum vocant frictionem, motumq; per ungues effectum, quod in prurientibus particulis animalia naturaliter faciunt, idque in ipsis omnibus reperitur, com. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Scamnū Hippocraticū, uide *Hippocraticū scamnum*.

Scaphoides. i. os nauticæ, siue nauiforme, est os profundo sinu excavatum, Tali caput anterius & oblongum excipiens; sic dictum à scaphæ similitudine, cavitatem enim habet oblongam scaphæ similem, qua simile caput *Astragali*, seu Tali intra se admittit, uide (uqiforme.

Scapulae sunt ossa post thoracem sita, cum osse occipitis, spinaq; thoracis costis & osse quod gutturi præiacet, musculorum opera copulata, lib. de ossib. cap. 14. quæ & *Omo-plata* dicuntur, lib. Introd. c. 10. uide *Omo-plasæ*.

Scarificatio idest cutis incisio, libr. de cucurbit. cap. 4. uide *Encharaxis*.

Sceletos est ossium humani corporis inuicem coherentium vniuersa compactio, libr. de ossib. in proœmio; appellatur autem *sceletos*, quasi cadauer assiccatum, 1. de anat. adm. cap. 2.

Scelos, crur, pars est corporis organica, à coxendice ad imum pedem protensa, præcipuum ambulationis instrumentum, cui per ossa innitimur, in femur tibiam & pedem diuisum.

Sceletyrbe, quasi cruris turbem, vel perturbationem dicas, species est resolutionis, qua erectus ambulare homo non potest, & latus alias in rectum, quandoque sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circūfert, interdum quoque pedem non attollit, sed attrahit, velut ij, qui magnos cliuos ascendunt, lib. finit.

Sceptica, est illorum medicorum schola, qui nihil sciri posse dicebant, lib. an sanguis in art. nat. cont. cap. 5. atque

in singulis rebus herent, atque basitant, libel. de subfig. emp. cap. 1.

Schesis dispositio est, quæ facile discutitur, ut calefactum in sole lignum, ex aduerso ei quæ agrè soluitur, ut quod igni eatenus excalefactum est, ut iam accendatur, et fumum edat, 8. meth. c. 1. Schesis est aduentitius corporis habitus, 3. de caus. puls. cap. 10. vide Affectus.

Schetica febris est, quæ facile discutitur, velut hectica, quæ difficile, 8. meth. 1.

Schetrion, exquisitum victum uocat Hippoc. ita qui contrarius ei est Phaulon, idest simplicem ac vulgarem & exquisitum; medium autem Hypophaulon, idest subvulgarem nuncupauit, 1. fract. 45.

Schidacedon, est diuisio per longitudinem facta conueniens fractis ossibus, in qua non omnino separantur à se partes sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem finduntur, veluti Caucedon, diuisio est per transversam facta, 6. meth. cap. 5.

Scindapfos, vide Pituita.

Scirrhis est liuiscens & crescens caro, ex uehementi diuturnæ inflammationis orta, lib. Introd. c. 15.

Scirrhum nominamus tumorem durum, qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu, talis enim sanabilis non est; Sunt qui eos duntaxat tumores qui præter naturam sunt, & omnino insensibiles scirrhos appellandos censeant, reliquos non scirrhos, sed scirrhosos tumores, 14. meth. c. 9. Exquisitus uero Scirrhus nominatur, qui omnino durus, sensuque priuatus est; qui uero non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino sentit, ex humore lento, & crasso, qui partibus quæ indurantur tenaciter infigitur, non exquisitus, 2. ad Glau. 4.

Scleriasis, idest durities, est tumor palpebrae cum rubore

bore; & dolore; difficile aboletur, durat magis quam inflammatio, lib. Introd. cap. 15.

- *Sclerintica pharmaca*, i. indurantia medicamenta, quæ duritiem corpori inducunt, quod tribus auxilijs præstatur, congelatione, siccitate, & repletionē siue tensione.

- *Scleroma*, idest durities, tumor est duriusculus, qui in parte vulvæ aliqua nascitur, fitque plerumque ex phlegmonis, quæ diu permanserit, lib. finit.

- *Sclerophthalmia* dura lippitudo, quæ oculus durior, ad motum pigrior, dolens, rubicundus redditur, palpebreque duriores, siccioreque sint, nec post somnam aperiri facile possunt vel inuerti propter duritiem; differt à *Xerophthalmia*, solâ magnitudine doloris duritiei, & siccitatis, quod hæc sit illa satis imbecillior.

Scleros tunica, vide *Retina*.

Scoliosis, vide *Obstipitas*, *Chyphosis*.

- *Scoptula*, vide *Omoplate*.

- *Scotodinos*, hoc est tenebricosa vertigo; cum. n. caput circumagi videtur. *Dinos*, idest vertigo nuncupatur, cum autem & tenebricosa fuerit visio, *Scotodinos*, hoc est tenebricosa | *Vertigo affectio* appellatur; sit autem ob inordinatam spiritus flatuosi motionem; qui vel in capite localem habet generationem; vel sursum ex infernis fertur partibus, 4. acut. 42. Est autem *Scotodinos* seu tenebricosa vertigo, quando simul res conspectæ videntur circumuolui, & sensus visus repente destituitur, cum agrotus sibi tenebras circumfundî opinetur; 4. apb. 17. Idem affectus, & *Scotomia*, & *Scotoma*, & *Scotomaticus* appellatur; ex ipsa appellatione qualis sit apparens; quippe à parua occasione hebetantur ij, qui sic laborant, adeo ut interdum cadant, maxime si aliquando in circum rotentur; seu alium quempiam, siue rotam, aut id genus aliud quippiam,

aut ipsos quoque quos vocant in aquis mortices, circumagi viderint. 3. loc. aff. 8.

Scotomia, Scutoma, Scotomaticus affectus, vide Scotodinos.

Scrofula, quæ & Seruma Cherades, & Parosides, & Epaxmata dicuntur, sunt apostemata, secus aures, libræ med. facil. par. cap. 11.

Srotum est tunica extrinsecus testiculos ambiens, libræ. Intrad. cap. 10. quod & Scortum, & vulgo Bursa testium, dicitur.

Scutiformis chartilago, vide Cricoides.

Scybala excrementa, sicciora, & quasi in nucleum formata, combusta scilicet à visceris phlegmone. 4. acut.

Scypho, vide Choana.

Scyros, idest Callus, & Porus.

Scytalides, vide Digni.

Sebum, siue seum, est oleosum, & pinguis substantia adipe siccior & magis concrescens, eiusdem tum adipe generis, (utrumque enim sanguis est concoctus, ex nutrimenti bonitate) nisi quod seum fragile usque quaque sit, nec ad ignem admotum tam facile liquecat, & cum refrigit denuò concrescat, ut ovis & Capra; pinguedo liquidior sit, minimeque apta durari, oleo longa vetustate incrustato similis, ut equi, & suis. (des.

Secundiformis tunica, Græce Choroides; vide Choroi.

Secunda, siue Secundina, vide Chorion, Retina, Retiforme.

Secundum naturam fieri, cum multis modis dicatur, in eum tamen sensum frequentius accipendum est, ut significetur, quod prima ratione à natura sit, idest quod quasi finis ab ea coniectatur, non quod ex consequitione quadam alijs succedere consuevit, talis motus secundum naturam

turā est, siue ex se aliquid, siue ab alio moueatur, ut motus Cordis qui in pulsibus fit est operatio, & ea secundum naturam; qui uerò in palpitationibus fit, is & Corde fit, sed affectio est, & ea non secundum naturam, 6. de placit. cap. 1. præter naturam autem quicquid est, aut affectus sunt, à quibus functio leditur, aut causa horum, aut symptomata, 3. de prasag. expuls. cap. 1. differtque ab eo quod est non naturaliter se habere, 8. meth. cap. 9.

Sedes, uide unionis solutio.

Sedimentum est id quod in urina residet, libr. de urinis cap. 16. quod si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nybecula, si ad mediam regionem suspensum, si profundiori parte inferiorem occupat locum, Hypostasis, ibidem cap. 21.

Semen ex Aristotele, est quadam pars utilis excrementi, à quo & ex quo singula fœtus membra efformantur, 1. de semin. cap. 14. Adhuc semen nihil aliud esse dicunt, quam sanguinem à venis, quæ ipsum continent, exquisitè confectum, 2. de sem. cap. 2. quod & genitales virus vocant, 1. progn. 42.

Semicoctos humores appello, qui à ventriculi calore alterationem perpeffi, non etiam perfectè ab eo superati fuerunt. simpl. cap. 15.

Seminary meatus, uide Parastate, & Glandulosi assistentes.

Semiotica hoc est, adnotatrix medicina pars est, curationi morborum per victum, summe necessaria, præterita, præsentiaque symptomata ad morbi causam inueniendam, & ad præsagiendam, diligenter inspiciens, libr. Introduct. cap. 8.

Semifyleratus homo, uide Syderatio.

Semiterciana, quæ hemitritæus dicitur, est f. b. is quæ

ex quotidiana continua, & tertiana intermittente fit, 2. de diff. feb. cap. 7. frequenter febris secundum suam ipsius naturam ex intermittentium genere est, ut tertiana, complexus autem quotidiane febris nullum integritatis tempus priori circuitui relinquit, dum secunda accessio antequam prior absoluitur, inuadere anticipet; hanc ego febrem compendiosa, claraque doctrina gratia, uno volens appellare vocabulo, imposui ei nomen semitertianæ, lib. de morb. temp. capit. octauo. Sane non nulli aiunt Semitertianam ita nominatam fuisse veluti semicirculum, ipsam tertiani circuitus dimidio minorem esse asserentes; Alij dicunt Semitertianam appellatam fuisse, quod dimidio tempore tertianam superet, ut si tertiana accessio ex duodecim horis componatur, semitertianæ, duodecim ipsas horas tertianæ in se se comprehendat, eisque dimidium duodecim horarum addat, uniuersæque simul euadant duodeviginti, lib. de Typis, quarto.

Senecta serpentum est, crassissimus quidam lentor ex diuturna latitandi mora hyemis tempore, sub caueris terra contractus, quæ res potius temporis longitudine, quam senescentis ætatis vitio prouenit. de Theriac. ad Pl. son. cap. 13.

Senes à Decrepitis, non nulli Hippocratis sectatores distinguunt, nomen seniorum ultimæ ætati tribuentes; senes autem in priori ætate statuentes, quæ media est inter iuuenes & seniores; Aliquando senes uocat eos, qui extremam agunt ætatem, 3. aph. 3. Etque id quod proprie omnes homines senectutem appellant, non aliud quàm siccum, & frigidum corporis temperamentum, annorum multitudinis ratione comparatum, 5. de tuen. sanit. cap. 6.

Sensifici nerui, vide Nerni sensifici.

Sensus

Sensus indigentia, est sensus sodi ventriculo, & maxime ori eius concessus; ad cibum sumendum animal ipsum excitans, & stimulans, 4. de usu pa. cap. 7. qui fames nuncupatur, lib. 5. cap. 8.

Sensus vitiosus est, omnis qui perperam obitus est sensus, quando scilicet proprium sensibile non sentit, vel cum vitio sentit, vel diminuit, vel deprauate ut in auditu surditas, auditus grauitas, obauditio. In visu cecitas, visus obscuritas, & deprauationes quædã, lib. de symp. diff. c. 3.

Sepedonodes; id est putrediniferos Græci uocant, & sunt, qui ad putredinem sunt, prout 8. meth. cap. 7.

Septa, quæ & Septica medicamenta dicuntur, sunt omnia quæ tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore possunt, huiusmodi sunt arsenicum, auripigmentum, sandaraca, chrysacotta, Aconytum; Vocantur autem Septica hoc est putrefacientia cum putredine; symptomatis autem similitudo, ut sic appellemus efficit, inter hæc autem numerantur, & Cathartica, hoc est detractoria, quæ extimam modo superficiem, quam tetigerint, detrahant, non tamen in altum subire valeant, ut alumen, galla omphaticis, æs combustum lotum, 5. simpl. 15.

Serapium vocat Aethuarius potionem eam quam hodie syrupum voce magis barbara nominant; sic verò vocant, quando medicamenta cum melle, vel saccharo donec concreuerint, coquuntur. Diuidunt seplasiarj syrupum in breuem & longum, breuem quod parum aquei humoris in se habet, appellant, alioque nomine communem uocant, longum quod humoris aquei multum obtineat, nominantque alia uoce decoctum.

Septum transversum, uide Diaphragma.

Serosum recrementum, uide Ochima trofis.

Serpigo,

Serpigo, vide Herpes.

Sesamoidea ossa à sesami leguminis minuti specie sic dicta, quæ multis manuum, & pedum articulis natura ex abundanti velut auctarium circumponit, securitatis gratia, 2. de vsu par. 12.

Sessilis verruca, vide Formica, & Myrmex.

Sextans pendet uncias duas, sestarius uncias tres, 4. de comp. med. per gen. 14.

Sicca frictio est, quæ corpori foris adhibetur, ad curandam quodammodo lassitudinem nullo humido, aqua videlicet, uel oleo foris circumfusus, 2. simpl. cap. 25.

Siccus bydrops, vide Hydrops.

Sief, vide Collyria.

Sielismus, est salina plus aquo in os affluxus, sine ab humidiore capite in glandulas ad radicem lingue sitas, siue à Ventriculo multa pituita redundante, quæ ex eo secundum gulam in os proripit, 8. de comp. med. loc. cap. 4.

Sigmoides apophysis, dicitur processus unus. Quomodo quæ instar antiquæ Græcorum litteræ C, cuius sit, qui & Angroides & Coracoides appellatur.

Sigmoides membranae seu cartilagines sunt tres tunicæ, quæ in vena Cordis arteriosa sunt quæ pulmonem alit, intus foras spectantes, quas à figura Græca litteræ sigma, qui accuratius tractarunt anatomicas, sigmoides appellant, 6. de vsu par. 14. Sigmoides adhuc dicuntur, cartilaginum aspera arteriæ extremæ partes, quæ sigma litteræ figuram referunt, 4. loc. aff. 6. vide Cricoides.

Signa indicatoria, vide Decretoria.

Significatio febris, vide Insultus accessionis.

Signa aliqua mala sunt, tum ut signa, tum ut causæ, ut signa quidem quoties ex difficilioribus sunt affectionibus, ut causæ verò quoties ipsa rursus alias committant pra-

nas

uas affectiones, 2. progn. 49.

- Sima Hepatis pars est, concava ipsius pars, qua parte iacet vena porta; Unde per Meserai venas alimentū a ventriculo, primisque intestinis attrahit, cuius opposita, convexa & gibba nuncupatur. 4. de usu p. cap. 13.

- Similare membrum, quod & simplex, homogencum, & prima corporis particula, qua ex primis constat elementis, & ex qua alie sunt, est, cuius quamcumque partem sensibilem sumpseris, erit illa toti communicans in nomine, et definitione, sicut os & caro, de anat. viu. cuiusmodi sunt arteria, vena, nervi, ossa, cartilago, ligamentum, membrana, caro, lib. de morb. differ. capitu. tertio. vide Instrumenta.

Simiosis, vide Annotatio.

Simplex morbus, vide Compositus.

Simplicem febrem vocat Hippoc. qua mitis est, & cum signis tutis, 1. cris. 16.

Sinapismus est medicamentum vehementer calidum, ex sinapi compositum, capiti conveniens. 3. loc. aff. 4.

Sinciput est anterior capitis pars supra frontem sita, capillis interfecta, lib. Introd. cap. 10. vide Bregma.

Singultus λόγξ, est veluti convulsiva quadam oris ventriculi affectio, quod ex humorum copia gravatur, vel mordetur, vel propter frigiditatem contrahitur, com. 1. in t. prorrh. 23. tum ex immoderata inanitione, 4. acut. 69. non autem est vera convulsio, utpote qua in solis musculis accidit; ventriculus autem nec musculus est, nec eius os, 3. de caus. symp. cap. 2.

Singultuosa febris est, qua in singultu rodentem, acerrimumq; humorem vomit, à quo tamen symptomate febrientes sunt liberati; verum febris huiusmodi, nequaquam singultuosa dici debet, nisi singultum per totum morbum

[mul

simul cum febre, egrum exacerbauerit, 4. acut. 69.

1. Sinus qui & *Romica*, est solutio continuitatis in carnosâ parte effectus, cum sanguinis quadam in mediam regionem, affluxione, id quod abscessui, & sini commune est, quoad enim pars ita affecta, in exteriori summitate occlusa est, atque os nullum habet, abscessisse quidem ipsa dicitur, affectio uero abscessus propriè, id est apostema vocatur; at ubi aliqua ex parte aperta est, ut qui continetur humor excernatur, non amplius abscessus, sed sinus iam appellatur, 2. de his quæ in medic. 27.

2. Sinus rectus appellatur, cuius os in inferiore parte, fundum in superiore est, obliquus cum in latius declinat; sunt contrario etiam modo sinus, quibus deorsum fundum, sursum uero os vergat; sed non his fundum quo facilius saniei exitus pateat, aperimus, 2. de his quæ in medic. 28.

3. Sinus vulua, vide Cornua.

Siriasis est inflammatio Cerebri, & membranarum eius, quam consequuntur syncipitis, & oculorum cavitates febris ardens, pallor, totius corporis siccitas & inappetentia.

4. Siræon, vide Apothermus.

Sitis, Græce δῖψα potionis desiderium est, id est appetitus frigidi, & humidi.

5. Solidas corporis partes, vocat ossa, nervos, cartilagineas, ligamenta, tunicas, musculos, membranas, nervos, arterias, lib. Denotatio dogmatum Hippoc. quas etiam particulas, elementares, similes, & simplices appellat, 1. de natur. fac. cap. 7.

Solutio morbi simpliciter est illa, in qua vel virtute, vel morbo sensim emoriente, vel morbus, vel vita finitur, 3. cris. 1.

6. Solutus est, qui laxatos habet articulos, 5. de compos. med. per gen. cap. 2.

Sopientia, vide Anodyna.

Sopor, idest Coma, propensio, delatiove in somnum est, cum vigilare acri nequeant, non habentes apertos oculos, sed conniuentes, vel altis somnis, vel tenuibus, vel vigilijs detineantur; idque accidit, vel humectata ea parte Cerebri, quæ sensus fons est, ut in ebris, deinde ob solum frigus; aliquando ob utrunque subinde propter virium imbecillitatem adeò iam emorientium, ut apertas palpebras servare nequeant, com. 1. in 3. de morb. vulg. 7. vide Caros, & Coma.

Soporarie arteriæ, quæ & Carotides dicuntur, sunt duæ illæ quæ ab arteria magna sursum ascendente, postquam ex Thorace emerfit, ac claviculas transgressa in medium iugum pervenit, erecta in duas partes scissa, generantur, 1. de placit. cap. 7. vide Carotides.

Sordes, crassius excrementum est; in ipsa enim primæ carnis generatione, duplex excrementum provenit, quod omnem qualitatis alimenti mutationem, alterum crassius, alterum tenuius sequitur; quæ per uniuersum corpus provenientia, quod tenuius est, ipsa est insensibilis perspiratio, quæ etiam subinde fit visibilis, quoties vel naturalis calor languet, vel nutrimento vititur, quam iustum sit ampliore, vel motus quispiam vehementior animali contingit; alterum sordes, quæ in summo corpore nostro colligitur; Quin etiam in ulceribus, tenuis excrementum sanies, Græce Ichor appellatur, quod crassum est sordes; ex priore excremento ulcus humidum redditur, ex crasso sordidum, 3. meth. cap. 3. vide Ichor.

Sorici cauda, siue Soricinus, vide Myurus.

Sparganothis est, dum ob lactis redundantiam, mamillæ tumefactæ sic distenduntur, ut copiam hanc vix ferre queant.

Spas-

Spasma, uide *Rhegma*.

Spasmus, i. *Convulsio*, musculi est ad suum principium contractio, uide *Convulsio*. Inde *spasmosus* affectus, i. *Convulsivus*, qui in suo principio, aut non multo postquam fieri coeperit, convulsionem accersit, com. 5. in 1. prohibet. Adhuc convulsivam afflictam appellant, qui ante mortem necessariò convulsionis aliquod periculum indicit. 1. de presag. ex puls. *Spasmosus* autem pulsus siue convulsivus, est pulsus inequalis in una pulsatione, & diversis arteriarum partibus, in quo utrinque ab extremis retrahendi, convellique arteria videtur, in modum chordæ tensæ.

Spasmus oculi, uide *Mollities*.

Spata, instrumentum est, quo *Pharmacopolæ* confecturas in *Cacabo*, seu mortario mœuent, & nos perspicuitatis gratia similiter nominabimus, 1. de com. med. per gen. c. 4.

Spathomela, uide *Laminas*.

Sperma, spermatica arteria spermaticæ venæ spermatici pari, uide *Semen*. Glândulosi assistentes, & *Parastate*.

Sphacelare Hipp. in lib. de fract. & artic. pro corrumpere usus est; *sphacelus* autem est corruptio substantiæ vniuscuiusque partis quæ *sphacelari* dicitur, sanæq; partis carnosæ interitum ex magnitudine inflammationis quem propriè Medici *gangrenam* nunciant, Græci *sphacelum* etiam appellabant, 7. aph. 50. *sphacelen*, adhuc uocant ossis cariem. 14 meth. 17. *sphacilos* nocem sunt qui dicunt vehementem dolorem declarare, alij tantam inflammationis excessum, ut partem ad corruptionis periculum inducat, 2. loc. aff. 7.

Sphacelodes Hemicrania, idest alterius capitis partis convulsorius dolor. 2. loc. aff. cap. 7.

Sphacelon, uide *sphacelare*, & *syderatio*.

Sphaeromata, uide *Natem*.

Spha-

Sphage, uide *Antricardion*.

Sphagitide, idest uenę ingulares, 5. meth. cap. 4.

Sphenois os, (quod & *Polymorphum* appellatur, lib. Interd. cap. 12.) est quod ad cunei similitudinem; ex utroque latere a *Caluaria* ad palatum tendit, superiorem maxillam constituens, cuius ossis apophyses utrinque concavae, ab alarum similitudine, *Pterygodes* nuncupantur, lib. de ossib. cap. 1.

Sphincter quasi strictor, seu constrictorius, est musculus constringens orificium recti intestini, 6. de anat. adm. 4. uide *Rectum*.

Spicilla, uide *Laminas*.

Spina est omnium vertebrarum, quas *spondylos* uocant, structura, sumitur & *spina* aliquando pro *medulla spinali*, 3. loc. aff. 10. uide *Dorsum*, *Myelon*, & *Medulla spinalis*.

Spirationem naturalem appellat *Hippo.* *spirationis* facilitatem, significantem neque thoracem, neque Cor, aut pulmonem, neque praecordia doloris aliquam habere affectionem, quin etiam neque partes quasdam ijs adiunctas *Ventriculum*, *lienem*, *iecur*, 1. prog. 25.

Spiritus πνεύμα, præcipuum est naturæ instrumentum, quo omnes functiones muniaque exequitur; substantia aërea calida, leuissima, tenuissima, omnes in corpore motus naturales ciens; est enim tertia substantia, ex aduerso aliarum duarum solidorum inquam, & humorum, disiuncta; eiusdem planè cum calore nativo originis, & temperiei cuius est perpetuò comes & instrumentum; nam cum ad vitę munia oporteret calidum innatum per omnia diffundi, is verò singulis solidis partibus insitus & fixus, & immobilis sit; ei natura spiritum socium astiuit, qui ipsum suo celeri motu quò necesse erat deduceret. Eque tanta spiritui cum calore nativo, substantiæ communio, &

proes

operis societas, ut par sit etiam eiusdem esse naturæ, ut non immerito Hippo. spiritus vocarit, impetum facientia, à sui motus celeritate. Aliquando Hippo. absolute ipsam respirationem, vocat spiritum com. 4. in 6. de morb. vul. 4. Unde & densum & rarum spiritum, id est respirationem tardam, & raram vocitabat, 1. de difficul. resp. cap. 2. interdum ab eodem aer inspiratu attractus, qui respirationis, vocisque materia est, spiritus appellatur, 1. acut. & in progn. Aliquando flatus ipse quo nervosa & musculosa corpora distenduntur, spiritus appellatur.

Spirituosus appellat Hipp. eos dumtaxat, qui eum inspirant, aere multo indigent, 4. acut. 115.

Spirituosus, vide Sanguineus.

Spiritus flatuosus, qui & flatus etiam appellatur, crassus, ac uaporosus flatus est, non secundum substantiam aerius atque tenuis; Cogita verò eius naturam ex circumstante nos aere, in memoriam revocans, qualis in Austriis constitutionibus, qualis in Aquilonaribus fiat; ei enim qui in Australibus assimilatur flatuosus, alteri verò qui in Aquilonaribus, is qui in nobis secundum naturam, est spiritus, 2. Glanc. 6. vide Flatus.

Spiritus animalis est primum animæ instrumentum, in Cerebri ventriculis contentus, ad sensum & motum in universas corporis partes transmittendos, procreatus, 4. loc. aff. 2. Spiritus equidem qui in arteriis continetur, vitalis, & est, & dicitur qui in Cerebro animalis, non quod substantia animæ sit, sed quod est primum eius illic habitantis instrumentum, qualiscunque substantia postea fuerit, qui ex vitali perfectius concocto, & in Cerebri anfractibus elaborato conficitur; qui animalis spiritus, neque eius domicilium, sed primum tantum instrumentum est, eo quod cum ex vulneratione fuerit euacuatus, illico animal quasi mor-

si mortuum collabatur; cum iterum colligitur, reuiuiscit,
7. de placit. cap. 3. spiritus animalis, exhalatio quædam est
sanguinis benigni, 6. de vsu p. 17.

Spiritus detentio, est respirationis ad plurimum tēpus
uoluntaria cohibitio, qua & singultus & oscitationes sa-
nantur, 3. de diff. respir. cap. 10.

Spiritus densus, est breuis spiratio, hoc est motus respira-
toriorum organorum, per breue tempus factus, 3. de diff.
respir. cap. 10. vide Inspiratio densa.

Spiritus inter exeundum offendens, uide Expiratus.

Spiritus asper à quibusdam appellatur is spiritus, qui
cum sono ducitur, siue ob angustiam loci quo ille redditur,
siue ab humoris copia, 3. de artic.

Spiritus uitalis à Corde genitus in arterijs continetur,
nutriturque respiratione & sanguine; quod si naturalis
quoque alius spiritus est, utique is quoque in iccinore, &
venis continetur, 12. meth. 5.

Spiritus naturalis, uide spiritus uitalis.

Spiritus sublimis est, qui sublimioribus thoracis parti-
bus inspiratur, 4. loc. aff. 7.

Spirituum interceptio, uide Interceptiones spirituum.

Spissum corpus, uide Rarum.

Splen, siue Lien, corpus est rarum admodum, ac laxum
inftar spongiæ cuiusdam. ut succos crassos, & melancholi-
cos facile attrahat, & excipiat, heparque expurget. Vnde
ipsum Parenchyma idest affusionem nominant, 4. de
vsu p. cap. 15. cuius sima partes, seu concaue Iecur, & ven-
triculum spectant, gibbe bis opponuntur, cap. 16. cuius cor-
pus tanto est rarius hepate, quanto est crassius pulmone,
capit. 15.

Splenica uena, est ramus superior & minor uenæ por-
te, qui totus per lienem spargitur, nam cum uena porta in-

duos precipuos ramos distincta sit, hic in lienem abit, alter in mesenterium diffunditur.

Splenici dicuntur, ij propriè, qui induratum splenis affectionem habent, non quibus inflammatum uiscus est; 9. de comp. med. loc. cap. 2. Euadunt autem lienosi à copia melancholici humoris lieni infarcti, quam defluxiones, & fædus corporis color subsequitur.

Splendentem urinam uocauit Gal. quæ & flaua est, & peculiari, ac propria missione constat, ita ut gemini coloris esse uideatur, & rufi & rubei, splendorem enim à rufo, nitorem autem à rubeo accipit, lib. de Vrin. cap. 4.

Splenia, vide Plagula.

Spondylus, Sphondylus, Spondilon, Vertebra idè significant, sunt viginti quatuor ossa, quibus Rhachis, i. spina constituitur, tot enim sunt in homine secundum naturam se habente, aliquando uerò plura, aliquando pauciora uisa sunt, omnia caua & forata, spinam habent, & apophyses obliquas, & transversas descendentes, & ascendentes, vide Dorsum.

Spongoidea ossa, vide ossa Itkmoidea, & Cauernosa ossa.

Spontanea vocantur ulcera, quæ ex mordente humore oriuntur, qui humor ea procreans sistitur in exitu, ac tardat, extremamque cuticulam, quam solam propterea quod ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit; quando si hanc quoque sudoris vice transiret, haud quaquam vlcus excitaret, 14. meth. cap. 17.

Spontaneum apud medicos dicitur, non quod sine causa sit, sed quod nostra causa non sit, 6. aph. 14.

Sponte euacuari à corpore dicimus, quacunque sine aliqua medici opera excernuntur; non nunquam ea, quæ nostrum regit corpus potentia ipsum expurgante, non nunquam ex irritamento aliquo, aut quia à vasis non continentur,

neantur, quapbo. 2.

• Sporades morbi, qui & sporadici sunt, qui sparsim praeuatiunqueprehendunt, egros discrepante fatigantes, neque fixummodum communem modum constantes, 1. acut. 9. vide Endemius. Communis.

• Sporades uenae sunt, propagines quaedam uenae maxime in totum cras, ab interiore ipsius parte per inguina procurrentis, inordinate ad cutem permeantes, modicis intervallis sparsae, 3. de anat. adm. cap. 12.

• Spuriæ costae, vide Illegitimae.

• Sputum appellatur, non id quod spuendo sanguineum, ac biliosum, atque spumofum est talem enim proprie sputamen nominamus, sed cum neque sanguini, neque bili palidæ, uel nigrae commistum fuerit, id quod tale fuerit, iam sputum uocamus, 1. de cris. 5.

• Sputamen est sputum, cui aliquid alieni humoris est admistum, ut bilis sanguinis. saniei, 1. de cris. 5. sputum autem quod secundum naturam se habet est, cui flauum aliquid admistum est, ibidem.

• Spiratus uocant Caprarum deiectiones. sunt autem haec sicca, atque id quod excernitur propria circumscriptione rotundum, circumductumque existit. Cum igitur quis hoc pacto, sicca, & circumducta deiecerit, spyratode, id est in spyras uoluta appellantur, fiuntque talia & quod plusculo tempore retinentur, & propter copiam ignea caliditatis, com. 2. in 1. prorrh. 6. quæ & Scybala excrementa uocantur, uide Scybala excrementa.

• Squamosæ agglutinationes quæ & mendosæ commissuræ, & temporales dicuntur, uide Lepidoides.

• Staltica medicamenta, quæ carnes vulneribus aquant, lib. de Dynam. in proœmio.

• Staphyle est carnosæ quædam particula, quæ in sum-

mo ore apparet dependens , si quis aperto plurimum ore toto, linguam deprimat ; hæc ipsa caruncula duobus nominibus appellatur, à ueteribus Græcis, Gargareon, & Cion, hoc est Gurgulio & Columna ; Cæterum posteriores medici fere omnes, non ita, sed Cyonidem, idest Columellam uocant; nam qui Staphylen, idest, uuam & acinum ipsam appellant, eorum, neque meminisse præstat. Nos enim non particulam illam, sed unam aliquam eius affectionem staphylen, siue uuam nominamus, raro autem hæc affectio circa columellam contingit, uerum ualde sæpe inflammatur, 6. de comp. med. loc. cap. 3. quæ & vulua appellatur, lib. de anat. viii. Est igitur staphyle non illius partis inflammatio, ut quidam putant, sed quadam illius passio, in qua tota Columella laxata, extrema sui parte maior est, & liuida, superna uero tenuis ut similitudinem fructus uugæ, unde nomen accepit, præseferat, Latini uuam nominant, Gal. ibidem.

Staphyloma, est oculi morbus, cum in summa tunica, quiddam acino simile euenit, 2. meth. cap. 2.

Statum ab Hippo. solere, non temperamentum tantum aeris præter naturam, sed et omnem cuiusque rei formam appellari, recordemur, com. 3. in 3. de morb. vul. in progm.

Status morbi est uehementissima totius morbi pars, 1. de cris. 8. vel status morbi aliud non est, quàm morbi quantum ad casus, & symptomata attinet, maximum, 1. aph. 7. vide Consistentia.

Steatocele, affectio est scroti succrescente in eo seuo, lib. Introd.

Steatoma, uide Atheromata.

Stegnosis, idest stipatio, cutis uitium, quo per occultos meatus prohibetur transmitti quod superfluum est, obstructis, siue densatis meatibus, quam densitatem Mysim, idest

idest conuiuentiam uocant, 3. de sanit. tuen. c. 10.

Stegnotica medicamenta, hoc est obstruentia, quæ sensibiles excretiones cohibent, corpus enim quod claudit, & continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi, ex sese emittit, Græcè *Stegnon*, siue *stegnoticum* nuncupatur, 5. simpl. 14. vide *Obstruentia*.

Stelechiga, vena est superficialis, & Caudicis more sita, unde omnes alia venæ sanguineis ac pedestrib. animalibus procedunt, 6. de anat. adm. c. 8. estque vena magna ad portas iecoris sita, aliarum omnium caudex, ibid. cap. 10.

Stephanos, *Corona*, & *Iris*, sunt locus ille cõmunis, quæ uniuersa oculi tunicæ simul committuntur, 14. meth. c. 19.

Stephanica vena, futura, & os, uide *Coronale os*.

Sternon, est antè Thoracis os, 7. de anat. adm. ca. 2. Sedes omnibus costis duplex est, prior *Sternon*, idest pectoris os, posterior uertebra, quæ totidem numero planæ sunt, quot & costæ habentur, duodecim inquam; quod quidem pectoris os, unum quidem os apparet ob harmoniæ perfectionem, quam ipsius particulæ in contextu sortiuntur, membranæ autem derasis, quod & plura, ossa sint, & numero totidem quot cum eo costæ dearticulantur, palam innotescit, 8. de anat. adm. cap. 1.

Sternutatio maximum remedium capitis halitus repleti est, quæ uno impulsu tum à pulmone, tum à capite spiritus emittitur, ad expurganda ea quæ in naribus offendunt, 2. de caus. sympt. cap. 4. *Sternutatoria* uerò medicamenta sunt, quæ naribus admota, uapore ad Cerebrum sublato, crassitudinem humoris dissecant, & per nares seu palatum Cerebrum expurgent, 13. meth. 21.

Stigmata Græcis, inter cutis vitia annumerantur, & dicuntur non puncta, sed maculæ punctorum quantitate & forma hominis cutem & superficiem decolorantes, ac

variantes; Vermicatam vulgò nominant.

Stomachi paralysis symptoma est virtutis attractivæ Stomachi, cum alimentum citra trahere non potest 3. de sympt. caus. cap. 2.

Stomachicos plerique homines eos appellant, qui appetentiam perdiderunt, & quibus post acceptum cibum, ventris os gravatur, atque opprimitur, & quandam agrè tolerabilem anxietatem habet. Appellant eodè modo etiam illos, quibus nausea contingit, & maxime si ad vomitum impellat, & adhuc magis si simul cibi corrumpantur quandoque acidi, quandoque nidosi facti, quandoque aliam vitiatam qualitatem adepti; Adhuc magis eos Stomachicos appellant, quibus ructus huiusmodi cum molestia quadam, anxietate, & subuersione contingunt, sæpe cum nondum cibum acceperunt; quin etiam si per plurimum tempus cibi in ore ventris morentur, gravantes & uix descendentes, hos etiam Stomachicos appellant. Alios item appetituum caninum habentes, ut & plurima edant, & maxime gravati, paulò post reuomant, vocant similiter. Alios rursus, qui fortiter exoluuntur, ubi diutius in ediam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, quorū aliqui etiam nauseosi fiunt, nisi citius potum ac cibum acceptent, Stomachicos etiam vocant, 8. de comp. med. loc. cap. 2.

Stomachum, os ventris appellant, cum & medici hanc partem ita appellare sint assueti, qui etiam stomachica animi deliquia appellant, & quosdam Stomachicos esse dicunt, à quopiam videlicet in eo loco ubi affectu ita appellant, velut hepaticos ab hepate, Colicos à Colico, Nephriticus à renibus, Splenicus à splene affectu, 2. de comp. med. loc. cap. 1. & 4. de caus. puls. 23 licet Stomachi, nomine collum omni ventri prepositum, instar isthmi cuiusdam

iusdam angustum, intelligatur, 4. de usu par. c. 1. quin & Oesophagus, stomachus dicitur, vide Oesophagus. Est igitur stomachus, os ventriculi, idest meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum intromittuntur; aliud habet, & ventriculus os infernum, quod Græci πυλῶρον, quod chylus descendit, vocitant; duobus enim nominibus, veteres os vetriculi nominabant, Stomachum, & Cardiam, idest Cor. 8. de comp. med. loc.

Stomatica medicamenta sunt, quæ modicè siccant, sic vocata, quod in assiduo sint usu, ea sunt, quod ex moris conficitur, & quod ex Rubi fructu, & quod ex succo corticis iuglandium viridis, atq; etiam his magis quod ex musco, & cupressi spherulis componitur, 5. meth. cap. 10.

Strabilismus, qui & Strabismus dicitur, est musculorum oculi, non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam, vel sursum, vel deorsum, vel in latera nuunt oculi, lib. finit. vide Illosis.

Stranguria est vesicæ affectus quo urina non retinetur, sed guttatim distillat, lib. finit. quæ & urina stillicidium appellatur, 8. de placit. 6. fit autem vel imbecillitate vesicæ, vel urinae acrimonia, 3. de caus. sympt. cap. 2. vide Ischuria, & Caliacæ.

Strangulatio, est internecio ob respirationis defectū facta; qui defectus fit, vel propter angustiam, & coarctationem alienius spiritalium instrumentorum, i. respirationi servientium, vel propter virtutis thoracem mouentis imbecillitatem, vel propter vitalis principij vehementem refrigerationem; Angustia autem fit, vel repleta ea regione quæ inter thoracem & pulmonem media est, vel pulmonis cavernis & fistulis, vel inflammatione quadam totum viscus habente, vel asperam arteriam, vel eius arteria caput, quod Gracilary gem & Bronchon nominant, Latini guttur;

vel illam gutturi præiacentem capacitatem, quam Græce Pharynga, Latini Fauces nominant, 4. aphor. 34.

Strangulatio uteri, & omnes apnæa, 1. spiritus interceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, & præsertim viduis accidunt, fiunt innata caliditate à multitudine materia frigide grauata, ad similitudinem flammæ, quæ præ multis humidis lignis suffocatur, 3. de diffic. respir. c. 10. et 6. loc. aff. 5. qui affectus à Græcis ὀσφίς, καὶ ὀσφίς πύξις, à quibusdam ἀπνοία ὀσφίς, dicitur, Latini autem uteri strangulatum, uterinam suffocationem, vel spirationis ob uterum priuationem, tum à parte affecta, tum à superueniente symptomate appellant.

Strangulator, vide Lycoides, & Lupus.

Strictor, vide Anulus, Rectum, Sphincter.

Strigmenta sunt particula quedam intestinorum, quæ in excretionibus biliosis simul deiciuntur, summa intestinorum tunica humoris acrimonia derasa, 4. de art. 31. vide Rhypodea.

Struma, vide Chæras, Parotides, Scrofula.

Stryphna, vide Halitiosa.

Stultitia est rationis deperditio, cum læsione memoriæ, 3. loc. aff. 5.

Stupefacientia, vide Anodyna.

Stupor insignis est refrigeratio, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit, quemadmodum completa refrigeratio & sensum & motum omnino tollit; Equidem novi quosdam adeo refrigeratis pedibus, ut in primis quidem diebus sensus periret, sequentibus deinde diebus emortui pedes putrescerent, 2. loc. aff. 2. Est autem symptoma quale dentibus evenit post esum malorum immaturorum, & aliorum acerborum & acidorum, 3. de aliment. facult. c. 16. Estque adhuc stupor, cum ner-

nas aliquo obstruente, vel adstringente cogitur, unde spiritum animale ad membrum transmittit, hinc membra sensu & motu priuantur, lib. de ren. aff. dign. cap. 3.

Styloides, vide Graphoides, & Lithoides.

Stymmata spissamenta sunt, quæ oleis adduntur, aut odoris gratia, aut ut confecta diutius ab iniurijs immunia permaneant, 2 de comp. med. per gen. 2.

Styptica, quæ stringunt partes relaxatas, libr. de Dynam. in proœmio.

Subalaris vena, vide Axillaris.

Subclanium, vide Cataclida.

Subcartilaginea, vide Hypochondria.

Subcinctura, vide Diaphragma.

Subcingentes membrana, vide Hypexochotes.

Subductiones solitus est Hippocr. appellare per aluum excreunia, 7. aphor. 64. dicitur autem subductio, de ea tantum excretionem, quæ per aluum fit, non de ea quæ fit per vniuersum corpus, 2. aph. 18.

Subfasciaciones, & subligamina, vide Epidesmus, & Plagula.

Subligamentum, Enæorema, & Nubecula apud Hipp. sunt id quod corporulentius, candidiusq; in urina, neque in summis eius, neque in fundo vasis, sed in media sede sublimè & exquisitè medium, vel deorsum potius, quàm sursum, existit; licet apud Galenum nubecula sit id quod supernatat in urinâ desuper, 1. progn. 26.

Sublimis spiritus est externus aer, qui ob suffocationis periculum, nobis exurgentibus, toto thorace, in suspiriosis cynanchycis suppuratis, peripneumonicis magna vi attrahitur, nam nobis inculpatè degentibus solis inferioribus thoracis, quæ ad septum transversum sunt partibus inspiramus, sin ampliorem spirationem requirimus, etiâ partes

partes infernis vicinas unà mouemus. Vbi plurima indi-
geamus, tum partes etiam ad operta scopula agitamus,
totius thoracis ualida opera utentes, commen. 2. in 3. de
morb. uulg. 4.

Submissio, uide Ablatio.

Substitutus medicinas appello, quæ in alterius locum,
subrogari queunt, lib. de substit. med.

Subsultio, uide Palpitatio.

Subuersio stomachi, aliquando appetitus deperditio-
nem, aliquando nauseosas afflictiones ab accepto cibo fa-
ctas significat, 8. de comp. med. loc. 3.

Subuersio uoluuosa stomachi appellatur, fortis & con-
tentiosus vomitus; nam quemadmodum in Voluulis subuer-
siones fiunt cum magna contentione & violentia, adeo ut
stercus etiam euomant sic etiam alios uomitus concitados,
quis appellare uoluulos posset, 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Subuola, manus pars est, ut. n. supina pars manus, iuxta
pollicem assurgens thenar, & uola dicitur, ita huic opposita
Hypothenar, idest subuola nominatur, lib. Introd. cap. 10.

Succus, uide Humor.

Succum medicatum uocamus eum qui primum defæca-
tur, subinde uero Solis aut ignis calore sic densatur, ut lon-
giore tempore citra corruptionem asseruari queat, Ara-
bes Rob uocant. Ex hoc genere est, quod ab iisdem Miua-
dicitur, sic enim appellant succum fructuum, eò usque
decoctum, ut sapor aut mellis consistentiam acquirat.

Sudamina, (Græcè Hidroa,) è genere sunt pustularum in
summa hærentium corporis parte, quæ instar ulcerum cutem
exasperant; proueniunt autem ueluti & ipsum ostendit no-
men pp multos sudores, qui uel biliosiores, uel cæno mor-
daciore existunt; mordent. n. bi cutem, & pruriginosam
efficiunt, & per modum ulcerum exasperant, 3. apbo. 21.

Sudor,

Sudor, Græcè ἰσπᾶς, est humidum tertia concoctionis excrementum, per cutem in aqua speciem crumpens; cuius materia est humor tenuis, & serosus alimento permixtus, quòd facilius exiguas, & capillorum modo tenues uenas iubeat, atque ab his in partes, quæ eo ali debent, sese insinuet; estq; eiusdem cum urina generis, in eo tantum ab illa differens, quod hæc ad uesicam, hæc longius in corporis habitum deferatur; cuius humoris excretio secundum naturam est, non minus quam urinae & aliorum excrementorum.

Sudor bonus est, in febribus, qui euenit die iudicatorio, toto promanet corpore, calidus, integrè febrem finiat, uel morbum tollerabiliorem efficiat, idque in acutis morbis, 1. progn. 26.

Suffocatio, uide Strangulatio.

Suffusio, uide Hypochyma.

Suffumigium, uide Thymiana.

Sugillatio, uide Contusio, Hyposphagma, Hamalopa, Exuccatio.

Sumen, uide Ephebaon.

Summum humerum, uide Acromion.

Supercilia sunt ea pars faciei, ubi frons à superioribus descendens desinit, ceu terminieius eminentes, & pilis consisti, lib. Introd. cap. 10.

Superexcretionem recentiores medici uocant, eas eruptiones, in quibus natura ad indicatorium auxilium concitata, modum excessit, 3. de comp med. loc. cap. 3.

Supergeminalis, uide Epididymis.

Supergenualis, uide Patella.

Superhumeralis, q̄ & Epomis dicitur, uide Humerus.

Superimprægnatio, uide Epicyrma.

Superlegamina, uide Epidesmus, & Plagula.

Super-

Superligula, uide Epiglottis.

Superpurgatio, et superuacuatio, uide Hypercatharsis.

Supinitas, stomachi affectio est, qua quidam accepto cibo, si paulò fortiori motu moueantur, statim uomunt. Ceterum quæ à multis vulgo supinitas stomachi appellatur, contingit quidem iuxta intemperiem quamcunq; citra uitiatos humores. Aliquando sequitur ad solam oris ventriculi debilitatem, quod cibos amplecti, eisq; obuolui non potest, ueluti tota uentris amplitudo solet. Fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen malignæ qualitatis. Irriguus enim stomachus per largam humectationem, similiter ut ligamenta nervorum, laxatur, quandoque verò cum uitiatæ alicuius, modicæ tamen humiditatis complexu; etenim multa, quemadmodum valde uitiatæ, etiam citra cibum, nauseam efficit, 8. de cons. med. loc. cap. 3.

Suppuratio, uide Purulentia.

Suppuratus est, qui multum puris in capedine inter thoracē & pulmonem collectum habet; cōmuniter verò omnes quibus inflammatū viscus aliquod suppurauit, suppuratos, Empyus & Empyicus vocant, 4. de caus. cap. 6. Suppurari autem aliquando ad generalius significatum transfertur, i. ad corrumpi: sic enim sanguis cum è suo loco exciderit, et per minimas partes ad eas quæ in musculis sunt cavitates, aut per inania spatia, quæ nasti circumiacent, fuerit effusus, non permanet sanguis, sed aliquando suppuratur, aliquando nigrescit, aliquando in grumos vertitur, præsertim quando in magnam cavitatem præter naturam exciderit, 6 aphor. 20. uide Empyus, & Purulentus.

Sura est Tibiæ venter, quem Græci Gastrocnemion vocant, 3. de usu par. cap. 10. Estque posterior tibiæ pars carnosæ, 16 de usu par. 8. ueluti anterior em carnis exper-

tem,

tem, Anticnemion, & Ocream nominant, 2. de anat. adm. cap. 4. vide Tibia.

Surditas, *Κωφοις*, est actio auditus abolita, à causa aliqua præter naturam, vel læsa audiendi facultate, eiusque primario instrumento, quod est animalis spiritus in aurem affluens, aut læsis organis, quæ natura ad audiendum comparauit.

Suspendiculum appellatur, quod fœminis intra abdominis membranam situm, à musculo dependens, atque ad vuluam ex utraq; parte dextera & sinistra transmittitur, utrinque alterum ab illius musculis per membranæ abdominis foramina, 2. de sem. c. 5.

Suspensum, vide *Sedimentum* & *Hypostasis*.

Suspiriosus, i. *Asthmaticus*, lib. de remed. par. facult.

Sutura, vide *Commisura* & *Compages*. *Sutura* adhuc dicitur inferior pars penis in longitudinem vergens.

Sycosis, *marisca*, *ficus*, *ficatio*, est tumor à fici similitudine sic dictus, ulcerosus, rotundus, subdurus, rubicundus, dolorificus, ex quo aliquando exiguum, & glutinosum quid egreditur, tum in barba maxime exorians, aliquando humidum & inaequale & graueolens præcipue in capillo proueniens, & semper fici similitudinem fert, & carnis excrecentiam. Interdum in mento fit, ab humore non solum crasso, sed etiam particeps serosa & tenuis humiditatis, qua exulceratur, eoq; differt ab *Iontho*. Nasci-
tur & in ano, sola magnitudine à *Thymo* differens. Latini *Mariscam* appellant, quam aliqui dicunt esse ficum præ pinguedine hiantem, semeng; ostentantem, dicitur & *ficatio*, 2. metb. 2. & 10. simpl. Appellatur etiam *Sycosis* interioris palpebræ duræ, & asperior scissura, com. 2. in 6. de morb. vulg. 4. & lib. de ocul. cap. 9.

Sycota, i. *ficata*, ex caricarum esu appellantur, tum ma-
xima,

xima, tum suauissima iecmore ipso, ut liquet, ex dulcissime
esu alimentum uberius accipiente, 3. acut. 11. *lib. 1. p. 982*

Syderatio, seu sideratio, est corruptio solidorum corpo-
rum omnis, ut ipsis quoque ossibus insit, ne dum carni-
bus, aut vasibus, quo differt à Gangræna, quæ est mortifica-
tio solidorum corporum, non ossium. *lib. de tumor. cap. 11.*
quam syderationem sphacelon Græci vocant, 7. de anat.
adm cap. 13. Totam substantiæ vniuersi usque parti cor-
ruptionem, syderationem, id est sphacelon, veteres appet-
labant, sed in partibus carnosis, alijs quoque nominibus
eandem vocant; quin ipse Hippocr. tum putridam carnem,
tum marcidam, tum vitiatam dicit, alijsque huiusmodi
nuncupare consuevit; de osse uerò quod in tota substantia
vitiatur, syderationis seu sphaceli nomine uti consuevit,
tale autem vitium ossibus contingit, quando adiacens ca-
ro prauas sanies producit, quibus ipsa madefaciendo cor-
rumpit, 2. de fract. 20. Unde sphacelare, id est corrumpo-
re, & sphacelon, id est Caries, 5. loc. aff. 3. Semisyderatus
autem homo dicitur, qui altera tantum parte dextra aut
sinistra compueruit. *lib. de aqua, aere, & loc. cap. 6. & 4.*
de artic. 17 quæ & sideratio. *par. 7. 22. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

Symmetria, id est temperies & contemperatura, est de-
bita conuenientia, & proportio inter se tum similarium
partium, in calido, frigido, humido, & siccò, tum instru-
mentalium in compositione, numero, magnitudine, figura,
1. de sanit. tuen. cap. 1. *lib. 1. p. 982*

Symmetrum absolutè est, quod nulli collatum, medium,
mediocreg; in omni temperie primarum tum actiuarum,
tum passiuarum qualitatem, secundariumq; constituitur,
tale & Eusarcon, & Quadratum est; non absolutè uerò
symmetrum, quod in aliqua specie vel genere tale est, ut
ad ipsius accessum vel recessum, aliquid temperatum, vel

intemperatum dicatur, 1. de temp. cap. 6. symmetrum vero medicamentum est, & quod sit similis temperamenti cum eo cui admouetur, & mediū sit temperamenti omnium primarum qualitatum, 5. simplic. 27.

Sympaschin, est per consensum, seu per viciniam, affici. quoties pars aliqua, non proprio affectu, sed alieno afficitur, primo loc. aff. 6.

Sympathia est affectio compatiens alteri cuidam primo patienti, vel propter vicinitatem, vel propter societatem, quę in ea sunt partium, com. 1. in 1. prorrhet. 20. vide Idiopathia.

Sympepsis est concoctio, qua natura crassis & crudis humoribus, & concoctu difficilioribus, siue etiam per abscēsum providet, veluti calidioribus & tenuioribus per excretionem, 3. progn. 23.

Symphysis est naturalis ossium unio, vel quando duo ossa sibi inuicem coalescunt, veluti fungosiora, mollioraque sunt, vel quando alia aliorum interuentu connascentur, ut sunt ficciora, & densiora, vel media cartilagine, & dicitur Synchondrosis, vel medijs nervis, & dicitur Synneurosis, vel media carne, & dicitur syssarcosis, lib. de ossib. in proœmio.

Symptoma (quod & passio & pathos & pathema, & Epigenema, quasi supergenium, vel supergenitum dixeris, appellant) generatim nominatur, quicquid animali præter naturam incidit, ita ut tum morbi ipsi, tum morborum causa, quę scilicet intra corpus subsistunt, non quę extra habentur, symptomata sint; Altera verò significatione ac magis propria; detractis tum morbis, tum eorum causis, reliqua omnia, quę præter naturam sunt, symptomata nominantur, lib. de sympt. differ. cap. 1. & cap. 2.

Symptomasis affectus est, quo meatus qui à Basi Cerebri

bri veniens, oculo videndi facultatem tribuit, ex atrophia, vel resolutione fit arctior, conciditq; lib. Introd. cap. 15.

Symuenicos, idem est ac *accidens*; apud Philosophos *accidens* id est, quod è regione substantiæ diuiditur, sed à medicis tum maxime Gal. 1. meth. distinguitur ex aduerso symptomatis, quæ. n. inquit constitutionem unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis *symuenicos*, i. *accidentia*, egrotantibus symptomata nuncupantur. *Accidentium* autem differentias 2. meth. tres constituit, sunt enim vel ut affectus, vel ut actiones, vel ut passionis, quorum etiam hæc exempla ponit, in ambulare, uricædi, album aut nigrum esse; ita ut id ex accidenti dicatur fieri, quod nec primum, nec per se, sit quod exemplo calculorum motorum declarat Galen. lib. de differ. sympt.

Synanche, vide *Cynanche*.

Synarthrosis, vide *Articulus*.

Synatia, vide *Continentis causa*.

Synceras deiectiones vocat Hippoc. impermixtas aquosæ humiditati, quoniam solus humor euacuatus deiecitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri colorem præferens siue bilis quæ gruginosa nominatur, nam deiectiones huiusmodi, exactam esse omnem nativam humiditatem à calore febrili demonstrant, 7. apbor. 6.

Synchondrosis, vide *Symphisis*.

Synchisis est oculi vitium, confusis secum eius humoribus, id quod accidit, ut plurimum ex vehementi plaga, interdum verò & ex Vneatunica inflammatione, ruptis eius vasis, effusoque humore.

Syncomistos panis vide *Autopyrus*.

Syncope est præceps virium lapsus, 12. meth. 5. quem virium lapsum duo præcipua symptomata consequuntur, exsoluto quidem nativo calore, frigiditas totius corporis, digesta

digesta verò solidorum corporum substantia, sudor quem Medici syncopticon, & diaphoreticum appellant; ex quibus pulsus defectio, & sensus motusq; priuatio, consequuntur: Differatq; à lipopsychia et lipothymia, quod licet utraq; affectio affatim & confertim fiat, in syncope tamè plurimus subsequutus sudor diaphoreticus, languidiores vires reddit, qui cū aut nullus, aut modicus sit in exolutione, lipopsychia, et lipothymia, minorē noxā virib. accumulatur.

Syncretica, hoc est, relaxantia medicamenta, à coagmēto sic dicta, 2. de anat. adm. cap. 1.

Syncrimata, i. corporum simplicium & elementorum compositiones seu concretiones, de differ. morb. cap. 5.

Syncrasis, idest, concretio & temperamentum, libro de marc. cap. 4.

Syndesmi, idest ligamenta, sensus expertia, ex offortum ducentia, (non ex Cerebro aut spinali medulla) rotunda alba & exanguia, cavitare carentia, in fibras diuisa, 6. meth. 4. vide Ligamentum.

Syndrome concursus est, & congressus symptomatum, lib. finit. Pletorica autē syndrome, est omnium humorum concursus; Syndrome autem pathognomonica, est concursus symptomatum morbum indicantium, lib. de cur. rat. per sang. cap. 9.

Synneurosis, vide Symphisis.

Synocha, hoc est, continens febris est, cuius uniuersum tempus una accessio est, quæ vel semper in eodem vigore consistit, vel minuitur, vel augetur, donec iudicetur; quæcunq; enim per circuitus al. quos, egritudinis accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ s. membra vel mittunt vel suscipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates, sed quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars quæ præcipue sit lasa; sed qui

in venis & arterijs omnibus continentur humores. atque
 ij præsertim qui in maximis, atque plurimo calore abun-
 dantibus sunt, aut ob aliam quamvis causam, ut in Ephe-
 meris, aut ob putrefactionem feruentes febrem unam ac-
 cendunt, Synocham appellatam, quæ à principio usque ad
 finem nullam habet intermissionem, ac tamdiu perseue-
 rat, hominemq; deurit, donec quæ ei causam afferunt hu-
 mores, aut ex toto absumentur, aut coquantur, aut verūq;
 patiantur, 2. de differ. febr. quæ & synochus putrida, deu-
 rens, ardens, Causon, succensa appellatur, 2. de cris. cap. 6.
 vide Continua, & Febrem Synochon.

Synochus, i. cōtinens febris, quartū februm genus enu-
 meratur, quod quia ex sui natura ultra tertium diem ex-
 tenditur, nec humorem putrescentem habeat, nec febrilem
 calorem ut habitum possideat, propterea nec diaria, nec
 putrida, nec hectica dici potest, sed uel diaria pluriū die-
 rum, uel synochus non putrida, uel synochus conclusa me-
 rito appellari potest; quam febrem uel conuiuentia mea-
 tum, uel recens corporum densatio excitat, 9. meth. 1.

Synodontes, uide Hiatuli.

Synonima, i. Vniuoca, quæ inter se communicantia, ab
 uno factam denominationem habent, 4. acut. 23.

Synopsis, i. compendium lib. de nervor. diff. c. 17.

Syntaxis, idest mutua compositio, & connexio, i. de
 usu par. 14.

Syntaxis, distentio, opposita est laxitati, utraque & in
 cute & in articulis contingens, aut resiccatis, aut perfri-
 geratis, aut inflammatis, aut induratis, in cute uero non
 his tantum modis, sed etiam ubi musculi intra ipsam,
 quouis modo augeantur, tum maxime ex carnis copia &
 abundantia, ut in utre pleno aqua, & Tympania, quod
 Gal. in pluribus libris Methodi testatur.

Synte

Syntexis, Colliquatio uide *Febris colliquativa*.

Synthesis, est offium inter se compositio, qualiscunque ea sit, est enim uniuersigenetis nomen, quam alys quoque nominibus uocari tradit *Galenus*, *Syntaxin*, scilicet, & *Homiliam*, lib. de offib.

Synulotica medicamina sunt, quæ ulceribus cicatricem inducunt, 13. meth. cap. 5.

Syphon, uide *Mesenchryta*.

Syngomata, instrumenta sunt, quæ ad fistulas incidendas sunt comparata, 6. meth. 4.

Syræon, uide *Sapa*.

Syrinx, idest fistula, tubulus est callosus, angustus, oblongus, interdum etiam obliquus, os habens cui cicatrix obduci nequit, per quod humor statim temporibus tenuis excernitur, quarum alia cæca uocantur, quæ osculum in profundo, sinum ad superficiem habent, alia occulta, quæ & os & sinum obtinent in profundo, lib. finit. uide *Fistula*.

Syssarcosis, uide *Symphisis*.

Systematica inequalitas, est congregatio multarum inequalitatum. & pulsus ex cumulo multarum pulsationum consurgens, 4. loc. aff. 8.

Systole est submissio pulsus, 1. de differen. febr. capitu. 7. (dicitur etiam *Systole* & *Diastole*, idest constrictio, & dilatatio, de motibus thoracis & pulmonis, libr. de uocal. inst. diff. cap. 2.) quo motu facultas fuliginosa excrementa expellit & repurgat, atque ita refrigerium calori natino molitur.

Systrophe, *Phyma* & *Schleria*, hoc est tuberculū & durities, ut exponit *Gal.* in linguis *Hipp.* quam, 4. acut. scribit esse eam quæ a partibus excitatur intumescens, &

TABES, quæ Phthisis Græce communiter appellatur, est ulceratio pulmonis, vel Thoracis, vel faucium, & tussicula, & debiles comittentur febres, & corpus conficiatur, libr. finit. Nominaturq; etiam Tabes, alicuius corporis particulæ præter naturam diminutio, siue ea in prima formatione huiusmodi appareat, siue post, eademq; eiusdem particulæ atrophiam uocant, de diff. morb. cap. 9. vide ex ægritudine senectus, & Phthisis.

Tabes oculi, quæ & Rhetidosis dicitur, est solius imminutæ pupillæ corrugatio, incidentibus alijs super alias rugis, quod spiritus parcius à primo Cerebri principio, quam pro natura deberet, affluat; differens à Tabe oculi senum, quæ est corrugatio corneæ tunice, & pupillæ angustia, tamen ab imbecillitate senectutis, ex defectu humoris tenuis quo repletur, tum ex spiritus superne affluentis inopia, 10. de usup. 5. 3. aph. 16. (mus.

Tabida febris, uide ex ægritudine senectus, & Maras.

Tabidos appellant veteres medici, qui morbo tabifico quem Phthoen uocant sunt opportuni. Tales plenissime sunt, qui adeo sunt angusto thorace, & restricto, ut à tergo in morem alarum promineant aperta scoptula, unde hos etiam Pterigodes, i. alatos uocant; Præterea quibus caput facile impletur, quodque spiritus organis multas distillationes dimittit, hi facile tabescunt, com. 1. in 1. de morb. vulg. 18.

Talpa, & Testudo, sunt affectus cutis capitis proprii quæ nomina recentiores addiderunt, cum penes antiquos hi affectus, neque nomen, neque tractationem inuenerint. Testudo autem Guidoni, abscessus est magnus mollis, humoralis, latiore forma, in modum testudinis, unde nomen accepit, quæ si in capite nascatur talparia, uel talpa dicitur;

tur; in collo, bocium, in testiculis, bernia; interdum autem cum pure, squamis, uel fistulis reperitur, reponitur sub abscessuum genere, subq; meliceride potius quàm atheromate. Talpa uerò, cum albam materiam contineat, ad atheromata potius quàm meliceridem refertur. Bocium uerò vulgus vocat, mollem, & laxum tumorem in exteriori, gutturs parte, quam Græci Bronchocele nostri berniâ gutturis, & eo affectos gutturosos uocant. Est autem colli tumor grandis, & rotundus inter cutem, & asperam arteriam, in quo, modo caro hebes, modo humor aliquis, meli, adipi, pultri, aqueuè similis includitur. Huic similis affectus est, quem Guido uocat Natâ, seu Naptam, quæ est exerescentia magna, carnosâ, ueluti caro Natium, uel anchorum, diuersarum quidem formarum, & magnitudinum, cuiusmodi sunt melopepon & cucurbita.

Talus non idem est ac malleolus, sed talus est os sub malleolis contentum, unde quaque contectum, quod ne tangere quidem possis, lib. de ossib. cap. 22.

Taraxis, seu Conturbatio, est cum oculus leniter, ac mediocriter commotus, tandem rubicundior euadit, lib. Introd. cap. 15. quem Paulus definit, esse humiditatem & caliditatem oculi cum rubore præter naturam, à causa externa inductam, ut Sole, fumo, puluere, oleo; quò differt ab ophthalmia, quæ causam tantum internam agnoscit, Paul. lib. 3. cap. 22.

Tardus pulsus est cum longo tempore, arteria distenditur, 1. de diff. puls. cap. 7.

Tarson, uide Pedion.

Tarsus oculi, est substantia quadam membrana durior, ac tensa, qua parte Periostios oculi tunica remeare ad corneam incipit, tenuibus quidem pertusa foraminibus, ex quibus palpebrarum pili emicant propter suâ driti-

ex ciliens in reſtitutionem palpebras, 10. uſu p. uide Cilla
Tarsus eſt inferior. Colis pars. in longitudinem eius uer
 gens, uſque ad ſedem porrecta, lib. Introd. cap. 10.

Tela aranea, uide Rhagois.

Telephia, & *Chironia* ulcera dicuntur inueterata, &
 quæ uix curam recipiunt, cicatricemque difficillime con
 trahunt, ſic dicta quod Chirone medicina peritiſſimo ad ſa
 nationem indigeant, uide *Chironia*.

Telma, ideſt ſolidum, & tenſum, durumque ac pilis
 etiam nudum facileque ſentiens, pedis veſtigium, lib. de
 muſc. diſſ. cap. 33.

Temperies, uide *Symmetria*.

Tempora, Κροτάροι appelluntur partes ad utroque ſyn
 cipitis latere ſupra aures ſita, lib. Introd. cap. 10.

Tempora morborum talis res morbi ſunt, qualis ani
 malibus differentia ſecundum ætates, neque enim tempus
 ſimpliciter hoc uocabulo ſignificatur, neque conueniens il
 lud tempus in quo præſidia etiam conſideramus, ſed tan
 tum morborum ætas, quæ temporum uiciſſitudine immu
 tatur, ut animal ætatibus, lib. de morb. temp. cap. 1.

Temporales futura, uide *Lepidoides*.

Tēporales muſculi, uide *Crotaphitæ* & *Mandibularij*.

Tendones, ſiæes ſunt eorum muſculorum, quos pro ner
 uationes, ideſt, aponeuroſis uocant, qui quidem medijs par
 tibus ſunt neruoſiores, inter ſe tamen in eo differunt, quod
 aliquando minus, uel carnoſa uel neruoſa ſubſtantia in ſe
 habent; quando ſane carnis ſubſtantia in eſt amplior, car
 noſam pro nervationem, quando parciore neruoſam appel
 lant, 2. de artic. 5.

Teneſmus eſt continua & implacabilis deſidendi cupi
 ditas, qua nihil præter cruenta pauca, & mucoſa egeritur;
 quæ affectio aliquando tenſio, & tenſio appellatur, quoniã in

ea fit in recto intestino tentio quam cum deſcere vehementer homines appetant, continuo exurgunt, 7. aph. 27. Tentio item, aliquando tractum corporis ſignificat lib. ſinit.

Tenor apud Hippo. eſt idem quod ueruus intentus, 1. de placit. 9. & 1. de artic. 47.

Tenſio, uide Tenefmus.

Tenſius dolor eſt, qui extensionis ſenſum inducit, 3. loc. aff. 9. Vnde tenſius laſſitudo, qua & phlegmonofa eſt, 7. de comp med. loc. cap. 1. uide Dolor triſtis.

Tentigo, uide Priapiſmus.

Tenue inteſtinum eſt tertium in ordine, ieiuno inteſtini ſubſtantia ſimile; differt autem, quod neque uacuum reperiatur, neque tot uaiſis, & inuolucris ſcateat, 6, de anat. atm. cap. 9. quod & Ileon & Inuolutum appellatur, lib. de anat. viii.

Tenuia appellantur medicamenta, qua facile in tenues comminui partes poſſunt, Leptomeri Græce; craſſa qua contra, Parimeri appellata, 1. ſimpl. 3.

Tennis pulſus, uide Gracilis.

Terebella, uide Abaptiſta.

Teredo, Teredon, ſiue Terdo, eſt caries in oſſe, 3. method. primo.

Teretes lumbrici ſunt, palmi longitudine, vel etiam maiore, ad ſtomachum uſque proſerpentes uermes, lib. Introd. cap. 13.

Tergum, Νότον Græce, ſunt poſteriores corporis partes, quæ collo ſubiacent, ſcapulis, dorſo, ſpina, & lumbis conſtans, lib. Introd. cap. 10.

Terra Argyrite, uide Argyrite terra.

Terra medicaminoſa, quod aqua irrigata, facile in lutum ſoluitur, terra appellatur; quia uero ea utimur uelut alijs medicamentis, idcirco non iniuria Pharmaceutis, Lar-

tine sola medicaminosa uocatur , nempe quia sola est eiusm. di , ut euidentiore uim medicaminosam possideat , 9. simplic.

Terræ intestina, Gifentera Græcè, idest , Lumbrici terrestres, 11. simplic.

Tertiana simpliciter , est tertiana intermittens, contingit enim hanc ipsam sine aliqua adiectione tertianam simpliciter ita nominare, quæadmodum, & quotidiana intermittens, quotidiana simpliciter appellatur , 2. de diff. feb. cap. 7. Earum febrium intermittentium , quæ tertia quodque die accessionem faciunt , quæ quidem breue habent accessionis tempus (quod duodecim horarum æquinoctialium spatio ad summum finitur , 2. de differ. feb. cap. 3.) ac cum rigore innadunt, & per sudores & bilis vomitum, & biliosa excrementa finiuntur, his tertianæ exquisitæ nomen impositum est , quibus uerò aliquid horum deficit, hænon exquisitæ , sed simpliciter tertianæ appellantur ; quod si intermissionem minorem habuerint, accessione uidelicet in longius tempus protracta, hæ tertianæ extensa vocantur, 2. de diff. feb. cap. 8. Exquisita uerò tertiana est, quæ sui ipsius naturam puram, synceramque seruat, idest, flauam bilem redundantem , & motam tempus æstiuum, locum calidum & siccum , hominis ætatem, & temperiem similem, 4. aph. 59.

Tertianus circuitus, uide Quotidianus.

Testes, testiculi ὀρχις, sunt corpora duo glandulosa, alba mollia, rara, laxa, cauernosa, rotunda, seminis & generationis principium , quæ quod duo sint, diducui appellantur, quos Gal. 3. aliment. fac. glandibus annumerauit ; quæ in maribus extra membranam abdominis sunt, & propendent musculis, quos ἀπὸ τῆς σπινθῆρος uocant; mulieribus intus latent à lateribus uteri, frigidiore minores, & imperfectiores

Et oves quædam marium, 14. de usu. cap. 10.

Tesludo, vide Camariou. Fornices, Talpa.

Tetanos, rigor, distentio nervorum; est convulsio perpetua totius corporis rigidi, & in neutram partem se inclinantis, contractis ad suum principium nervis, & musculis. quib. caput annuit, renuit, circumagitur, æqualiterque ante & retro tensis, Gal. lib. de musc. dist. vide Distentio.

Tetrastapharmacum medicamentum est, quod ex cera, adipe, resina, pice, æqua omnium portione constat. Aduersus Lycum, cap. 7.

Thele, papilla, mamma capitulum est, unde infans lac sugit, medium in mamma protuberans, quam ambit circulus quidam subniger, qui omnis appellatur.

*Thenara propriè vocant prominentes uolæ manus partes, à verbo *θετερον*, quod est verberare, ut nō nulli uolunt qui Etymologis gaudent; quippe cum his prominentibus partibus percutere solcamus ea quæ percutimus; alii non omnes partes prominentes palmæ ita appellari aiunt; sed solas eas quæ sub pallicibus extant, 1. de fract. 20.*

Therapeutice, id est, medendi methodus, 7. de composit. med. per gen. cap. 1. quæ & Curationia dicitur.

Theriacam appellantur Crito, & eum sequenti, quod vi-peræ carnes acciperet; Andromæchus uerò, qui primus illam composuit, Galenem, hoc est tranquillam, lib. de usu Theriac. ad Pamp. prope finem.

Therionia, teterrimum ulcus est, tum ex se nascens, tum alteri superueniens, ut refert Celsus, colore limidum, nigrum, odore fædum, multo mucoso humore repletum, quod inflammatio, febris, prurigo & dolor comitantur, à quo sanguis interdum fluit, serpit & exedit, atque ob id aliqui herpetem exedentem, vocant, aliqui dicunt idem esse cum Carcinomate, quod Gal. com. 2. in 6. Epid. dicit in solo pul-

monē

mane generari, alij in quacunque corporis parte.

Thermantica, calfactoria medicamenta sunt, quæ suo calore omnem perfrictionem, & stricturam calefaciunt, lib. de Dynam. in præmio.

Therminthi nomen, nigras quasdam pustulas in cruribus maximè orientes significat, à figura, coloris, magnitudinisque similitudine quam cum *Therminthorum*, idest, cicerum fructu habent, derivatum com. 3. in 6. de morb. vulg. 37.

Thlasma, quæ & *Thlasis* dicitur, vide *Rhegma*, & *Vitionis* solutio.

Thlypsis, vide *Epiparoxine*ste.

Thoracem consueverunt Medici appellare, totum illud corporis spatium, quod duodecim costis, utrinque circumscribitur, pertinetque anteriore quidem parte ad pectus, & ale os, ac septum transversum, declinat uerò posteriore ad spinam duodecim vertebris, ac reflectitur, lib. de ossib. cap. 13 & 6. de usu p. cap. 2.

Thorexin nominare consuevit Hippocr. vini potionem, 2. aphor. 21.

Thrombos sanguinis grumus est, seu sanguis concretus, 5. meth. 8.

Thrombosis est dum lac grumescit in mammis, & in casei formam transit; grumescentiam lactis interpretes nonnulli uocant.

Thymiana hoc est suffumigium, quod ex moderate adstringentibus resiccantibus, ac discutientibus uitiosos, & serosos humores, & corrigentibus humorum malitiâ, & contrariam uim habentibus aduersus putrefactiones quorum plurima ex aromatum sylua habentur, constat, 8. de camp. med. loc. cap. 7.

Thymus, asperæ carnis extuberatio est, quæ similis circa

circa genitale, ac sedem oritur lib. finit. & 14. metho. 13.
 Est & tumor præter naturam, uide Epulides. Est & Thy-
 mus idem quod Glandium, seu Aden, seu Glandula, uide
 Aden, Glandula, uelut alij Thyms carnosæ est excre-
 scens, nunc in Glande, nunc in præputio, nunc in ipsa sede con-
 sistens, sic dictus; quod Corymbis Thymi sit similis. Thy-
 morum autem alij mites, alij maligni; Mites sunt exigui,
 scabri, candidi, dolore carentes; feri autem ampliores, sca-
 briores, liuidi, dolorifici.

Thyreoides cartilago uide sentiformis, & Cricoides.

Thyroides, est ossis pubis foramen ab ostii similitudi-
 ne, sic appellatum, 3. de anat. adm. cap. 13.

Tibia est tota cruris pars, inter talum, genuque posita,
 in interiori parte sita, cuius tibia pars anterior tenuis, &
 carnis experta, Ocrea appellatur, lib. de ossib. capit. 22. Ea-
 demque infra genu Anticnemion, (Latinis Crea) 2. de a-
 nat. adm. cap. 4. posterior Carnosa pars Sura, & Gastroc-
 nemion, 16. de usu p. cap. 8.

Tilmata, i. uulSIONES factæ in fibris musculorum, dū ni-
 mis discentæ interdum rumpuntur, 4. de uis, quæ in medic.

Titillatio oculorum, uide Mollities.

Toma pro phlebotomia usurpatum, 2. de nat. hum. 9.

Tomæ dentes, id est Incisarii, dicuntur quatuor primi an-
 teriores, ad cultri similitudinem, ad eos cibos incidendos,
 qui mollitiem in se habent; sicuti ad dura. confringenda,
 alij utrinque proximi constituentur; ceteri omnes dentes
 molares, siue maxillares appellantur, lib. de ossib. capit. 4.
 quos etiam Mylas, id est, Molas uocant, 11. de usu par.
 capit. 8.

Tonica, siue Tonotica medicamenta sunt quæ extrinse-
 cus illiniuntur, robur particula læ & inferetia, 13. met. c. 22.

Tonitus motus est, qui exercetur a corpore laborante

Tetano,

Tetano, duabus contrarijs virtutibus oppositorum muscutorum inter se pugnantibus, 1. de motu musc. cap. 8.

Tonos, idest, nervus, nuncupatur ab ipsis operationibus, unum instrumentum duobus nominibus; eo quod nervus neuin, hoc est mutare. seu flectere, & tonos tinin, hoc est tendere, natum est, 1. de motu musc. capitu. 1. vide **Nervus**.

Tonsillæ, vide **Isthmus**, **Vua**, **Paristhmia**.

Tophus, vide **Callus**.

Topica remedia, idest localia, 13. meth. c. 22. quæ loco affecto non prius applicari debent, quam totum prius corpus purgetur; ne his irritato affectu, plus etiam affluat ad membrum læsum, vitiosi sueci, lib. de remed. par. fac. cap. 6.

Torcular, siue **Linon**, est locus quidam vacuus, quasi **Cisterna** in vertice capitis, in quem meningis duplicationes sanguinem deducunt, unde velut ab arce quadam, omnibus subiectis partibus, sanguinis riui mittuntur, 9. de usu par. cap. 6. & 9. de anat. adm. cap. 1.

Torminam, idest **Dysenteria** vocabulum, non pro vlcere ratione intestinorum, ut plerique medici solent, sed pro cruenta ex intestinis proluvie sumit Hipp. ut etiam quando ex Iecoris imbecillitate cruenta deijciuntur, affectio ea torminum nomine appelletur, id quod & fieri, & dici a Medicis quoq; videtur, 4. de art. 40. sunt autem tormina, & propter morsum vehementem, & propter spiritum flatuosum, qui non habet exitum, sed in intestinorum inuolucris est interceptus, 4. aph. 11. vide **Dysenteria**.

Torpor est motus & sensus difficultas in toto corpore, & maxime in artubus à frigore, & compressione nervorum corporum incidens, 1. de caus. symp. cap. 5. aliquando torpor significat, ventriculi in-concoquendis cibis imbecillitatem, com. 3. in 6. de morb. vulg. 1.

Tor-

Tortio est cum artipulus quidem est illæsus, sed nervos & circa ipsum partes tortæ sunt, id quod maxime in ijs contingit, quorum in vacuum gressus dilabitur, 3. de ijs quæ in med. 31.

Toxica, hoc est venena, quæ mortem inferunt, libr. de Dynam.

Thracea, id est, aspera medicamenta, quæ suffocata loca ulcerant, & exasperant, lib. de Dynamid. in præmio.

Trachea arteria, vide Aspera arteria.

Trachoma, altera est species scabiei palpebrarum, aspera, dolorem & gravitatem faciens, in oculis humiditatem generans, lib. de ocul. par. 4. cap. 9. Inde Trachomata appellantur, quæ hanc asperitatem detergunt, 14. meth. 19. Hinc τραχὺς, asperitas, quæ est vitiosa confirmatio parti cui accidit, inæqualitatem absumpto humore inducens, opposita affectio leuitati, quæ sunt duo prima morborum genera in formatione sita.

Treductio, est diducti ossis in naturalem statum reuocatio, lib. finit.

Tragemata sunt ea quæ post cenam, voluptatis inter bibendum excitandæ gratiæ, & ad dulcorandum, assumuntur, 1. de alim. fac. 34.

Transpiratio, seu Perspiratio, est insensibilis per poros perflatus, 1. de sanit. tue. cap. 12. vide Inspiratio.

Translativus motus, vide Metalepticus.

Transumptivus motus, quem Metalepticum vocant, quo in machinis utuntur plurimi, tum architecti, qui mechanici dicuntur, tum medici, qui organici nuncupantur, qualem notum natura musculis conciliauit, quoniam nervorum eorum principio ad Cerebrum appenso, quando ratio vult tanquam habenis quibusdam musculos laryngis intendere, motus qui à principio profisciscitur à superiori loco

locoper totum collum fertur deorsum, ad multam usque thoracis partem, indeq; rursus redit usque ad laryngem, ubi nervis in prædictos musculos insertis, quasi à manibus quibusdam singuli muscoli deorsum trahuntur, 7. de usu par. 14.

Traulotes, Latinis Blasitas nominatur, qui hac passione correpti sunt, τραυλοι Græcis, Blēsi uerò Latinis dicuntur, & sunt qui aliquam certam literam exprimere non valent.

Tremor, vide Palpitatio.

Tremor oculorum, vide Mollities.

Trichiasis, i. capillitium, morbus est in quo cum crassa urina, veluti capilli una exeant, 4. apho. 76. Adhæc Trichiasis est affectio, in qua pili inutiles, & pungentes palpebris enascuntur, 4. de comp. med. loc. cap. 8.

Triens, hoc est uncie quatuor, 4. de compos. medic. per loc. cap. 8.

Triglochina, siue Trisulca figura est, qua quinque membranis Cordis, tribus dextera parte duabus sinistra, similes in figura triangulari, & colorum cuspidi assimilatur, 7. de anat. adm. cap. 7.

Trigona medicamenta sunt, ex seminibus composita, quæ sicut ad torporem inducendum in præsens mitiora, ita in futurum sunt tutiora; adque hæc quoq; omnia, utilius annotina sumuntur, 12. meth. cap. 1.

Trismos siue Trysmos, id est stridor, est convulsio musculorum mandibularum, ex qua fit dentium inuita confusio, 2. de caus. sympt. cap. 2.

Trisulca, vide Triglochina.

Tritæophyes (quæ & Tritæus) febris, hoc est tertiana naturam sapiens nominabitur, quæ tertia die exasperatur, & ferme in integritatem remittitur, sed si quæ febris, tertio

tertio quoque die exacerbatur, neque per minimum inter-
uallum ita mitefeat, ut in eo febricitans propè sinceram
integritatem esse uideatur, hanc si quis triaophyes nãre
velit, forsan, & ipse non sine ratione in hanc sententiam
deiscendere uidebitur, com. 2. in 6. de morb. vulg. 23.

Tritaus, uide Tritaophyes.

Trius, Græce Τριος, apud Hipp. significat eam corpo-
ris partem cui siue stantes, siue ambulantes, siue sedētes,
siue iacentes, innitimur, ut stantibus nobis atque ambulan-
tibus, plantæ pedum, nates sedentibus, spina supinis, cubi-
to innitentibus, cubitus, 2. de his quæ in medic.

Trochantera, quod & tuberculum, magni ossis femoris
processum uocant, 2. de anat. adm. cap. 6. & lib. de ossib. ca.
21. uide Femur.

Trochlea brachii, uide Bathmides.

Trociscos, uide Pastillos.

Tromata, hoc est ictus, nominat Hipp. magnas noxas
ab aliquo extrinseco, etiam sine vulnere illatas, com. 5. in
6. de morb. vulg. 12.

Tromoi, id est tremor, 2. meth. 2.

Trypsin, uide Anatriypsin.

Trysmos, uide Trismos.

Tubercula, sunt quadam sponte nascentes, & celerri-
me facta inflammationes, quæ celerrime in alium attollun-
tur acumen, & celerrime suppurantur, & plurima horum
in inguinibus & alis est generatio, quoniam in his parti-
bus plene sunt adenes, qui apti natura sunt ad has super-
fluitates prompte excipiendas, 3. aphor. 26. Tuberculum
adhuc & Phyma nominat Hippoc. quod in aliis ipse soli-
tus est uocare suppurationem, Græce Emphyema, 7. aph.
8. de tumor. cap. 15.

Tumor, uide Oncos.

Tuni-

Tunicarum nomine, quidam sola composita operimēta dignantur; alij autem crassa, alii nisi composita simul & crassa extiterint, eis appellationem hanc non tribuunt; Ad eundem autem modum, & de membranis litigant; quibusdam enim simplicitas sufficit, aliis autem tenuitas, alii ambobus opus esse arbitrantur, ut ita nominentur, & nisi tenue fuerit simul. & simplex operimentum, id volunt vocare membranam; At antiqui certē, tunicas, membranas, meningas, præter hæc omnia eiusmodi uocant, quos nos quoque sequentes, à vana quidem in nominibus garrulitate, discedemus, 4. de usu p. cap. 9.

Tunicæ cordis sunt corpora tegentia extrinsecus utrumque uentriculum cordis. 6. de usu p. cap. 8.

Turgere, verbum est translatum ab animalibus concubitum appetentibus, ad humores, nam sicuti illa stare loco non possunt quadam titillatione impulsæ, eoque affectu concitata, sic & humores plerumque in motu vehementiore, atque transfluxu à partibus ad partes in morbi principio hominem infestant, mouentes, titillantes, & quiescere non permittentes, cum & ipsi pariter moueantur, & transfluant, & tanta latione egrum molestant; Tales sunt humores turgentes, qui sunt in motu, latione, & fluxu, 1. apho. 22.

Turgidus dolor est, qui à parte primario affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur, 2. loc. aff. 7.

Turgidus pulsus, uide Gracilis.

Tussis, est uehementissima quadam efflatio qua plurimus simul, celerrimeque foras ætus spiritus attrahat, propellatque suo impetu, quæ uias suas obstruunt. 2. de sympt. caus. 4. Cum enim externus aer in asperas arterias trahatur, quæ chartilagineæ duræque sunt, nec contrahi

circa

circa id quod continent, possunt, incitatum hunc excogitavit spiritus exitum, quem vocant tussim, quo spiritus sibi ipsi uiolenter, & cum impetu delatus, uias expurgat, non aliter quàm tibiae, & fistulas expurgant harum opifices, 4. de caus. sympt. 3.

Tussis sicca, in qua nihil expuitur, 4. aph. 54.

Tylosis, idest callus; sic autem nuncupatur, cum in palpebris aspritudines ex senectute crassiores, albidiores, & parum sensiles extiterint, eoque minus deteri possunt, lib. Introd. cap. 15.

Tympanias qui & Tympanites, Hydropis est species, in qua spiritus totam thoracis superiorem, & inferiorem regionem, tumentes facit, 4. acut. 111. uide Ascites.

Tynesmus, qui & Tinesmus, & Tenesmus appellatur, est recti intestini uehemens tensio, & prompta deiciendi cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, quæ quidem ab initio pituitosa & pingua, progressu uerò temporis, etiam abrasionis specie deiciuntur; sed per totum morbi spatium, iis quæ à supernis descendunt, haud quaquam misceri uidentur, 6. loc. aff. 2. Atqui Tinesmus ulcus est in recto intestino factum, quod quidem infert symptomata Dysenteriae similia, nixustamen multo uehementiores 3. de symp. caus 2.

Typhodes febres, idest succedentes, ut Causæ des incendentes sunt, quarum media est semitertiana, 1 aphor. 12. uide Febris Typhodes.

Typhomania (quæ & Typhonia) est delirus Lethargus, uel lethargicum delirium lib. finit. quæque Typhomia appellatur, commistus affectus ex lethargo & Phrenitide, lib. de Comat. cap. 2. Ego uerò quoties ad finem usque tum desipientia, tam Coma persistunt, affectione hanc ex phrenitide, & lethargo mistam appello, quidam Typho

maniam uocauerunt, 1. prorrh. 1.

Typus est ordo intentionum & remissionum; periodus sine circuitus est tempus intentionum, ac remissionum in morbis factum, lib. de Typis, c. 2. sine est formula quaedam accessionis, cum uel subsequitur, uel anticipat, 1. cris 3.

Tyria apud Arabes. & barbaram sectantes medicinā, idem est ac Ophiasis, Tyrienim uoce, omnes serpentes, & potissimum Viperas intelligunt.

VACUATIO, Græce κωρίς, Vide Purgatio.

Vacuum pulsus est, huius arteria eleuationem facit bullosam, ut digitorum impressioni egressus, per uacua occurrat, 1. de diff. pul. c. 6.

Vaginalis tunica, uide Elytroide.

Vagina, uide Membrana dura.

Valga appellantur crura, in exteriorem partem uergentia; quæ uerò in interiorem, uara & manca, 3. de his, quæ in med 31.

Vapor, humor est extenuatus, qui pluribus est in spiramentorum raritate, corporis mollitie, substantia fusione, 1. simpl. 8.

Varices, siue Cirsi, uenas omnes dilatatas antiqui appellabant, lib. de tumor. 1. 6. Varices, sunt uenæ latiores in coxis & testiculis & cruribus, quæ ex crasso, & melancholico sanguine contingunt, ad eò ut pellente natura ad partes ignobiliores, humores crassos, & melancholicos, diuturnarum passionum generatio sequatur, 6. apud 21.

Variciformis flexus, uide Flexus uariciformis.

Varicosum parastata, uide Glandulosi assistentes.

Varicosus assistens, uide Genitalis, Glandulosi assistentes, & Meatus genitalis.

Varicosus meatus, uide Genitalis.

Varus,

Varus, exiguus durusq; tumor est in faciei cute obor-
tus Græcè *lanthos*, qui differt à *ficosis* tumoribus in men-
to prouenientibus, non solum quod ex crasso humore con-
sistat, Verum etiam quod participet tenui quadam sanie,
ratione cuius facile ulceratur, non rectè atque ex arte cu-
ratus lib. de remed. par. fac. cap. 11. vide *lanthos*, & *Fico-*
sus tumor.

Vasa deferentia, uide *Glandulosi* assistentes.

Vasa spermatica, *Seminaria*, quæ vulgo *proparantia*
appellantur, uide *Glandulosi* assistentes.

Veemens pulsus, siue *Validus*, & *Fortis*, est qui vio-
lenter tactum impellit, remissus siue languidus, qui debili-
ter, de puls. ad Tyron. cap. 3. & lib. 3. de differ. puls. c. 5.

Veementia morbi, est ea, quam magnitudinē uocant,
& mos morbi, quem modum appellant, 1. cris. 3.

Vellicationes, seu *discerptiones*, iunioribus medicis ap-
pellantur, *uulsiones*, quæ in fibris musculorum contingunt,
dum nimis intenta interdum rumpuntur, 3. de his quæ
in med. 30.

Vena, ολέη, est uas spermaticum, una constans tunica,
fibris triplicibus contextum, sanguini deferendo destina-
tum; uena etiam nomine, arterias comprehenderunt uete-
res, quo sensu Plato in Timæo uenas à Corde oriri asserit,
ut testatur Gal. 6. de Placit. uide *Arteria*.

Vena arteriosa, uide *Arteria uenosa*.

Vena axillaris, uide *Axillaris uena*.

Vena azygos Græcè, coniugio carens Latine, uulgò ue-
na sine pari, ea est quæ in quibusdam animantibus iuxta
Cor adnascitur, in quibusdam uerò ut in hominibus, ex ea
emergit parte, quæ iam Cordis aurem uena Cava tangit;
Hinc si quidem emergens, humiliter depressiusq; per Cor
desertur, atque in spinam contorquetur, 2. acut. 10.

X 2 Vena

Vena Basilica, vide Axillaris.

Vena capillaris, vide Apanthismos.

Vena capitis, vide Humeraria.

Vena Cava, vide Cava vena.

Vena Cephalica, vide Cephalica vena.

Vena communis, vide Communis vena, et Media vena.

Vena coniugio carens, vide Vena azygos.

Vena coronalis, siue Stephanica, vide vena Peristepha-

Vena, crassa, vide Crassa vena. (nica.

Vena cubiti externa, vide Humeraria.

Vena cubiti interna, vide Axillaris.

Venæ emulgentes, vide Emulgentes vena.

Vena Funis brachij, vide Funis brachij.

Venæ guidez, vide Apopletica.

Venæ Hemorrhoidales, vide Hemorrhagia.

Vena Hepatica, vide Axillaris.

Vena Humeralis, vide Humeraria.

Vena Iecoraria, vide Cava vena.

Vena Ischiadica, vide Ischiadica vena.

Venæ Iugulares, vide Apopleticæ.

Vena lata & magna, hoc est humeralis, l. de artic. 53.

Sicet communiter medici, & anatomici magnam vocent

venam Portæ, sicut Cavam, maximam appellant.

Vena manifesta, vide Manifesta vena.

Vena media, vide Communis.

Venæ meseraica, vide Mesenterium.

Vena nigra, vide Media Cubiti vena.

Vena Peristephatica, est quæ Cor ipsum Coronat, principiumque sui ortus, extra membranas habet, 6. de vsupar. cap. 14.

Vena Poplitis, est ramus medius venæ Caus, qui deorsum ad poplitem fertur, ubi vulgo vena Poplitis dicitur, qui

qui per profundum Suræ procedens, non modicam in musculos eius ramorum sobolem spargit, atque ob id, hæc vena communis, seu media dicitur, quemadmodum in manu, lib. de dissect. ven.

Vena porta, vide Cava vena.

Vena purpurea, vide Communis vena, Media vena.

Vena saluatella, vide Saluatella vena.

Vena saphena, vide Saphena vena.

Vena sine pari, vide Vena azygos.

Vena splenitica, vide Saluatella vena.

Venæ, & arteriæ umbilicales sunt, quæ uteri acetabulis adhærescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & alimentum trahit, 1. de semin.

Veneticos oculos appellant, eos qui suffusione affecti sunt, fiunt autem Venetici oculi duobus modis, vel propter aquam si nimium fuerit coagulata, vel propter siccitatem quam patitur Crystallinus humor, lib. de ocul. par. 4 c. 12.

Ventralis dispositio, vide Celiaca.

Ventrem superiorem veteres appellabant thoracem; alimenti receptaculum omne, quod à septo transverso est, ventrem inferiorem; Interdum autem ventrem superiorē nominabant, in quem cibi assumuntur, quæ ab eo sunt omnia, ventrem superiorem; Interdum quoque & sola quæ crassiora sunt intestina; sunt qui Colon duntaxat, ventrem inferiorem vocant, 4. acut. 112. 7. aphor. 38.

Ventriculus est, in quē primo animalia cibū requirunt, 6 de anat. adm. c. 2. Aliquando ventriculi os, per abusum, pro stomacho sumitur, lib. de cur. rat. per sang. c. 1.

Vermiculans pulsus est, cum species exhibetur, quasi perreptantis arteriam vermis, undarum in modum insurgentis, & non uno tempore arteriæ distentę parvus, languidus & creber. Sin autem non parvitati, sed magni-

tudini sit adiunctus, dicitur *Vndosus*; si ad extremam deveniat remissionem, crebritatem, & parvitatem, formicans dicitur, de Puls. ad Tyronem, cap. 8. & 1. de differ. puls. 26. & 27.

Vermiformis excrescentia, sine *Epiphysis*, vide *Vermis Cerebri*.

Vermis Cerebri, est obstaculum quodam, quod habet porta, qua à medio Cerebri ventriculo, ad posteriorem itur, cuius forma est sicut pinea, lib. de ocul. par. 2. cap. 2. Quin' particula quadam Cerebri, incumbit meatui qui est à Cerebro ad Cerebellum, quæ circumscriptionem obtinet figura vermi similem, in lignis enascenti; Hinc etiam nomen *Anatomici* inuenerunt excrescentiam vermiformem, corpus hoc, quod totum meatum contegit, vocantes, 9. de anat. adm. 5. diciturque vermiformis epiphysis 8. de vsu par. c. 14.

Vernaculus morbus, vide *Endemus*, & *Communis*.
Verricularis, vide *Amphiblastroide*.

Verrucosa, vide *Dulcia ulcera*.

Vertex Capitis, (*Græcè Κόρυς*) in media capitis regione sinciput superante, est collocatus; unde velut à centro circums, capillorum prouentus, incipere uidetur, lib. Introd. cap. 10.

Vertex Cordis, est inferior visceris terminus, figura turbinatus, qui inferna pectoris ossis regioni cohaerescit, cuius in extremo mucronata cartilago constituitur, 7. de anat. adm. cap. 3.

Vertebra, vide *Dorsum*.

Vertigo est affectio, qua caput circumagi uidetur, 4. acut. 42. vide *Scorodinos*.

Vesica felle, vide *Cystis Choledochos*.

Vestigium, vocatur inferior pars pedis, 2. de fract. 10.

V eter-

Veternus, hoc est granis sopor, de cau/. morb. ca. 3. siue ignauia & stoliditas, 1. prorrh. 31. & 2. aphor. 3. dicitur autem *Veternus*, quasi *Veteranus* morbus, qui *Lethargus* vocatur, in quo agri ueteranorum, idest senum more, inexplergetibili somno detinentur. *Terentius* in *Eunucho*.

Vibratio, siue *Agitatio*, est uolentus alicuius corporis partis motus, ut conquisecere non liceat, etiam si strenue admodum renitaris, differens à *Tremore*, qui nisi partem mouere uelis, non accidet, lib. de trem. palp. cap. 6.

Vibratus pulsus, (*Græcè* Κλάνειν) uide (*Conuulsus*).

Victum appello, non hunc tantum, qui cibo, & portione constat, uerum etiam qui omnibus alijs, ut ocio, exercitatione, balneo, uenere, somno, uigilijs, & omnibus quæ quouis modo sunt in humanis corporibus, idest, uiuendi ratio, com. 3. in 3. de morb. uulg. 9.

Villi, uide *Fibræ*.

Vinacia sunt solida & uia reliquia, cū in torculari succus ipsarum omnis expressus fuerit, 2. de aliment. facult. 9.

Vinum *aparachyton*, idest, originale, cui marina aqua non est addita, 4. de comp. medic. loc. cap. 7. cui opponitur *vinum tethalassimenon*, 4. acut. 2.

Vinum vinosum, uide *Hydatodes*, & *Oenodes*.

Virtus naturalis, uide *Virtutes*.

Virtus ratrix, uide *Virtutes*.

Virtus uitalis, uide *Virtutes*.

Virtutes, (quas facultates Medici uocant, *Plato* aīas) sunt tres illæ quæ toti corpori, ex suo quodam ueluti fonte distributæ, animal gubernant; Prior quæ uel naturalis, uel alatrix, uel appetitrix, alterans, & concoquens appellatur, 2. progn. 26. ad nutriendum animal necessaria. Stirpibus cōmunis, quæ lecur ueluti pro fonte habet, canales uerò ab hoc in totū corpus sparsos, ipsas uenas; Altera quæ

T

& fa.

& facultas, virtus, seu anima vitalis, & animosa appellatur, quæ non modo ut stirpibus, aut vitæ præditis, sed etiã ut animalibus anima est insita, sedem habens in Corde, cuius canales arteriæ sunt; Posterior Ratiocinatrix in Cerebro domicilium habens, voluntarijs actionibus, und cum sensibus præsidens, cuius canales sunt nervi, sensum motumque in totum animal deferentes, 9 metho. 10.

Vitalis motus, vide Motuum species.

Vitellina bilis, quæ & lutea dicitur, vide Bilis pallida.

Vitiliginum, quas Alphos vocant, generatio similis est generis cum eo affectu, quem Leuoe siue albam vitiliginem, Arabes Alboras appellant, non tamen sub ijs tota caro vitatur, ut in Leuce, sed in summo corpore, æluti squamæ quepiant. Vitilignes infiguntur, albæ quidem ex pituitoso, nigræ ex melancholico succo exorta, 3. de sympt. caus. cap. 2. In Vitiligine autem alba, fit nutrimenti appësitiõ, non assimilatio, 1. de natur. fac. cap. 11.

Vitreus oculi, vide Hyeloides, & Crystallinus.

Vitreus humor à Praxagora appellatur, qui vitrei nomen ipsi imposuit, pituitæ species est, frigidissimus, quippe vitro fuso, tum colore, tum substantia, haud ab-similis est, 2. loc. aff. 5.

Ulcera dulcia, vide Ochthode, & Dulcia ulcera.

Ulceratio oculi est ruptio circa corneam tunicam, quæ vel ex ictu, vel ex strenua phlegmonè oritur, lib. finit.

Ulcus, quod Græci Elcos, vide Vaionis solutio.

Ulcus depascens, vide Phagedænas.

Ulna, vide Cubitus.

Ulmelia, id est solimembra, est totius corporis, ex membris compago, 1. de usu p. 8.

Umbilicus nihil aliud est, quàm multitudo magnorum vasorum, quæ ex multis parvis venis, & arterijs, & pro-

paginibus earundem per totum Chorion dispersis, conflatur, & eo loco uniuntur, per quæ, & sanguis, & spiritus, ad factum derivatur, in medio urinaculum habentium, lib. de dissect. vul. cap. 10.

Uncia habet dracmas octo, quæ dracma etiam Holce dicuntur; dracma habet siliquas duodeviginti, alij dicunt seropulos tres; scrupulus habet obolos duos, obolus siliquas tres, lib. de pond. & mens. c. 3.

Vndosus pulsus, uide Vermiculans.

Vnguis, siue Vngula, uide Pterygium.

Unio, uide Prosthesis.

Unionis solutio, siue Continuitatis solutio, est morbus, in quo partes, quæ secundum naturam unionem acceperunt, inter se solvantur, lib. de const. art. cap. 6. quæ solutio si in osse fiat, dicitur Fractura, seu Catagma; in nervosis musculorum partibus ex distentione, ruptura; in fibris Convulsio, seu spasma; in carne ex vulnere incisio, ex aliquo acuto punctura, seu punctio, ex aliquo graui contusio; ex erosione in osse, Terebratio; in carnosis partibus, Vlcus; in instrumentalibus & ligamentis, avulsio, siue aposphagma, ibidem. In uasis, musculisq; ex uiolento: Eru, uel graui casus uel alio quopiam ualente motu excitata. Rhegma & Ebhlasma; cum contusione & ruptione, Ecchymosis, 4. metho. 1. ab aliquo acuto occurrente, atque abscidente, Incisio, Dissectio, & Sedes. lib. de caus. morb. cap. 11.

Uniuersalis morbus, uide Communis.

Vniuoca, uide Aequiuoca.

Vocis organa uoco, per quæ spiritus, redditus uox efficitur, hæc sunt aspera arteria, guttur, fauces, ueluti spiritus plastrum, per ipsas transeuntis, nam hæc uocis instrumentum sunt, ut locutionis lingua.

Vola manus nominatur, supina pars manus iuxta pollicem

licem affurgens, Græce *Tbenar*, cui pars opposita *Hypothénar*, & *Subuola* uocatur, 1. de usu p. c. 17.

Voluntarius motus, uide *Motuum species*.

Voluulus, uide *Ileos*, & *Cbordapsus*.

Voluulosa Stomachi subuersio, uide *Subuersio*.

Vomica, uide *Sinus*.

Vomitus & *nausea*, expultricis facultatis uentriculi prauis motus sunt, ad ea quæ uentris corpus contristant, quàm citissimè per Stomachum uacuanda; Nec idem est uomitibus & singultientibus motus, quippe in uomitionibus, ea quæ in capacitatem sunt uentris reijciuntur, in singultu quæ in ipso uentris sunt corpore, simili scilicet tum affectu, tum motu, qualis est iis, qui ex intemperie tussiant, omnibus nimirum uentriculi partibus, quod se contristat, expellentibus, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Wrachichronius morbus est, qui breui tempore finitur, *Polichronius* uerò, qui longo tempore comprehenditur, 3. de dieb. de cr. cap. 13.

Wrachos, appellatur meatus, qui infantis *Vmbilico* inseritur, ex quo enascitur, & *sus. ensus* est, qui meatus mutuo congressu quinque vasorum absoluitur; nam à uenis quæ secundas implent, bina alia prodeuntes sunt uena, ab arteriis ibidem sitis, binæ arterie, & à nervis unus nervus, complicati mutuo, qui *Vmbilicum* absoluant, libr. Intro. cap. 11. uide *Vmbilicus* & *Vrinaculum*.

Wranscus, idest paruum cælum, quod Latine palatum dicitur, pars est oris superior, à cæli similitudine, nomen accipiens, lib. finit.

Urentia, uide *Caustica*.

Uretheres, (idest *Vrinarii*) sunt meatus quidam oblongi & fortes, *Vrinarii* dicti, qui renes uesica committunt, ducentes per colatoria, urinas à sanguine segregatas, ad
vesi-

Vesicam, 5. *usu p. 5.* Qui *Vrinarii* meatus, nec arteriæ sunt, tum nec pulsent, nec duplici constant tunica, neque venæ, quia sanguinem in se continent, nec similem omnino venæ habent tunicam; à nervis autem plus distant, quàm à iam dictis, 1. nat. fac. cap. 6.

Vrethra, siue *Urithra* est meatus uringreddenda accommodatus, qui in pene est, quem & fistulam *Vrinariam* appellant, 4. aphor. 82. Estque cervicis vesica meatus, & *urina fistula*, 1. loc. aff. 1. vide *Fistula urinaria*.

Vretica, vide *Diuretica*.

Urina, quam Græci, *Vron*, vocant, est excrementum tenue. & aquosum sanguinis, 5. *usu par. 5.* vide *Lotium*.

Urina optima, cuius sedimen album, & laeve, & æquale extiterit perpetuo tempore, usque dum iudicatus fuerit morbus, lib. de atrab. 8.

Urinaculum, quod Græci *Praxon* vocant, est meatus qui ex fundo vesicæ exortus, lotium in tunicam *Allantoidem* pregnantis mulieris derivat, quæ ita à similitudine figuræ, quam habet cum intestinis, appellatur, 15. de *usup. c. 15.* vide *Praxos*, & *Umbilicus*.

Vrinarij, vide *Vreteres*.

Vrinarius meatus, Græcè οὐράχης οὐρίδρα, vide *Vreteres*.

Urina difficultas & *suppressio*, vide *Ischuria*.

Urina profluvium, vide *Diabete*.

Urina stillitidium, vide *Ischuria*, 3. aph. 16.

Urina substantia, vide *Consistentia*.

Vron, vide *Urina*.

Vteraria, vide *Hysterica*.

Vteri suffocatio, est spirationis ob uterum ablatio, quæ & *Apnœa* vocatur, eandemque uterinam suffocationem, & strangulationem appellant, 3. aph. 35. & *Hystericum*

morbum, 4. de caus. pul. 22.

Uteri Rheuma, vide Menses.

Uterus, Μήτρα, Vulua, & Matrix appellatur, est ea corporis pars, quæ mulieribus ad concipiendum & pariendum, à natura est concessa, 6. loc. aff. 9.

Vtricularii, vide Hyderici, & Ascites.

Vua, vide Gargareon, & Staphyle.

Vuæ, Paristhmia & Tonsille, nihil aliud sunt quam inflammationes. Vua, quidem Gargareonis, Tonsille uerò adenum, eorum qui in principio faucium inter se oppositi sunt, quemadmodum Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus sunt. Videtur autem Hippoc. non omnem Gargareonis inflammationem vuam nominare, sed unam solam speciem, qua Gargareonis terminus similis acino Vuæ est, lib. de tumorib. cap. 17. vide Staphyle, Gargareon.

Vuæ vinosæ, quæ nullam uehementem qualitatem habent, 2. de aliment. fac. cap. 9.

Vuæ oculi tinnica, uide Rhagois & Carulea.

Vuiformis, vide Rhagois & Cerulea.

Vulgaris morbus, uide Communis morbus.

Vulsio est cum fibra musculorum nimis distente rumpantur, quæ nunc uellitatio, nunc discreptio appellatur, 3. de ijs quæ in med. 30.

Vulua, uide Hystera & Uterus.

Vulua, uide Staphyle.

X

XEROPHTHALMIA, idest arida lippitudo, cum anguli oculi ulcera, & aspritudinem, pruritumque contraxerunt, palpebra rubent, & lacrima salsa & nitrosa, ab oculis profluit, libr. Introd. cap. 15. uide Sclerophthalmia.

Xerotriba, idest sicca frictio, 8. meth. 2.

Xiphoides, vide Pectorale os, & Chartilago ensiformis.
Xister, vide Aures.

Z

ZOOGOMIA, idest animalium generatio, libr. de
 constit. art. cap. 13.

*Zulapium, Aëuarius, & alii recentiores Græci, bar-
 bara uoce, appellant id quod hodie iuleb itidem barbaro
 uocabulo nuncupamus; fit è stillatitio liquore, aut quod
 rectius est, è succis & saccharo tantum, ut ex Mesue sa-
 tis constat, licet Sepalsiarii ab ea forma compositionis, ne-
 scio quo iure, non nihil disceſſerint.*

*Zygoma os, siue fugale est, quod temporis musculo præ-
 positum est, transversam in medio suturam habens, cuius
 posterior pars omnis cum capitis osse, quod iuxta aures
 est, anterior cum parte supercilii extrema, ad paruum
 oculi angulum, continuatur, lib. de ossib. cap. 2. quod cum
 duplex sit ad utramque aurem, super foramina, per que
 facultas audiendi est, emergit, libr. Introd. cap. 11. quod
 uulgo os paris uocant, alii iugamentum, Græcè autem
 Ζυγῶμα, siue συζυγῶδες, quasi coniugiale, & ex duobus
 coniugatum, uocatur.*

*Zymosis Iecinoris, est tumor edematosus Iecinoris
 apud Hippocratem.*

F I N I S.

PRÆCIPUARUM ARABICARUM
vocum, ad artem medicam facientium, ordine Alphabeticæ series; in qua videre est, quæ Arabica vox, cui Græcæ & Latina reddatur, & significato respondeat.

<i>Arabice.</i>	<i>Græcæ.</i>	<i>Latine.</i>
Abgas,	Chorion,	Amnium tunica.
Abortus,	Amblosis,	Abortus, deperditio
Abrahamia,	Cacoethæ,	Maligna ulcera.
Accidens,	Symptoma,	Passio, Coincicens.
Achaël,	Pfellotes,	Traulus, Balbus.
Achilus, Algaras,	Aegilops,	Anchilops.
Achmas,	Pedion,	Planta pedis.
Achimon,	Argemon,	Iridis oculi vlcus.
Acrai, Arfarum,	Priapismus,	Tentigo.
Aethalegi,	Palmos,	Palpitatio.
Acualis dolor,	Nitticos,	Perforatus.
Adereb fluxus,	Hepaticus affectus,	Iecoris imbecillitas.
Adiutorium,	Omoplatæ,	Humerus.
Adorem,	Raphè,	Sutura, (ti nes.
Adorem corticales,	Lepidoides,	Squamosæ cōglutiā
Adorem laudæ,	Lambdoide	Sutura occipitis.
Adorem mendosæ,	Lepidoides	Suturæ iuxta aures.
Aduftina,	Causon,	Adurens febris.
Aduftinum, Aufu,	Epicauma,	Sordidū vlcus oculi
Aflicem,	(mc, Ophthalmia,	Lippitudo.
Alabene,	Supinitas,	Succubus.
Alaçaran,	Ancyroide,	Æthoralis pcessur.
Alachahab,	Pterne,	Calcaneus, Calx.
Alachun,	Larynx,	Asperæ arteriæ caput.
Alagiagi,	Ostūn hiciōn,	Os sacrum.
Alaiuanie,	Zodynamis,	Vitalis virtus.

Alan.

*Arabica.**Græc.**Latina.*

alandagi,	Anadofis , Diapho	Digestio, concoctio.
alarbian,	Sarcomata , (refis	Polypus narium,
alafch idem ac	Ilifchi, vide infra.	
alafccilez,	Splenitica,	Saluatella vena.
ala ftardad,	Apothepia ,	Recreatoria.
alatahal,	Coiyza,	Grauedo.
alatzar,	Ectropion,	Palpebræ inuerfio.
albaras alba,	Leuce, Alphos,	Morphea alba.
albaras nigra,	Lepra,	Morphea nigra.
albarnaber,	Carcynoma,	Cancer narium.
albatagin,	Carpus,	Brachiale.
albere,	Pfogaftrium ,	Ventris medium.
albhear,	Dypfnæa,	Difficultas fpirandi.
alborati,	Omphalus,	Vmbilicus.
albothin,	Therminthi,	Exituræ nigræ.
albugo, Panus,	Leucoma,	Cicatrix oculi.
alcafa , (Albedo,	Inion ,	Occiput.
alcahab,	Aftagalus,	Talus.
alcangiari,	Sternon,	Os pectoris.
alcarba ,	Phalacrotes,	Caluitium.
alcufi,	Achlys,	Caligo oculi.
alchab,	Aftagalus,	Clavicula, Talus.
alchada,	Omnopata,	Humerus.
alchael,	Aphonia,	Vocis carêtia ex lin
alchael,	Diaphragma,	Prccordia. (gua.
alchalcul,	Larynx,	Guttur.
alchama,	Choana, Pyelos,	Infundibulū, Lacūa
alchamar,	Amblyopia,	Cecitas folis intuitu
alchambar,	Ança,	Amentia.
alchangeri,	Sternon,	Enfiformis chartila
alchatim,	Pfoæ Ifchis,	Lumbi. (go.
alchef pectinis,	Metacarpium,	Post brachiale.
alcheffir,	Porus,	Meatus.
alchei,	Oftùn hieròn;	Os facrum.
achelof,	Taraxis ,	Oculi perturbatio.
alchirunic,	Chironia,	Vlcera rebellia.
		Al. hool,

Arabica.

Græc.

Latina.

Alchool,	Xerocollurion,	Collyrium solutum,
alchola,	Aphtha,	(na. Oris ulcera.
alchola maligna,	Nome , Phageda-	Vlcera depascentia.
alcosbot,	Apostosis , aposte-	Abcessus. (nus.
alcude,	Cephalga,	(ma, Dolor capitis diutur
alcurati,	Dysenteria,	Tormina.
alcuzez,	Tetanus,	Spasmus, Cōuulsio.
aldaragi,	Raphè,	Sutura.
aldebha,	Cynanche,	Angina.
aldebul,	Marasmus,	Marcor.
aldees,	Narche,	Ignauia, Torpor, hebetu-
aldhen,	Dianxa,	Mens. (do motus.
aldemamid,	Dothien,	Furunculus.
aldememaul, idem	ac Aldemamil, &	Aldemamir.
alderab,	Diarrhæa,	Alui profluuium.
alderabe,	Vla,	Gingiu.
alderez,	Gastir encephalos,	Vētriculus Cerebri
alduar,	Stotoma, Scotodino,	Te bricosa vertigo
aldubellet, idem	ac Dubellet , &	Dubellati, vide in-
alenada,	Anadosis,	sia Digestio.
alfasch ,	Hypochelon clees,	Sinuosum vlcus.
elfasch,	Phlebotomia,	Venæ sectio.
alfase,	Hemalops,	Sugillatio oculi.
alficume,	Epicauma,	Nubes Vuæ.
algaras,	Aegilops,	Fistula lacrimalis.
algasamach,	Epiglottis,	Superlingula.
algeffa,	Emphifama . Pneumatosis,	Inflatio.
algeromati,	Esthymenon,	Herpes exedens.
algiebar,	Mycosis,	Luscosus affectus.
alguama,	Cittosa , Picatio,	Appetit? deprauat?.
alguardenigi,	Ophthalmia vera,	Lippitudo vera.
alguasa,	Melancholia,	Malancholia.
alguati,	Sperma,	(fis, Semen,
alhac,	Tenon, Aponenro-	Tendo, Eneruatio.
alhacel,	Paraphrosyne,	Delirium. (tā aures.
amaham,	Parosis, Cheras, Struma,	Abcessus iux-
		Alhadiuth,

Alhadiuth,	copros gonorrhæa,	Spermatice egestio.
Alhael,	Adenes.	Emunctoria glandulæ.
Alhagiagi,	Ostium hyeron,	Os sacrum.
Alhagran,	Perinon, semen,	Interfœmineum.
Alhaliben,	Adenes,	Inguina, emunctoria
Alhamear,	Paraphrosyne,	Infantia, fatuitas.
Alhasad,	Anchon,	Cubitus.
Alhasos,	Coccyx,	Cauda. (gnum.
Alhaus,	Ostium hyeron,	Os sacrum, latum, ma-
Alhauti,	Eusarcon,	Quadratum corpus.
Alheame,	Phlebs metopon,	Vena frontis.
Alheafme,	Epieisma,	Fractura cranei.
Alhumor,	Botrya,	Alveoli dentium.
Alices,	Scordinema,	Paudiculatio.
Alhod,	Proptosis,	Oculi procidentia.
Alintisar,	Mydrasis,	Vucæ dilatatio.
Alisema,	Coryphe,	Vertex capitis.
Allebe,	Spagè,	Inguinum.
Allui,	Cynicus spasmus,	Cauina conuulsio.
Almabad,	Phlebs Ancilis,	Vena Popiitis.
Almachade,	Hedra, Archus,	Anus, sedes.
Almachein,	Ranteres,	Anguli maiores oculi.
Almadiam, idem ac	Almadab, &c	Almadab.
Almadid,	Phlebs,	Vena.
Almagabin,	Adentes,	Emunctoria.
Almagiat,	Proptosis,	Procidentia.
Almaxaben,	Maschalis,	Axilla.
Almecheni,	Canthus,	Angulus oculi.
Almelietu,	Episemasia,	Annotatio febris.
Almeneumat,	Narcotica,	sonifera, stupefacientia
Almenthenein,	Pfoa,	Lumborum Caro.
Almerlegi,	Rhagnidis, pprosis,	Vucæ procidentia.
Almes,	Cathoc, catalepsis,	Dephessio, Alienatio
Almesemar,	porus, Helos,	Callus, Clauus.
Almesfar,	Phoxos,	Acuminatum caput,
Almessere,	Erysipelas,	Vicinirubriam.
Almetacargie,	Myesa,	Mucor.

*Arabicæ.**Græcæ.**Latine.*

Almirach,	Mys,	Musculus.
Almifmar,	Elos,	Clauus.
Almochati,	Pericranion,	Pericranium.
Alnefseme,	Psychidinamis,	Animalis virtus.
Alnifuchar,	Erihyna,	Caput purgia.
Alofos,	Lordosis,	Luxatio.
Alofos,	Coccyx,	Cauda.
Alrabin,	Asthma,	Anhelatio.
Alrad,	Sarcotrasma,	Carnis vulnus.
Alrahaune,	Paraphrosyne,	Delirium.
Alrafafe,	Epigonatis,	Patella.
Alraute,	Pterygia,	Ala, Pinna, & narū.
Altrosbot,	Porus sarcoticus,	Porus Carneus.
Alruic,	Paracme,	Declinatio.
Alfabiar,	Comatosa,	Somnifera opiata.
Alfaguaid,	Embryon,	Fætus.
Alfahad,	Pechys,	Vlna, Cubitus.
Alfahafati, idem	ac Sahafati, vide in- fra.	
Alfaim,	Nestes entheron,	Ieiunum intestinū.
Alfamach,	Typhlon Eccfma,	Cæcum foramen.
Alfamach,	Orys,	Auris,
Alfaria,	Epilepsia,	Morbus Comitialis.
Alfarnach,	Hydatis vesica,	Aquila.
Alfaterel,	Ancyloblefaron,	Palpebrarū coherētia.
Aliehati venæ,	Carotides,	Soporariæ, apoplecticæ.
Alfeda,	Thlasma,	Con tusio.
Alfedar,	Scotomia,	Tenebrositas.
Alfeedic,	Meliceris,	Melleus abscessus.
Alfedeid,	Brachron,	Brachium.
Alfelac,	Scleriasis,	Palpebrarum durities.
Alferiaran,	Catharticum,	Purgans.
Alshara,	Epilepsia,	Comitialis morbus.
Alshautar,	Erihyna,	Caput purgia.
Alshela,	Ganglia,	Contractiones.
Alshafie,	Hegemonica,	Rectrix Virtus animæ.
Alstrenge,	Cerion,	Fauus.
Alsurbed,	Phlebs hypoglottis,	Vena sublingua.

Arabica.

Græca.

Latine.

Altarfat,	Hyposphagma,	Cruenta suffusio.
Alteneſes,	Diaphnoe,	Transpiratio.
Alterbet,	Cachexia,	Prauus habitus.
Altharas,	Baiycoia,	Obauditus.
Althauu,	Phygethlon,	Apoſtema peſtilens.
Altheca,	Traulſus,	Balbus.
Althoin,	Bubo,	Abſceſſus peſtilens.
Althumar, idem	ac Alchamar.	
Althute,	Hæmorrhoids,	Morus ſedis.
Althualil,	Achrochordon,	Verruca.
Alquardengi,	Chymofis,	Palpebræ diſtorſio.
Aludi,	Gonorrhœa,	Seminis fluxus.
Aluebe.	Palmeſ,	Palpitatio.
Alunum,	Botryon,	Vlcus canum oculi.
Aluſeſchin,	Exanthemata,	Puſtula.
Aluſuas,	Parane,	Dementia. (lities,
Alzamane,	Paralyſis,	Reſolutio neruorum, mol-
Ancha,	Meros,	Femur, Crus.
Anulus,	Larynx,	Aſperæ arteriæ caput.
Anulus,	Botryon,	Foſſula.
Aqua deſcendens,	Hypochima,	Suffuſio.
Aqua Cranei,	Hydrocephalon,	Aqua capitis.
Arcuatio,	Reſpanditas,	Luxacio poſtica uerte-
Arefſatu,	Epigonatis,	Patella, Genu. (brarū,
Aſſatum,	Priapismus,	Tentigo, Penis, rigidus.
Arteria Orithi,	Aorta,	Magna, Craſſa.
Arteria Arulidi,	Læuis,	Arteria uenalis.
Arteriæ ſubnecti,	Carotides,	Soporariæ.
Artetica.	Arthritis.	Articularis morbus.
Aſchachilos,	Sphacelum,	Membrum demortuū.
Aſcham,	Pathos, Pathema,	Paſſio.
Aſef,	Hydroon,	Sudamen.
Aſeid,	Pechys,	Cubitus, Vlna.
Aſelha,	Oedema,	Tumor laxus.
Aſellata vena,	Maſchalæa,	Axillaris vena.
Aſeſtra,	Ectropion,	palpebræ inuertiſio.
Atanatum,	bubon, Læmon,	Abſceſſus peſtilens.

Arabicæ.

Græcæ.

Latine.

Atafus,	Pneumatosis,	Inflatio,
Athacarugi,	Mysca,	Mucor.
Atherael.	Apostema,	Abcessus.
Aures muris.	Myotis,	Scissura Unguium.
Balchee,	Telephion elcos,	Vlcus Telephium.
Balchie,	Psydrachia,	Pustulæ capitis.
Bancharas,	Pacreô, Calicreon,	Caro glandulosa.
Baras,	Pforonychia,	Scabrites Unguium
Barbati,	Oscheon,	Scrotû, Bursa testiu.
Barachien,	Bubon læmos,	Apostema pestidês.
Basilare os,	Sphenois, Polimorphum.)	Os palati.
Bathara,	Anthrax pestilens,	Carbo, vlc ^o escharo-
Baurach,	Aphronitrum,	Salnitrum. (sum.
Beaz,	Dyspnæa,	Difficultas spirandi.
Beditns,	Strumæ Chærades,	Scrofulæ.
Benat noctis.	Epinyctis,	Nocturna effloratio
Beriteron,	Peritonæon,	Peritonæos tunica.
Besbeia,	Polypus, Sacroma,	Caro multipes nariû.
Betaram,	Encope.	Incisio.
Bezahartica,	Alexipharmaca,	Ad venena pharmaca.
Bezel,	Parachentesis,	Punctio, Perforatio
Biles,	Allantoide,	Intestinalis tunica.
Birsen,	Pleuritis,	Lateralis dolor.
Bolismos,	Bulismos,	Ingens esuritio.
Bothor,	Bôthor,	pustulæ.
Bothor,	Synchyfes,	Exituræ oculi.
Brachium,	Brachon.	Brachium.
Buri,	Sarcocele,	Carnosa hernia.
Cadar,	Hemiplexia,	Dimidij corporis reso
Cafacan,	Cardia,	Cor. (lutio.
Calcataron,	Pterygium,	Ungula Oculi.
Calus,	Heios,	Clauius.
Caluitium,	Phatactosis,	Capillorum casus.
Camaduci,	Inion,	Occiput. Occipitiû.
Cambium.	Chymus,	Sanguis, seu humor
Camfia fœtus.	Allantoides,	Intestinalis tunica.
Canalis,	Porus.	meatus.

Can.

Cancrena,	Gāgrana. Necrosis, Gangræna.	
Cāna pulmonis,	Trachea arteria,	Aspera arteria.
Cannæ Tibiæ,	Ocrea. Sura,	Ossa duo Tibiæ.
Capſula cordis,	Pericardium,	Cordis involucrum
Caras,	Aphonia, Traulus, Vox depdita, deprauata	
Caratin,	Gyſenteron,	Lūbrici terrestres.
Carabitus,	phrenitis,	Delirium febriens.
Carenum,	Sapa, Sireon,	Mustum coctum.
Carinata,	Bubon,	Glādularū abscessus
Caro addita.	Hyperſarcosis,	Thymus.
Cassum,	Thorax,	Pectus.
Cataracta,	Hypochyma,	Suffusio.
Catalan.	Encope,	Incisio.
Chadeſſan,	Dereſte,	Excoriare.
Chahab,	Aſtragalus,	Talus.
Chalahan,	Ecfarthrema,	Luxatio.
Chafem,	Ozenæ,	Narium ꝯlcera.
Chatrab,	Lycanthropia,	Lupina infania.
Cede,	Anorexia,	Inappetentia.
Cheſaram,	Catagma,	Oſſium fractura.
Chila,	Cirſos,	Hernia.
Chis, Saccus,	Cyſtis,	Veſica.
Chis hordei,	Puſana,	Cremor hordei.
Cholera,	Chole,	Bilis.
Colera citrina,	Picrocholos chymo.	Bilis pallida.
Cholera vitellina,	Chole lechita.	Bilis vitellina.
Cholera ſamoſa,	Chole nota,	Bilis ſputia.
Cholera min. ſamæ.	Chole melæna,	Bilis aduſta.
Cholera rubea,	Picrocholos chymo,	Bilis amara.
Cholera nigra,	Chole melæna,	Bilis atra.
Cholirica paſſio,	Cholera,	Bilaris.
Chranites,	Brenitis,	Phrenitis.
Chuba,	Lychen, Lepra,	Impetigo.
Chuzez,	Tetanus.	Tenſio.
Clipealis cartilago,	Chodró Tyroides,	Secutiſformis cartila
Cimbalaris,	Cricoides.	Cooprioriacartilago.
Cohol,	Collurion.	Collyrium ſuſum.
	Z 3	Colcotar,

Colcotar,	Calcitis,	Vitrioli species,
Complexio,	Craſis, ſymmetria,	Temperies.
Conach,	Apnæa Hyſteròs,	Vter præfocatio.
Congelatio,	Catalepiſis,	Deptchenſio.
Côgelatio dentiũ,	Aemodia,	Stupor dentium.
Conſimilia,	Homogenea,	Similares partes.
Contoſio,	Scolioſis,	Obſtipitas.
Conturbatio,	Tataxiſis,	Vellicatio oculi.
Côuulſio canina,	Spaſmus Cynicus,	Diſtortio faciæ.
Coronale,	Argemô, Lécoma,	Albugo oculi.
Corruptio offis,	Teredon.	Offis caries.
Cortex inteſtini.	Ephelcis, Ramêtû,	Inteſtini tunica.
Cus.	Cneme,	Tibia.
Cutubuth,	Lycanthropia,	Lupina inſania.
Coxa,	Meros.	Femur, Crus.
Darb, Darab,	Diarrhæa,	Alni profluuium.
Debus,	Marasmus,	Tabes.
Demonium,	Mania,	Furor.
Dentes Atham,	Gomphi,	Molares, Sapientiæ.
Derezi,	Raphè,	Commiſſura. Sutura.
Diaciminum,	Diaſpoleticum,	Ex cumino Pharmacũ.
Dipſacos,	Diabete,	Vrine profluuium.
Dislocatio.	Lordoſis, Luxatio,	Exarticulatio.
Diſnia,	Dyſpnœa,	Difficultas reſpiratio.
Domestica pars,	Maſchalæa,	Interna. (nis.
Dubellari,	Phlegmon,	Abſceſſus calidus.
Dura mater,	Meninx craſſa,	Cuticularis tunica.
Durities,	Scirrhus,	Abſceſſus durus.
Embroce,	Balanion,	Balneum.
Empialos,	Hepiala,	Febris Equalis.
Emulgentes,	Emulgentes,	Percolantes venę.
Emunctori.	Adenes,	Glandulæ.
Encaras,	Phlebs Meſeræi,	Vena miſerica.
Endros,	Epidyſynis,	Supergeminalis tunica.
Eneruatio,	Paralyſis,	Reſolutio.
Epittima,	Epithemata.	Linimenta.
Eſſere,	Epinyctis,	Effulgeſcentia.
		Eſſere

Effere choleriçû,	Phlegmon, Phlogon,	Inflammatiô.
Êsticos febris,	Hectica,	(sis, Habitualis, Facta.
Exitura,	Apostema,	Abcessus purulentus
Expressio oculi,	Proptosis,	Vulvæ prolapsus.
Fagdan,	Lordosis,	Spinæ luxatio.
Fames vaccina,	Bulimos,	Vehemens esuritio.
Faricôn,	Causon,	Febris ardens.
Faselan,	Apocope,	Abscissio.
Febris triângulata,	Tetartecos,	Quartana.
Fedehan,	Hernia, Ramex,	Ruptura.
Ferismus,	Priapismus,	Tentigo,
Feterat.	Paracme,	Remissio morbi,
Fictet musculus.	Sfincter.	Constrictor.
Filachaliafuch.	Stephaniza.	Sutura Coronalis.
Fechan,	Diastremma.	Luxatio.
Fissura.	Rhogme.	Rima.
Focilia duo.	Cerchis, Pechys,	Radius, Cubitus.
Fœdion,	Epilepsia,	Puerilis morbus.
Formica.	Myrmecia,	Scissilis Verruca.
Formica.	Herpes miliaris.	Serpigo.
Formicalis.	Myocephalon,	Musç caput.
Fossula.	Botryon.	Ulcus cavû Corneæ.
Franites.	Phrenitis.	Cum febre delirium
Fricatio.	Anatripsis.	Friccio.
Furcula.	Clis.	Clavis, Iugulum.
Furfures.	Pythiriasis.	Porrigo.
Fugule, Fulille,	Parotis.	Ad aures morbus.
Fusus.	Nympha.	Colliculus.
Gadu.	Scirrhus.	Tumor durus indolês.
Galea, Ouum.	Cephalæa,	Diuturn ² capitis dolor.
Garab, Algaras.	Aegilops,	Ulcus anguli oculi.
Gafi.	Syncopis.	Preceps virium lapsus.
Gauonij,	Paristhnia.	Tonsillæ, Amygdalæ.
Gedaul,	Mesazon,	Mesenterium, Lactes.
Geleniabin,	Diarhodomel.	Ex rosa & melle, gelin.
Genu.	Gony.	O: Tibiæ, Genu.

Gessa palpebræ.	Scerophthalmia,	Scabrities palpebrarū.
Gibbositas.	Cyllofis.	Distorsio.
Gienun.	Mania.	Furor.
Gingia mater.	Pericranium.	pericranium.
Glandulæ.	Ganglia.	Contractiones.
Grando oculi.	Chalazi ô, Posthie,	Hordeolus.
Guesques.	Melancholia,	Fatuitas.
Guidez venæ.	Sphagitides.	Apopletice, Iugulares.
Gutta serena,	Amaurosis,	Visus obscuritas.
Haben,	Hydrops,	Aqua inter cutem.
Hacar,	Apostema,	Vlcus, siue abscessus.
Hacuna,	Satyriasis,	Tétigo, Penis tésus.
Halmes,	Paraphrosyne,	Delirium.
Hamcha,	Anæa,	Dementia.
Hamicha,	Lata exâthemata,	Variolæ.
Hasef,	Hidroa,	Sudamina.
Hazam,	Enôpe,	Incisio.
Hedian,	Moria, Morosis.	Desipientia.
Henadam,	Pepsia,	Concoctio.
Hesme,	Aposphagma,	Auulsio.
Hirque oculorū,	Canthus,	Anguli Oculi.
Humor,	Chymus,	Humor.
Iafuc,	Bregma,	Synciput.
Iectigatio,	Palmôs,	Palpitatio, Saltus.
Iezem t,	Catalepsis, Caros.	Deprehensio.]
Ibet, Subeth.	Coma,	ôopor.
Ignis persicus,	Anthrax,	Carbo, Carbunculus.
Ilifchi,	Eroticos,	Effrænis amor.
Impetigo,	Lychen, Lepra,	Salsa cutis asperitas.
Impetigo aspera,	Lychenes,	Tensa prurigo,
Incubus,	Ephsaltes,	Nocturna suffocari.
Inuersa palpebra,	Lagophthalmos,	Leporinus oculus.
Inuiscatio palpebræ.	Ancyleblepharon,	palpebrarū cōnu.
Inuolutus,	Allâtoides, choriô,	Vrinaculum, Secunda.
Istimbre,	Crasis,	Tēpeties, assimilatio.
Iuleb,	Hydrorhodomel,	Ex rosacea, & saccha-
Iuncus,	olntos,	Varus. (to.

kef,	Xir,	Manus.
kers,	Stomachus,	Ventriculus.
kili Vena,	Hepatitis,	Cava vena.
Lacertus,	Mys,	musculus.
Lachat,	Encope,	Incisio.
Lapidositas oculi,	Tylosis,	Callus palpebrarū.
Latica febris,	Cathemerina,	Quotidiana, cōtinua.
Lauda,	Os hyoides,	Os gutturis.
Laxatie,	Paralysis,	Resolutio.
Lactea,	Galaxi,	Lactes.
Lentigo,	Exuccatio,	Sugillata.
Lepores nasi,	Mycteres,	Pterygiō, Alę Pinulę nariū
Leucam,	Lepra,	Lep. a.
Lilimie,	Coeloma,	Profūd ^o oculi aq̄cessus
Lipiria febris,	Lyparia,	Lyparia. (ctius.
Loch,	Apophlegmatismus,	Pituita pos edu-
Longaon,	Apephymenō,	Rectum intestinum.
Lulma,	Cælomata,	Vlcera cava Vucę.
Lythargirium,	Molybdana,	Plūbago, limatura plūbi.
Macula oculi,	hypoththalmiō	Hyposphagma, sugillatio
Malum granatum,	Xiphoidē,	Os pectoris.
Manuale opus,	Chirurgicon,	Manuum opera.
Maram,	Alimma,	Vnguentum.
Masera,	Phlegmon mitis	Leue inflammēn.
Masticatorium,	Eclegma,	Pituita eductius p ^o s.
Mater puerorum,	Spylepsia,	Comitalis morbus
Marer sanguinis,	Aneurisma,	Arterialis sāguinis
Maudana,	Catapotia,	Pilulę. (fluor.
Melon,	Pepon,	Anguria.
Melon Indus.	Melopepones,	Anauria viridis rotūda
Men,	Drosomeli,	Manna. (pulsis.
Men Giezer,	Systole Diastole,	Contractio, dilatio
Mestruus sanguis,	Cataminion,	Menses.
Meri,	Oesophagus,	Gula.
Metalachlach,	Tolera,	Turbida vrua.
Metenen,	Psoa,	Carolumborum.
Mirach,	Epygastrum,	Abdomen.

Mirachia,	Hypochondriacus,	Flatuosus morbus.
Mollificatio,	Paralysis,	Resolutio,
Morphea,	Alphos, Leuce,	Vitiligo.
Morum.	Codylomata,	Exuberatio ani.
Mucla,	Dema,	Cutis.
Munfis,	Eceyefmos,	Totius oculi plaps.
Muzum,	Mozum,	Austel' sapor, vel a-
Nascentia,	Apostema,	Exitura. (cerbus.
Naniculare os,	Scaphides,	Nauiforme os.
Nebith.	Oenon,	Vinum.
Nerdi os,	Astragalus,	Talus, Os ballistæ.
Nerualis Sutura,	Obolicea,	Sagittalis, Recta.
Monoculum,	Typhlon,	Cecum intestinum.
Morbilli.	Exanthemata sublimia,	pustulæ elatæ.
Nocra,	Phlebs,	Vena.
Nodus,	Atheran,	Atheroma.
Nubes,	Hypochyma,	Suffusio, Cataracta.
Nucha,	Notyxon myelô,	Spinalis medulla.
Nyctalopa,	Nyctalope,	Nocturna cæcitas.
Oculi egressio,	Eceyefmos,	Totius oculi plaps.
Oculus Poplitis,	Epigonatis, Myle,	patella, Rotula, Genu
Oculi protuditias,	Atrophia,	Nutritionis defect.
Oculi vlc' serpes,	Anthracoſis,	Carbunculus.
Officiâlia mēbra,	Organica,	Instrumentalia.
Opium,	Meconium,	Succus papaueris.
Oregmon,	Catarrhus,	Destillatio.
Os Cruris,	Gony,	Genu.
Os Cunei,	Sphenois,	Basilare, palati.
Oslatū. Alcharim.	Coxa,	Femur.
Os laudē,	Paryngetron,	Os Gutturis.
Os Nerdi,	Eyboides,	Cubiforme.
Os Paris,	Zygomal,	Os iugale, Os temporū.
Os Perdis,	Pedion,	Planta pedis, Pecten
Ossa Stemic,	Lithoidea,	Lapidea, Petroſa.
Osseum,	Sertam,	Testium Inuolucrū.
Osseum mollificatio,	Rhacosis,	Detritio, Scroti extēſio.
Ouum,	Cephalæa,	Dolor capitis diuturnus.

Arabice.

Græca.

Latine.

Panaritium,	Paronychia,	Redumia.
Pannus idem ac ratia,	Lentigo, Nigror, Tonos,	Liuor, Nigritia.
pars domestica,	Oechion meros,	Nerbus.
pars syluestris,	Exothen meros,	Interior.
proportionalis,	Symbolic ⁹ morbus	Exterior. (spôdēs.
pecten alchef,	Metacarpium,	Naturæ loco tpi re-
peidiomata,	Exuccatio	Postbra chiale.
peltalis chartilago,	Thyroides,	Liuor.
periodica febris,	Typica,	Scutiformis.
phitanos febris,	palymbola,	Intermittens.
phlebotomia	phlebotomia,	Reuersiua, erratica.
pia mater,	Choroides,	Vene sectio.
pixis,	Ischias,	Meninx tenuis.
plaga,	Trafma,	Coxa.
plancta noctis,	Epinyctis,	Vulnus. (nes.
porrina,	porracea,	Nocturnæ effloratio
Portinariū,	pyloron,	Porracea bilis.
pruna,	Anthrax,	Ianitor.
pupillæ constrictio,	phisis oculi,	Carbo,
Quindege venæ,	Sphagitides,	Tabes oculi.
Radani,	Thlasma,	Apopletica, iugulares
Radicalia mēbra,	Spermatica,	Contusio, Attricio.
Ragama,	Rhogme,	Seminalia.
Rahaf,	hæmorrhoids nariū,	Fissura
Ranula,	Sardoa,	Flux ⁹ sāguinis nariū
Ras,	Cephal,	Ranunculus.
Rascetta,	Carpōs,	Supernus venter.
Rasga,	Epygonatis,	Brachiale.
Rauedfeni,	Rhabarbarum,	Parella.
Renalis dolor,	Nephriticus,	Rhabarbarum.
Resudatio,	Hidroa,	Renum dolor.
Ret mirabile,	Plegma dictyoides,	Sudamina.
R hæune,	Anaa,	Plexus reti formis.
Rhia alfabiam,	Hydrocephalon,	Amentia, Dementia
Rigil,	Merōs,	Aqua capitis.
Rina alfabiam,	Epilepsia,	Femur Crus.
		Comitialis morbus.
		Rob,

Arabica.

Greeç.

Latina.

Rob,	Opos,	Succus seipſo concreſcēs
Roſtrum Corui,	Coracoides,	Coruicularis ꝑceſſus.
Rotula,	Epigonatis.	Patella, Genu.
Ruptura,	Cele,	Ramex, Hernia,
Ruptura Corneæ,	Proptofis,	Oculi prolapſus.
Saccus,	Caralepſis,	Deprehenſio.
Sacculos,	Cephalalgia,	Capitis dolor.
Sacha,	Tmeſis,	Sciſſura.
Sadacham,	Thlaſma,	Contuſio.
Sagittalis,	Obolicea,	Recta Sutura,
Sahafati,	Achores,	Vlcus capitis manans
Saharà,	Pannychides,	Peruigiliū nocturnum.
Saltus,	Palmos,	Palpitatio.
Sāguis mortuus,	Exuccatio,	Sugillara.
Sanies in ſiphac,	Hypopyōn,	Pus Corneæ.
Sanies vngularis,	Onyx,	Vnguis oculi.
Sauich,	Perſana,	Cremor hordci.
Saurhat,	Cephalartica,	Caputpurgia.
Scabies oculi,	Trachoma,	pruritus oculi.
Scarificatio,	Encharaxis,	Cutis incifio.
Scelen vena,	Splenitica,	Saluatella.
Sciatica, ſeu dolor,	Coxēdix, iſchias,	Coxendicū morbus
Scleroſis,	Sclerioſis,	tumor durus palpebræ.
Scotomia,	Scotodinos,	Tenebricoſa Vertigo.
Scrofulæ,	Charades,	Strume.
Sebel,	Enchātis, Rhæas,	Inangularis.
Secaniabin	Oxyzacchara,	Syrupus acetofus .
Secundina,	Chorion,	Secunda.
Secūdina tunica,	Chorodes,	Meninx tenuis.
Sedar,	Cataphora,	Somnolentia.
Sedere,	Scotoma,	Vertigo.
Sehagian,	Trauma,	Vulnus.
Sefaſeuc,	Acantha,	Spine apex.
Saphiros.	Carcynos.	Canceri ſpecies.
Serach,	Emphraxis pylorō,	Obſtructio pyloron
Seraſif,	Hypochondria,	præcordia.
Sibarc,	Mania,	Furor.

Sicff,

Arabicæ.

Græcæ.

Latine.

Sieff,	Hygrocolluria,	Arida Collyria.
Silac,	Tilosis,	Depilatio palpebra
Siphac,	peritonæon,	peritonæos tunica.
Sirsen calidum,	phrenitis,	phrenitis.
Sirsen frigidum,	Lethargus,	Lethargus.
Siracost,	Manna.	Manna.
Sisamina ossa,	Sesamoidea,	Sesamidea.
Sochos,	CatalepsisCatoche.	Deprehensio.
Soda,	Cephalæa,	Dolor capitis.
Soram,	Catalepsis,	Deprehensio.
Sofati,	pleuritis,	Lateralis dolor.
Spasmus humidus,	Notiodes,	Ex repletionē.
Spasmus ficans,	Xirotēs,	Ex inanitionē
Spatula,	Homoplate,	Scapulē.
Spatularis,	Omicæ vena,	Humeralis vena.
Spina,	phlegmon cutis,	Inflammen cutis.
Spondylus,	Spondylos,	Vertebra,
Stoliditas,	paraphrosyne,	Delirium.
Strabrositas,	Illofis, strabismus,	Palpebrę contorsio.
Subet, Subetia,	Caros, Coma,	Sopor altus.
Subeticę venę,	Carotides,	Soporarię Arteriales.
Subet Alfari,	Coma ahypnon,	Coma vigil, Vigilās so-
Suffuf,	Couis,	ruluis. (por.
Suffumigia,	Thymiamata,	Soffitus, odoramēta
Sura,	Omphalos,	Vmbilicus.
Sycodei,	Cyllos	Extuberatio faciei.
Syncopalis humorosa, chymosa,	Ex crudo humore,	febris
Syncopalis minuta,	Leptō, pyretō,	Extenui humore febris
Tabulos,	Lyparia febris,	Febris inæqualis.
Tarax,	Comphosis,	Surditas, Obauditus
Taraxis,	ophthalmia notha,	Contributio oculi.
Tarfati,	Hyposphagma,	Cruenta suffusio.
Tarsus,	Comphosis.	Surditas.
Tebegi,	Emphysema,	palpebrę inflatio.
Tebiegi,	Cachexia,	prau ^o corporis habitus
Telha,	Sapa, Siræon,	Mustum coctum.
Temor,	Hypogastera,	Ventris concavitas.
		Tenur

Arabicæ.

Græca.

Latina.

Tenur corporis,	Hypogastrium,	abdomen.
Tereniabin,	Manna,	Mannæ species.
Thaica,	Trochanter.	Tuberculū femoris.
Thaicaematica,	Trachomatica,	Detergentia.
Thau,	Ganglia,	Glandulosi affectus.
Theca,	Cianion,	Caluaria.
Thoeban,	Parachentesis,	perforatio.
Tinea,	Achores,	Manantia ulcera ca-
Tinnitus aurium,	Ithcos, Syrisinos,	Sibilus aurium. (pitie)
Traulus.	Pfellotes,	Balbuties.
Trehel,	Oedema,	Tumor laxus.
Triangula,	Tetartagos,	quartana febris.
Tyria,	Alopecia, ophiasis,	Defluviū capillorum.
Vachzi,	Nygma,	Punctura nervi.
Vacillatio,	Taraxis,	Spuria lippitudo.
Varices	Cirfos,	Dilatate venæ.
Variola,	Exanthemata lata,	Efflorescences.
Vena almahat,	Ancyle,	Poplitis Vena.
Vena algebein,	Metopon,	Frontis vena.
Vena alhaleb,	Porus Vreter,	Meatus Vrinarius.
Vena Medeni,	Dracontion,	Dracunculus.
Vena curuaruræ,	Ancyle,	Poplitis Vena.
Vena Funis brachij,	Basilica,	Iecorariæ ramus.
Vetæ subetica,	Carotides,	Soporariæ.
Venæ emulgentes,	Emulgentes.	Colatoriæ.
Venter,	Sicya,	Cucurbitula.
Verruca,	Achrochordon,	Verruca.
Vesica,	phlyctenæ,	pustulæ.
Vgane,	Gnathus,	Gena.
Virga,	AEdæon, Caulon,	Coles, penis.
Viriditas oculi,	Glaucoma,	Glaucedo oculi.
Vindmia,	Oedema,	Tumor laxus.
Vngula oculi,	pterygion,	Ala oculi, Vnguio-
Vfago,	Lichyn,	impetigo. (culi.
Vuajo,	Staphyloma,	Vuæ oculi egressus
Zaara,	Agrypnia,	Morbosa vigilia.
Zachema,	Catharrus.	Destillatio.

Zemane,

Arabice.

Græcæ.

Latina.

Zemane,

paralyfis.

Resolutio.

Zinaria,

Iode Cholos,

Aeruginosa bilis.

Zirbus,

Epiploon, Epiplun,

Omentum.

Zuccarū tabarzet,

Als Indicòs,

Saccarum album.

F I N I S.



VENETIIS, M DC XXVL
Apud Georgium Valentinum.

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. 10
PART 1
1980

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Gessa palpebræ.	Scerophthalmia,	Scabrities palpebrarū.
Gibbositas.	Cyllofis.	Distorsio.
Gienun.	Mania.	Furor.
Gingia mater.	Pericranium.	pericranium.
Glandulæ.	Ganglia.	Contractiones.
Grando oculi.	Chalazi o, Posthie,	Hordeolus.
Guesques.	Melancholia,	Fatuitas.
Guidez venæ.	Sphagitides.	Apoplecticæ, Inguulares.
Gutta serena,	Amaurosis,	Visus obscuritas.
Haben,	Hydrôps,	Aqua inter cutem.
Hacar,	Apostema,	Vlcus, siue abscessus
Hacuna,	Satyriasis,	Têtigo, Penis têtus.
Halmes,	Paraphrosyne,	Delirium.
Hamcha,	Anæa,	Dementia.
Hamicha,	Lata exâthemata,	Variolæ.
Hasef,	Hidroa,	Sudamina.
Hazam,	Ençope,	Incisio.
Median,	Moria, Morosis.	Desipientia.
Henadam,	Pepsia,	Concoctio.
Hesme,	Aposphagma,	Auulsio.
Hirquæ oculorū,	Canthus,	Anguli Oculi.
Humor,	Chymus,	Humor.
Iafuc,	Bregma,	Synciput.
Iectigatio,	Palmôs,	Palpitario, Saltus.
Iezemet,	Catalepsis, Caros.	Deprehensio.
Ibet, Subeth.	Coma,	ôopor.
Ignis persicus,	Anthrax,	Carbo, Carbunculu
Ilfchi,	Eiroticos,	Effrænis amor.
Impetigo,	Lychen, Lepra,	Salsa cutis asperitas
Impetigo aspera,	Lychenes,	Tensa prurigo,
Incubus,	Ephsaltes,	Nocturna suffocari
Inuersa palpebra,	Lagophthalmos,	Leporinus oculus.
Inuiscatio palpebræ,	Ancycloblepharon,	palpebrarū cōiun.
Inuolutus,	Allâtoides, choriô,	Vrinaculum, Secunda.
Istimbre,	Crasis,	Têpeties, assimilatio.
Iuleb,	Hydorrhodomel,	Ex rosacea & saccha-
Iancus,	olntos,	Varus.

kef,	Xir,	Manus.
kers,	Stomachus,	Ventriculus.
kili Vena,	Hepatitis,	Cava vena.
Lacertus,	Mys,	musculus.
Lachat,	Encope,	Incisio.
Lapidofitas oculi,	Tylosis,	Callus palpebrarū.
Latica febris,	Cathemerina,	Quotidiana, cōtinua.
Lauda,	Os hyoides,	Os gutturis.
Laxatie,	Paralyfis,	Resolutio.
Lactea,	Galaxi,	Lactes.
Lentigo,	Exuccatio,	Sugillata.
Lepores nasi,	Mycteres, Pterygiō,	Alē Pinulę nariū
Leucam,	Lepra,	Lep.a.
Lilimie,	Coeloma,	Profūd' oculi aq̄cessus
Lipiria febris,	Lyparia,	Lyparia. (ctius.
Loch,	Apophlegmatismus,	Pituitæ pos edu-
Longaon,	Apefthysmenō,	Rectum intestinum.
Lulma,	Cælomata,	Vlcera cava Vucæ.
Lythargirium,	Molybdæna,	Plūbago, limatura plūbi.
Macula oculi,	hypoththalmiō	Hyposphagma, sugillatio
Malum granatum,	Xiphoide,	Os pectoris.
Manuale opus,	Chirurgicon,	Manuum opera.
Maram,	Alimma,	Vnguentum.
Masera,	Phlegmon mitis	Letic inflammien.
Masticatorium,	Eclegma,	Pituitæ eductius p os.
Mater puerorum,	Spylepsia,	Comitalis morbus
Marer sanguinis,	Aneurisma,	Arterialis sāguinis
Maudana,	Catapotia,	Pilulæ. (fluor.
Melon,	Pepon,	Anguria.
Melon Indus.	Melopepones,	Anauria viridis rotūda
Men,	Drosomeli,	Manna. (pulsus.
Men Giezer,	Systole Diastole,	Contractio, dilatio
Mestruus sanguis,	Cataminion,	Menses.
Meri,	Oesophagus,	Gula.
Metalachlach,	Tolera,	Turbida vriua.
Metenen,	Pfoa,	Carolumborum.
Mirach,	Epygastrum,	Abdomen.

Mirachia,	Hypochondriacus,	Flatuosus morbus.
Mollificatio,	Paralysis,	Resolutio,
Morphea,	Alphos, Leuce,	Vitiligo.
Morum.	Codylomata,	Exuberatio ani.
Mucla,	Dema,	Cutis.
Munfis,	Eceyefmos,	Totius oculi plaps.
Muzum,	Muzum,	Austet ^r sapor, vel a-
Nascentia,	Apostema,	Exitura. (cerbus.
Naniculare os,	Scaphides,	Nauiforme os.
Nebith.	Oenon,	Vinum.
Nerdi os,	Astragalus,	Talus, Os ballistæ.
Nerualis Sutura,	Obolicea,	Sagittalis, Recta.
Monoculum,	Typhlon,	Cecum intestinum.
Morbilli.	Exanthemata sublimia,	pustulae elatæ.
Nocra,	Phlebs,	Vena.
Nodus,	Atheran,	Atheroma.
Nubes,	Hypochyma,	Suffusio, Cataracta.
Nucha,	Notyæon myelô,	Spinalis medulla.
Nyctalopa,	Nyctalope,	Nocturna cæcitas.
Oculi egressio,	Eceyefmos,	Totius oculi plaps.
Oculus Poplitis,	Epigonatis, Myle,	patella, Rotula, Genu
Oculi protuditus,	Atrophia,	Nutritionis defect.
Oculi vlc ^r serpes,	Anthracoſis,	Carbunculus.
Officinalia mēbra,	Organica,	Instrumentalia.
Opium,	Meconium,	Succus papaueris.
Oregmon,	Catarrhus,	Destillatio.
Os Cruris,	Gony,	Genu.
Os Cunei,	Sphenois,	Basilare, palati.
Oslatū, Alchatim.	Coxa,	Femur.
Os laude,	Paryngetron,	Os Gutturis.
Os Nerdi,	Evboides,	Cubiforme.
Os Paris,	Zygomal,	Os iugale, Os tēporū.
Os Perdis,	Pedion,	Planta pedis, Pecten
Ossa Shemic,	Lithoidea,	Lapidea, Petroſa.
Osseum,	Sertam,	Testium Inuoluerū.
Oſſei mollificatio,	Rhæcoſis,	Detritio, Scroti extēſio.
Ouum,	Cephalæa,	Dolor capitis diuturnus.

Arabice.

Græca.

Latine.

Panaritium,	Paronychia,	Reduvia.
Pannus idem ac ratia,	Lentigo, Nigror,	Liur, Nigritia.
pars domestica,	Tonos,	Nerbus.
pars syluestris,	Occhion meros,	Interior.
proportionalis,	Exothen meros,	Exterior. (spōdēs.
pecten alchef,	Symbolic ⁹ morbus	Naturæ loco tpi re-
reliōmata,	Metacarpium,	Postbra chiale.
reptalis chartilago,	Exuccatio	Liur.
periodica febris,	Thyroides,	Scutiformis.
phitanos febris,	Typica,	Intermittens.
phlebotomia	palymbola,	Reuerſua, erratica.
pia mater,	phlebotomia,	Vene ſectio.
pixis,	Choroides,	Meninx tenuis.
p laga,	Iſchias,	Coxa.
plancta noctis,	Trafma,	Vulnus. (nes.
porrina,	Epinyctis,	Nocturnæ eſſloratio
Portinariū,	porracea,	Por racea bilis.
truna,	pyloron,	Ianitor.
pupillæ conſtrictio,	Anthrax,	Carbo,
Quindege venæ,	phifis oculi,	Tabes oculi.
Radani,	Sphagitides,	Apopleticæ, iugulares
Radicalia mēbra,	Thlaſma,	Contuſio, Attricio.
Ragama,	Spermatica,	Seminalia.
Rahaf,	Rhogme,	Fiſſura
Ranula,	hæmorrhoidis nariū,	Flux ⁹ ſāguinis nariū
Ras,	Sardoa,	Ranunculus.
Raſcetta,	Cephal,	Supernus venter.
Raſga,	Carpōs,	Brachiale.
Rauedſeni,	Epygonatis,	Parella.
Renalis dolor,	Rhabarbarum,	Rhabarbarum.
Reſudatio,	Nephriticus,	Renum dolor.
Rete mirabile,	Hidroa,	Sudamina.
R hæine,	Plegma dictyoides,	Plexus retiſormis.
Rhia alfabiam,	Ana,	Amentia, Dementia
Rigil,	Hydrocephalon,	Aqua capitis.
Rina alfabiam,	Mētōs,	Femur Crus.
	Epilepſia,	Comitialis morbus.
		Rob,

Arabica.

Grecg.

Latina.

Rob,	Opos,	Succus seipso concreſcēs
Roſtrum Corui,	Coracoides,	Coriularis ꝑceſſus.
Rotula,	Epigonatis.	Patella, Genu.
Ruptura,	Cele,	Ramex, Hernia,
Ruptura Corneæ,	Proptofis,	Oculi prolapſus.
Saccus,	Caralepſis,	Deprehenſio.
Sacculos,	Cephalalgia,	Capitis dolor.
Sacha,	Tmeſis,	Sciſſura.
Sadacham,	Thlaſma,	Contuſio.
Sagittalis,	Obolicea,	Reſta Sutura,
Sahafati,	Achores,	Vlcus capitis manans
Saharà,	Pannychides,	Peruigiliū nocturnum.
Salrus,	Palmos,	Palpitatio.
Sāguis mortuus,	Exuccatio,	Sugillara.
Sanies in ſiphac,	Hypopyōn,	Pus Corneæ.
Sanies vngularis,	Onyx,	Vnguis oculi.
Sauich,	Perſana,	Cremor hordci.
Saurhat,	Cephalartica,	Caputpurgia.
Scabies oculi,	Trachoma,	ꝑruritus oculi.
Scarificatio,	Encharaxis,	Cutis incifio.
Scelen vena,	Splenitica,	Saluatella.
Sciatica, ſeu dolor,	Coxēdix, iſchias,	Coxendicū morbus
Sclioſis,	Sclerioſis,	tumor durus palpebræ.
Scotomia,	Scotodinos,	Tenebricoſa Vertigo.
Scrofulæ,	Charades,	Strume.
Sebel,	Enchātis, Rhæas,	Inangularis.
Secaniabin	Oxyzacchara,	Syrupus acetofus.
Secundina,	Chorion,	Secunda.
Secūdina tunica,	Chorodes,	Meninx tenuis.
Sedar,	Cataphora,	Somnolentia.
Sedere,	Scotoma,	Vertigo.
Sehagian,	Trauima,	Vulnus.
Selaſeue,	Acantha,	Spine apex.
Saphiros,	Carcynos,	Cancris ſpecies.
Serach,	Emphraxix pylorō,	Obſtructio pylorō
Seraſif,	Hypochondria,	ꝑꝛæcordia.
Sibare,	Mania,	Furor.

Sicſſi,

Arabic.

Græc.

Latine.

Sieff,	Hygrocolluria,	Arida Collyria.
Silac,	Tilosus,	Depilatio palpebra
Siphac,	peritonæon,	peritonæos tunica.
Sirsen calidum,	phrenitis,	phrenitis.
Sirsen frigidum,	Lethargus,	Lethargus.
Siracost,	Manna.	Manna.
Sisamina ossa,	Sesamoidea,	Sesamidea.
Sochos,	Catalepsis Catoche.	Deprehensio.
Soda,	Cephalæa,	Dolor capitis.
Soram,	Catalepsis,	Deprehensio.
Sofati,	pleuritis,	Latéralis dolor.
Spasmus humidus,	Notiodes,	Ex repletionē.
Spasmus ficcus,	Xirotēs,	Ex inanitionē
Spatula,	Homoplacē,	Scapulē.
Spatularis,	Omicæ vena,	Humeralis vena.
Spina,	phlegmon cutis,	Inflammen cutis.
Spondylus,	Spondylos,	Vertebra.
Stoliditas,	paraphrosyne,	Delirium.
Strabrofitas,	Illosis, strabismus,	Palpebræ contorsio.
Subet, Subetia,	Caros, Coma,	Sopor altus.
Subeticæ venæ,	Carotides,	Soporariæ Arteriales.
Subet Alfari,	Coma ahypnon,	Coma vigil, Vigilās so-
Stiffus,	Couis,	pulvis. (por.
Suffumigia,	Thymiamata,	Soffitus, odoramēta
Sura,	Omphalos,	Vmbilicus.
Sycodei,	Cyllos	Extuberatio faciei.
Syncopalis humorosa, chymosa,	Ex crudo humore,	febris
Syncopalis minuta,	Leptō, pyretō,	Extenui humore febris
Tabulos,	Lyparia febris,	Febris inæqualis.
Tarax,	Comphosis,	Surditas, Obauditus
Taraxis,	ophthalmia notha,	Contributio oculi.
Tarfati,	Hyposphagma,	Cruenta suffusio.
Tarsus,	Comphosis.	Surditas.
Tebegi,	Emphysema,	palpebræ inflatio.
Tebiegi,	Cachexia,	pravus corporis habitus
Telha,	Sapa, Siræon,	Mustum coctum.
Temor,	Hypogastera,	Ventris concavitas.

Tenur

Arabicæ.

Græca.

Latina.

Tenur corporis,	Hypogastrium,	abdomen.
Tereniabin,	Manna,	Mannæ species.
Thaica,	Trochanter.	Tuberculū femoris.
Thaica matica,	Trachomatica,	Detergentia.
Thau,	Ganglia,	Glandulosi affectus.
Theca,	Cranion,	Caluaria.
Thoeban,	Parachentesis,	perforatio.
Tinea,	Achores,	Manantia ulcera ca.
Tinnitus aurium,	Ithcos, Syrisinos,	Sibilus aurium. (pituita)
Traulus,	Pfellotes,	Balbuties.
Trehel,	Oedema,	Tumor laxus,
Triangula,	Tetartæos,	quartana febris.
Tyria,	Alopecia, ophiasis,	Defluuiū capillorum.
Vachzi,	Nygma,	Punctura nervi.
Vacillatio,	Taraxis,	Spuria lippitudo.
Varices,	Cirfos,	Dilatate venæ.
Variola,	Exanthemata lata,	Efflorescences.
Vena alnabat,	Ancyle,	Poplitis Vena.
Vena algebein,	Metopon,	Frontis vena.
Vena alhaleb,	Porus Vreter,	Meatus Urinarius.
Vena Medeni,	Dracontion,	Dracunculus.
Vena curuarure,	Ancyle,	Poplitis Vena.
Vena Funis brachij,	Basilica,	Iecorariæ ramus.
Vetæ subetica,	Carotides,	Soporariæ.
Venæ emulgentes,	Emulgentes.	Colatoriæ.
Venter,	Sicya,	Cucurbitula.
Verruca,	Achrochordon,	Verruca.
Vesica,	phlyctenæ,	rustulæ.
Vgane,	Gnathus,	Gena.
Virga,	AEdæon, Caulon,	Costes, penis.
Viriditas oculi,	Glaucoma,	Glaucedo oculi.
Vrdania,	Oedema,	Tumor laxus.
Vngula oculi,	pterygion,	Ala oculi, Vnguis.
Vsago,	Lichyn,	impetigo. (culi.)
Vuatio,	Staphyloma,	Vuæ oculi egressus.
Zaara,	Agrypnia.	Morbosa vigilia.
Zachema,	Catharrus.	Destillatio.

Zemane,

Arabice.

Græcæ.

Latina.

Zemane,	paralyfis.	Resolutio.
Zinaria,	Iode Cholos,	Aeruginosa bilis.
Zirbus,	Epiploon, Epiplun,	Omentum.
Zuccarū tabarzet,	Als Indicòs,	Saccarum album.

F I N I S.



VENETIIS, MDCXXVI.
Apud Georgium Valentinum.

[The following page contains faint, illegible markings.]

1917

